



## NUEVO REGISTRO DEL GATO DEL PANTANAL *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) PARA LA PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA

Leandro N. Soljan<sup>1</sup>, Juan Carlos Chebez<sup>2</sup> y Norberto Angel Nigro<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Salta 145. Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, Argentina. Tel: (03400) 15498872. Correo electrónico: leandrosoljan@hotmail.com

<sup>2</sup> Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, CEBBAD – Universidad Maimónides, Valentín Virasoro 732, Buenos Aires, Argentina. Tel: (011) 4905-1100, int. 1228. Correos electrónicos: elnombador@yahoo.com.ar y manincho@gmail.com

**RESUMEN:** La presencia del gato del pantanal, *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) en Corrientes ha sido confirmada recientemente (Chebez *et al.*, 2008). La comunicación de un nuevo hallazgo de un individuo atropellado a la vera de la Ruta Provincial N° 40, 50 km al sudoeste de Colonia Carlos Pellegrini (28°48'77.7"S - 57°33'07.0" W), Departamento Mercedes, en el centro de la Provincia de Corrientes, suma un nuevo registro para el área de esta rara especie.

**SUMMARY:** NEW RECORD OF THE PANTANAL CAT *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) FOR CORRIENTES PROVINCE, ARGENTINA. The presence of Pantanal Cat *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) in Corrientes Province has been confirmed recently. The new finding of a knock down individual on the side of the road in Provincial Route N° 40, located 50 km southwestern of Colonia Carlos Pellegrini (28° 48' 77.7"S - 57° 33' 07.0" W), Mercedes Department, in the center of Corrientes Province; add a new record for the area of this rare species.

### INTRODUCCION

El 15 de agosto de 2008 a las 11 hs. uno de los autores (L. N. S.) encontró un felino atropellado a la vera de la Ruta Provincial N° 40, 50 km al sur de Colonia Carlos Pellegrini (28° 48' 77.7"S - 57° 33' 07.0" W) Departamento Mercedes, en el centro de la Provincia de Corrientes. El autor del hallazgo, de profesión veterinario, pudo examinar al animal, una hembra, estimando que –por el estado y el rigor mortis que presentaba- había sido atropellada en esa misma madrugada. Las medidas aproximadas del felino fueron 45 cm de longitud, más 20 cm de cola y unos 3 kg de peso. Presentaba la dentición completa y con mínimo desgaste de incisivos, por lo que estimó su edad en no más de tres años. El

animal estaba en un ecotono de pastizal alto de paja colorada (*Andropogon lateralis*), sin monte, a excepción de algunos árboles de poca altura como los ñandubays o espinillos (*Prosopis affinis*) que se aprovechaba para explotación ganadera. El espécimen no fue colectado y apenas se obtuvo una fotografía, pues en un primer momento se lo consideró sólo un gato del pajonal.

### RESULTADOS


Del análisis del ejemplar, uno de los autores (L. N. S.) constató que presentaba un manto formado por dos tipos de pelo: un subpelo denso, corto y uniforme (que aportaría la coloración general según la parte del cuerpo) y la

presencia de pelos más largos y notorios predominando los blancos en la zona ventral y negros o con puntas negras en los flancos y el dorso. Como puede observarse en la fotografía que ilustra la presente, la pelambre del individuo es de mediana longitud pese a que por la época del año en que se produjo el hallazgo (invierno) se esperaría un mayor largo del pelaje. La tonalidad predominante del pelaje es amarillenta grisácea, algo leonado en lo dorsal del cuello y mezclado de pelos negros en la parte superior de la cabeza y el dorso y más notable en la línea media dorsal. Las orejas son triangulares, blancas por dentro, negras en lo dorsal y lavadas de ocre acanelado en su base. La cola es corta, sin rastros de anillos y se va oscureciendo hacia la punta, que es casi negra. El rinario aparece manchado de sangre, por lo que no puede observarse su coloración aunque aparenta ser más bien clara. Presenta dos líneas canela a los costados de la cara: una que baja desde el ojo hasta la mejilla y otra que se ubica por debajo de aquella, en forma más o menos paralela. Otra pequeña línea canela cae perpendicular sobre los ojos. Las mejillas, belfos y quijada son blancos. En los flancos ostenta leves manchas oscuras que parecen tender a formar angostas bandas oblicuas y que son más notorias en las partes inferiores. La zona ventral es blanca. Solo puede observarse en la foto la parte interna de la

pata delantera derecha, que es blanca y tiene dos bandas transversales oscuras bien notorias. La parte anterior de las extremidades es grisácea: en los antebrazos delanteros presenta manchas bien oscuras que tienden a formar fajas notables, mientras que en las traseras las manchas forman líneas angostas. Puede observarse que la planta del pie delantero derecho es oscura casi negra; ese color se extiende en las patas delanteras hasta las muñecas (carpo) por la parte posterior y en igual forma hasta el tarso en las traseras. El ejemplar concuerda bien con la descripción de la subespecie *Lynchailurus braccatus munoai* (Ximénez, 1961) sobre todo por su diseño con fajas y la característica coloración de las patas. También es coincidente con la ilustración diagnóstica de García-Perea (1994) excepto por el barrado en la porción distal de la cola que no se observa así en este individuo si bien su extremo se nota bien oscuro. La validez del género *Lynchailurus* así como un análisis pormenorizado de la distribución geográfica de la especie ya fue discutido por dos de los autores (J. C. C. y N. A. N.) en un trabajo anterior (Chebez *et al.*, 2008) por lo que, remitimos al mismo a quien quiera profundizar sobre el tema. Curiosamente se lo ha citado recientemente para la provincia como "*Leopardus colocolo [Lynchailurus pajeros]*" (Soler y Cáceres, 2009) sin referencias ni fundamenta-



**Figura 1.** La hembra atropellada que motiva la presente comunicación. Nótese la planta del pie delantero derecho bien oscura casi negra; color que se extiende en las patas delanteras hasta las muñecas por la parte posterior y en igual forma hasta el tarso en las traseras. (Foto: Leandro N. Soljan).



**Figura 2.** Mapa indicando el lugar del hallazgo, en el centro de la Provincia de Corrientes.

ciones y aparentemente desconociendo la cita de esta especie ya mencionada (Chebez *et al.*, *op. cit.*). Este nuevo registro viene a fortalecer la presunción de la existencia de una población estable de la especie en la provincia de Corrientes, por lo que reiteramos sobre la necesidad de mayores relevamientos, así como la detallada revisión de los animales atropellados en las banquinas para poder establecer su real estatus en el área. Además crea el interrogante de su presencia en la Reserva Provincial del Iberá, ya que el atropellamiento aconteció muy cerca de su borde oriental.

#### AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Lic. Silvina B. C. Biscaglia y a Mariano Masariche por la confección del mapa y a la Lic. Roberta G. Callicó por la traducción del resumen al inglés.

#### BIBLIOGRAFIA

- ACHAVAL, F.; M. CLARA, y A. OLMOS. 2007. Mamíferos de la República Oriental del Uruguay. Guía fotográfica. 2ª Edición corregida y aumentada. Zonalibro Industria Gráfica, impresora. Sección Zoología – Vertebrados. Facultad de Ciencias. Montevideo, Uruguay. 216 pp.
- CABRERA, A. 1911. Catálogo sinonímico de los *Felidae* sudamericanos. Rev. Chilena Hist. Nat. 15: 40-54.
- CABRERA, A. 1957. Catálogo de los Mamíferos de América del Sur. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, T. IV (I), Buenos Aires.-
- CHEBEZ, J. C. 2009. Otros que se van. Fauna argentina amenazada. Editorial Albatros, Buenos Aires. 552 pp.
- CHEBEZ, J. C., N. A. NIGRO, G. A. SOLÍS y T. A.STRUMIA. 2008. Confirmación de la presencia del gato del pantanal *Lynchailurus braccatus* (Cope, 1889) en la Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie) 19: 11 pp. Buenos Aires.
- FABRI, S.; S.HEINONEN FORTABAT.; A. SORIA y U. F. J. PARDIÑAS. 2003. Los mamíferos de la Reserva Provincial Iberá, Provincia de Corrientes, Argentina, pp.305-347 en ALVAREZ, B. B. (Editora). Fauna del Iberá. Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste. 376 pp.
- GARCÍA-PEREA, R. 1994. The pampas cat group (genus *Lynchailurus* Severtzov, 1858) (Carnivora, Felidae) a systematic and biogeographic review. American Museum Novitates, 3095: 1-36. New York.
- GONZÁLEZ, E. M. 2001. Guía de campo de los mamíferos de Uruguay. Introducción al estudio de los mamíferos. Vida Silvestre, Sociedad Uruguaya para la Conservación de la Naturaleza. 352 Pp.
- GONZÁLEZ, E. M. y A. SAPPA. 2007. Nuevos registros y estatus de conservación de cuatro especies de carnívoros raros o amenazados en Uruguay (Felidae y Canidae). Resúmenes de las XXI Jornadas Argentinas de Mastozoología. 6 al 9 de Noviembre, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.

- PEREIRA, J., D. VARELA, y N. FRACASSI., 2002. The Pampas cat in Argentina: Is it absent from the Pampas?. Cat News 36: 20-22, Cat Specialist Group, Bougy, Switzerland.
- PEREIRA, J. y N. FRACASSI. 2000. Gato de los pajonales (*Lynchailurus pajeros* Desmarest, 1816). Ecología y Conservación. En: JULIÁ, J. P.; E. RICHARD.; J. PEREIRA y N. FRACASSI. "Introducción a la biología, uso y estatus de los felinos de Argentina". REHM, Serie Apuntes 2: 92 págs., Tucumán.
- PEREIRA, J., N. FRACASSI.; D. VARELA., y P. MOREYRA. 2000. Estudio de la distribución del gato de los pajonales (*Lynchailurus sp.*) en la Argentina en base a localidades concretas de registro. IX Congr. Iber. Biod. y Zool. de Vert. Buenos Aires.
- PEROVIC, P. G. y J. A. PEREIRA., 2006. Familia Felidae G. Fischer, 1817 En: BARQUEZ, R.M.; M. M. DIAZ, y R. A. OJEDA., (eds.). Mamíferos de Argentina. Sistemática y distribución. SAREM. 360 pp.
- SOLER, L. y F. CÁCERES. 2009. Breve análisis sobre la presencia del puma (*Puma concolor*) en la provincia de Corrientes. Rev. BIOLógica, Santa Fe
- XIMÉNEZ, A. 1961. Una nueva subespecie del gato pajero en el Uruguay. Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo 5 (88):1-8.