



## NUEVO REGISTRO DE LA VIUDITA DE ANTIFAZ (*Fluvicola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) PARA LA ARGENTINA

Eduardo Militello<sup>1</sup>, Juan Carlos Chebez<sup>2</sup> e Irene Da Costa Bueno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cuerpo de Guardaparques Nacionales- Administración de Parques Nacionales, Parque Nacional Iguazú, Av. Aguirre 66 (3370), Misiones, Argentina. Correo electrónico: eduardomilitello@gmail.com

<sup>2</sup> Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Domicilio postal particular: Juan B. Justo 1205 Beccar (1643). Prov. de Bs. As. Correo electrónico: elnombrador@yahoo.com.ar

**RESUMEN:** La Viudita de Antifaz (*Fluvicola nengeta*) es registrada por primera vez para el Parque Nacional Iguazú y por tercera vez para la provincia de Misiones, de donde era conocida en la cuenca del río Uruguay. Se dan detalles del comportamiento del ejemplar que se fotografió y se discuten los otros registros del país y cercanos confirmando su carácter evidente de especie en creciente expansión.

**ABSTRACT:** New record of the Masked Water-Tyrant (*Fluvicola nengeta*) (Passeriformes: Tyrannidae) for Argentina. The Masked Water-Tyrant (*Fluvicola nengeta*) has been registered for the first time at Iguazú National Park being the third record for Misiones Province, where this species was known to inhabit the Uruguay River basin. Details on the behavior of a photographed individual are provided. Also, other known records in the country and nearby places are discussed, confirming this species is evidently on a growing expansion range.

### INTRODUCCIÓN

El 18 de febrero de 2010, en el camino a Puerto Canoas, área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, departamento homónimo, ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Misiones, Argentina, se pudo observar y fotografiar a un individuo adulto de *Fluvicola nengeta*, siendo el primer registro para dicho parque nacional y el tercero para la provincia de Misiones. Se comparten datos etológicos, comentarios de su ecología, así como aspectos descriptivos y fotografías del mismo.

Es una especie solo conocida para la Argentina en base a tres registros (contando el presente) y todos efectuados en esta última década. *Fluvicola nengeta* se encuentra en evidente expansión de la mano de los desmontes producidos por el hombre y el avance de

la frontera agropecuaria, generando grandes espacios propicios para su desplazamiento, encontrando en estas perturbaciones nichos ecológicos apropiados para su supervivencia. Como ya ha sido expuesto por diversos autores relacionadas a ésta y otras nuevas especies de aves que se registraron en estos últimos tiempos en Misiones, como es el caso de otro tiránido, el *Todirostrum cinereum*, hoy frecuente y nidificante en el área Cataratas del mismo parque nacional (Rodrigo Castillo, com. pers.) y que es hallado en los bordes y el interior del "Corredor Verde" en distintas áreas modificadas.

Las anteriores observaciones de *Fluvicola nengeta* en el área fueron recopiladas y comentadas en Chebez (2009) donde expresa: "La especie se distribuye típicamente por el noreste de Brasil y sus poblaciones han evidenciado una expansión hacia el sur, hasta verse ya en

la década de 1950 en la latitud de Río de Janeiro (Sick, 1985). Fue recientemente avistada para la Argentina en el Parque Provincial Esmeralda, Reserva de Biosfera Yabotí (departamento San Pedro), en Misiones, en base a un registro visual y una filmación del guardaparque Daniel Kurday del 20 de marzo de 2002 (Krauczuk *et al.*, 2003; Anónimo, 2004) de un ejemplar que se encontraba en el césped recién cortado persiguiendo insectos a la manera del picabuey (*Machetornis rixosus*), con cortas y rápidas carreritas (Marcia y Daniel Kurday, com. pers.). Sería una especie rara o accidental en nuestro país y por ello se la debería considerar vulnerable. La escasa información existente sobre su nido se resume en Fitzpatrick (2004)”. Estando la obra en prensa se vio obligado a agregar como nota anexa lo siguiente: “La lavandera de antifaz o viudita enmascarada (*Fluvicola nengeta*) fue citada recientemente para el Paraguay para Ea. San Blas, dpto. Caaguazú, Paraguay en base a una observación y fotografía del 10 de junio de 2003. Además, el 19 de octubre de 2005, A. Bodrati la volvió a registrar en la Argentina en el Parque Provincial Moconá, dpto. San Pedro, Misiones ( Klavins y Bodrati, 2007). El Hornero 22(1):43-45).”

Además de estos registros son dignos de mención en Brasil entre otros los de Willis (1991) quien la encuentra en el litoral de São Paulo en 1980 y los que recopila Costa Straube *et al.* (2007) para 1983 en Minas Gerais (datos de J. F. Pacheco) y en 1985 en el valle del Paraíba en Sao Paulo ( Alvarenga, 1990). Luego enumera varias localidades paulistas dadas a conocer por Willis y Oniki (2003) entre otros autores. Luego añaden 12 registros en el estado de Paraná (de los cuales solo uno había sido publicado por Scherer Neto y Carrano (1998) basado en un registro visual de Guaraqueçaba de junio de 1997). La señalan así para 12 localidades ubicadas principalmente en el sector norte y este del estado y uno sobre el valle del Paraná. Los mismos se extienden desde 1984, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, correspondiendo a los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre respectivamente, señalando como marginales además los dos registros argentinos del departamento San Pedro , ya mencionados , al igual que el de la Estancia San Blas en Paraguay y sumando uno mas de ese país de San Antonio, departamento Central basado en una observación y fotografía de Hugo Del Castillo. Además suma dos localidades del estado de São



**Fotos 1 y 2.** Elegante y agradable tiránido sobre zancos, le agrada el agua y no desdena de salir de ella en busca de sus presas. Fotos: Eduardo Militello.



**Fotos 3 y 4.** Posando en la percha no tan solo resalta el contraste del blanco y negro de su plumaje. También su largo tarso se hace muy notorio. Fotos: Eduardo Militello.



**Fotos 5 y 6.** Carreritas entre los charcos en busca de alimento. Fotos: Eduardo Militello.

Paulo (Porto do Cubatão) de enero de 2006 y Lago Da Feira de Ourinhos de abril de 2007. Finalmente incorporan la especie para el estado de Mato Grosso do Sul para la Fazenda Caimán en base a un registro de 2004 y la Fazenda Aguapé donde se lo observa regularmente desde 2003. Luego efectúan los autores una pormenorizada discusión acerca de como la actividad antrópica sobre el paisaje selvático habría favorecido la expansión a expensas de los desmontes y la creación a la vez de nuevos hábitats artificiales junto a piscinas, presas y tajamares y hasta en charcas de orina del ganado bovino formadas por sus huellas y que juntan también agua de lluvia.

## RESULTADOS

El registro motivo de esta nota fue realizado a las 13:35 hs del 18 de febrero de 2010, día soleado después de un par de días de precipitaciones copiosas y constantes, logrando acumular una buena cantidad de agua en los charcos del camino vehicular de tierra entre la estación de trenes de Garganta del Diablo y Puerto Canoas sobre el Alto Iguazú, donde fue observada un solo individuo de *Fluvicola nengeta* que se desplazaba a baja altura entre charco y charco, quien desde un primer momento se mostró tolerable a la presencia humana atraído por la gran disponibilidad de insectos que lo obligaba a estar más atento, debido a la gran cantidad de mariposas que se encontraban en ese lugar. Esto permitió al primero de los autores acercarse a unos 4 o 5 metros, tomar fotografías y realizar observaciones durante unos 30 minutos durante los cuales el individuo se mantuvo en el suelo, volando solo en una oportunidad a unos 2 metros de altura para posarse en un árbol y acicalar su plumaje.

Entre las observaciones realizadas se pudo ver la captura y consumo de insectos que realizaba mediante carreritas cortas y enérgicas, recordando un caminar más acelerado que el del *Machetornis rixosus*, vadeando permanentemente charcos poco profundos donde capturaba moscas, insectos acuáticos y mariposas. El tercer autor también observó su presencia ese mismo día llamándole poderosamente la atención por su llamativo contraste entre el verde de la selva y el rojo de la tierra, compartiendo dicho comentario con sus colegas.

El género *Fluvicola* en la Argentina está compuesto en la actualidad por otra especie: *Fluvicola albiventer* a la que se denomina vulgarmente con el nombre tipificado de Viudita Blanca. Si bien siguiendo este criterio el nombre tipificado para esta especie sería el de Viudita de Antifaz ante una eventual revisión de dicha lista, recomendamos recuperar para este género el nombre de “lavanderas” que arbitrariamente quedó para uso exclusivo de *Arundinicola leucocephala* dada su preferencia por el ámbito acuático o sus inmediateciones reservando el nombre de “viuditas” para las especies del género *Knipolegus*. Entonces *Arundinicola leucocephala* podría llamarse en ese caso Lavandera Cabeza Blanca, *Fluvicola albiventer* Lavandera Blanca y la *F. nengeta* Lavandera de Antifaz. Hasta que eso ocurra mantenemos el nombre de Viudita de Antifaz que ya fue utilizado.

## AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al guardaparque Rodrigo Castillo por la información brindada y a la Lic. Roberta Callico por su ayuda con la traducción.

## BIBLIOGRAFÍA

- ALVARENGA, H. M. F. 1990. Novos registros de expansões geográficas de aves no leste de estado de São Paulo. Revista Brasileira de Ornitologia, Ararajuba 1: 115-117.



**Fotos 7 y 8.** Continuas carreritas para consumir insectos, acompañados por rápidos saltos y despliegues de las alas para mayor sustento. Fotos: Eduardo Militello.



**Fotos 9 y 10.** Comiendo mariposas. Fotos: Eduardo Militello.

**CHEBEZ, J. C.** 2009. Otros que se van. Fauna argentina amenazada: 264-265 y 414 págs. Editorial Albatros, Buenos Aires.

**COSTA- STRAUBE F ; A. URBEN – FILHO ; L. R. DECONTO y E. WEFFORT PATRIAL.** 2007. *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e sua expansão de distribuição geográfica pelo sul do Brasil. *Atualidades Ornitológicas* (137):33-38. [www.ao.com.br](http://www.ao.com.br)

**GUYRA PARAGUAY.** 2004. Listacomentada de las Aves de Paraguay, 200 pág., Asociación Guyra Paraguay, Asunción.

**KLAVINS, J. y A. BODRATI.** 2007. La viudita enmascarada (*Fluvicola nengeta*): una nueva especie para Paraguay y segundo registro para Argentina. *El Hornero* 22 (1): 43-45, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

**KRAUCZUK, E.R.; D. KURDAY y E. ARZAMENDIA.** 2003. Presencia de *Fluvicola nengeta* en la provincia de Misiones, Argentina. *Lundiana* 4 (2):161, Instituto de Ciencias Biológicas- UFMG.

**SCHERER NETO, P y E. CARRANO.** 1998. Ocorrência da lavadeira-mascarada *Fluvicola nengeta* (Linnaeus,1766) no Estado do Paraná. *Atualidades Ornitológicas* (82):11.

**SICK, H.** 1985. *Ornitologia Brasileira, uma introdução.* Volumen 2. Brasilia

**WILLIS, E. O.** 1991. Expansão geográfica de *Netta erythrophthalma*, *Fluvicola nengeta* e outras aves de zonas abertas com a “desertificação” antrópica. *Ararajuba* 2: 101-102.

**WILLIS, E.O. y Y. ONIKI.** 2003. Aves de Estado de São Paulo, municipio de Rio Claro, Divisa