

# Aves del jardín del Museo Jacobacci (San Antonio Oeste - Río Negro)



**CHURRINCHE** *Pyrocephalus rubinus*  
13 cm. Se exhibe. Corto vuelo elástico. Suave pint.. y ch..churrín.. en vuelo nupcial. Llamativo. Notables corona, semicopepe y ventral rojos. Resto negruzco. f: Poco llamativa. Dorsal gris pardusco. Pecho estriado de gris. Subcaudal rosáceo. J: Como f. Abdomen amarillo. Migrador B (en el N quedan individuos). Sabanas, bosques, estepas arbustivas y áreas rurales IV




**PICO DE PLATA** *Hymenops perspicillatus*  
13 cm. Se exhibe en matas y postes. A menudo terrícola. Carreteritas. Vuelo elástico. Negro. Primarias blancas notables en vuelo. Pico y perocular, amarillento. f: Distinta e inconspicua. Más bien oculta. Raramente junto al m. Parda, estriada. Zona alar rufa notable en vuelo. J: como f (sin perocular). Humedales y cercanías, incluso en altura, de llanuras y serranías V




**TORDO RENEGRIDO** *Molothrus bonariensis*  
19 cm. Grandes bandadas con más mm. Se asienta sobre el ganado. Algo más esbelto que Tordo Pico Corto. Parasita a muchas especies. Gorgoteo seguido de silbo agudo o chistido. Agradable canto en vuelo. Negro. Brillo violeta. Iris oscuro. f: Gris pardusca (negra en Misiones). Diversos ambientes, bañados y poblados VI




**GORRIÓN** *Passer domesticus*  
13 cm. El pájaro más conocido. Peridoméstico. Bullanguero. Oportunista. Pico grueso. Corona y rabadilla, gris. Collar nual castaño. Dorsal estriado de castaño y negro. Barbero negro. Filete alar y resto ventral blancos. F: (sin negro ni furo). Introducido de Europa. Áreas rurales y poblados VI




**BENTEVEO COMÚN** *Pitangus sulphuratus*  
22 cm. Muy conocido. Audaz. Pesca y halcone. Bullanguero. Agudo bicho..fuiii.. y otras voces. Cabeza negra con notable ceja blanca. Pico robusto pero menos que en 696). Dorsal pardo. Filetes canela en remeras. Diversos ambientes, a menudo húmedos, y poblados VI



**PICABUEY** *Machetornis rixosa*  
17 cm. Confiado. Gorjeos agudos, raros en tiránidos. Caza mediante carreteritas. Anda en derredor y sobre el ganado. También arborícola. Pálido. Cabeza cenicienta que pasa a pardusco en lo dorsal. Eréctil corona oculta roja. Ventral amarillo. Sabanas, bosques, áreas rurales y poblados V



**MONJITA CORONADA** *Xolmis coronatus*  
20 cm. Parece un benteveo blanco y negro. Corto flu. Corona y faja ocular negras, separadas por vincha blanca. Dorsal gris pardusco. Remeras y cola negras. Filetes en cubiertas y banda alar, blanco. Migrador C. Bosques y estepas arbustivas III



**HORNERO** *Furnarius rufus*  
18 cm. El ave nacional. Canta a dúo con notas distintas. Nido de barro, como hornito, visible en sitios diversos. Bastante terrícola. Camina con elegancia. Dorsal pardo o castaño. Banda alar canela poco notable. Cola rufa. Garganta blancuzca. Resto ventral gris ocráceo o acanelado. Diversos ambientes, y poblados VI



**CALANDRIA REAL** *Mimus triurus*  
20 cm. Dorsal gris pardusco. Rabadilla rufa. Cola como 811) y faja alar blanca más notable, formando conspicuo diseño en vuelo. Flancos ocráceos. Sabanas, estepas arbustivas y áreas rurales. La población austral es Migrador C IV



**CALANDRIA GRANDE** *Mimus saturninus*  
25 cm. Leve estriado dorsal. Filetes blancos en cubiertas menos notables que en 814). Cola más larga, semierecta, con vexilo externo y ancho ápice de timoneras (salvo centrales), blanco. Conspicua ceja y ventral blancuzcos. Sabanas, bordes de bosques, áreas rurales y poblados IV




**CALANDRIA MORA** *Mimus patagonicus*  
22 cm. Parecida a Calandria Grande. Canto distinto. Dorsal uniforme. Dos notables filetes de pecas blancas, en cubiertas. Cola algo más corta, sólo con ápice blanco. Ventral ocre acanelado. Estepas arbustivas andinas y patagónicas. La población austral es Migrador C IV



**ZORZAL PATAGÓNICO** *Turdus falcklandii*  
24 cm. Recuerda a Zorzal Cabeza Negra. Alopátricos. Coloración llamativa. Cabeza y cola negruzcas. Ventral acanelado. Pico y patas amarillo anaranjado. J: Pecho maculado. Bosque Araucano y cercanías, arboledas y poblados en Patagonia. En expansión hacia el N IV




**PALOMA DOMÉSTICA** *Columba livia*  
32 cm. Muy conocida. Peridoméstica. En plazas de grandes ciudades. Gris azulada. Brillos verde y violáceo en cuello. Dos bandas negras en ala plegada. Además, gran variedad de formas y colores, que incluyen ejemplares albinos y melánicos. Introducida de Eurasia. Poblados y áreas rurales. A veces asilvestrada en barrancas VI



**PALOMA MANCHADA** *Columba maculosa*  
32 cm. A veces con Paloma Picazurú. Muy parecida en vuelo, sobretodo la raza del NO. Más confiada y plomiza. Similar voz, más ronca y potente. (Cuello sin filetes). Notable ala con muchas pecas blancas. Iris gris. Bosques, estepas arbustivas, áreas rurales y poblados. En expansión V



**TORCAZA COMÚN** *Zenaida auriculata*  
22 cm. Bandadas, a veces enormes. Voz kuu..kuúkuú..kau... Rosácea. Brillo dorado en cuello lateral. Manchas en alas y cara, negras. Cola plumiza con faja subapical negra y ápice externo blanco. Diversos ambientes, áreas rurales y poblados VI



**TORCACITA COMÚN** *Columbina picus*  
15 cm. Confiada. Semiterrícola. Bastante peridoméstica. Repetido kuú... Cabeza y cuello cenicientos. Cubiertas con línea negra. Faja alar longitudinal blanca, contrastada con remeras negras. Cola algo larga, blanca, con timoneras centrales negras. Ventral blancuzco rosáceo. f: más pardusca. Bosques, áreas rurales y poblados V



**RATONA COMÚN** *Troglodytes aedon*  
10 cm. Variado y agradable canto terminado en largo trino. Además chrrc... Peridoméstica. Recorre matorrales y cercas. Parda. Alas y cola castañas barradas. Diversos ambientes V



**RATONA APERLIZADA** *Cistothorus platensis*  
10 cm. Oculta. Se asoma sobre el pastizal. Agradable voz aguda en estrofas complejas. Ocrácea. Estriado de negro en corona. Notable estriado dorsal negro y blancuzco. Rabadilla canela. Patas naranja. Pajonales y pastizales cerca del agua (Campos del Tuyú, B. Aires) III




**CANASTERO PATAGÓNICO** *Asthenes patagonica*  
15 cm. I. Confiado. Pico más corto que otros canasteros. Cola negra (con vexilo externo castaño). Mancha gular negra con puntos blancos. Vientre acanelado. Estepas arbustivas y patagónicas III



**CANASTERO COLUDO** *Asthenes pyrrholeuca*  
15 cm. Tímido. Oculto. No terrícola. Vuelo corto y bajo, zambullendo en la vegetación. Suave uii... Cola larga (no erecta), que al volar lleva flameando. Mancha gular naranja. Pico fino. Migrador C. Estepas arbustivas y patagónicas, vegetación palustre y áreas abiertas del Bosque Araucano IV



**YAL NEGRO** *Phrygilus fruticeti*  
15 cm. Nasal pir..piri..pi..piripi.. que emite asentado o en despliege, al caer planeando con las alas debajo de la horizontal. Negruzco. (m J: pardo oscuro). Estriado dorsal, pecho, alas y cola, negro. Filetes blancos en cubiertas. Resto ventral blancuzco. Pico y patas naranja. f: Gris pardusca estriada de negro. Auricular pardo acanelado. Bigote blanco. Estepas andinas y patagónicas IV



**JOTE CABEZA COLORADA** *Cathartes aura*  
55 cm. Env. 1,75 m. Poco gregario. En vuelo, alas en V abierta. Silueta más estilizada que 110). Cabeza y cuello rojizos. (Nuca blanca en el N). Notables remeras ventrales blancuzcas. J: Cabeza y patas negruzcas. Diversos ambientes IV



**GAVIOTA COCINERA** *Larus dominicanus*  
55 cm. Audaz. Sigue barcos. A menudo en puertos y basurales. Blanca, incluso cola. Alas y manto negros. Ápice blanco en remeras. Pico amarillo con mancha roja. Patas amarillo oliváceo. J: Se ve a menudo. Diversos plumajes parduscos. Pico, patas y faja caudal negruzcas. Además Antártida e Islas del Atlántico Sur} Costas de mar, lagos, lagunas y ríos VI



**LORO BARRANQUERO** *Cyanoliseus patagonus*  
42 cm. Bandadas bullangueras. Apañados alto en postes y cables. Oliváceo. Lomo y rabadilla amarillo o verdoso. Remeras azules. Larga cola oliva azulada. Pecho pardo oscuro y resto ventral amarillo (o pardo) con mancha roja. Perocular blanco. Sabanas, estepas arbustivas, barrancas y áreas rurales, andinas y patagónicas IV



**CARDENAL AMARILLO** *Gubernatrix cristata*  
18 cm. En arbustos. Amarillo verdoso. Notable copete y gular negros. Espalda estriada de oliva y negro. Ceja y malar, amarillo oro. Cola amarillo oro con timoneras centrales negras. f: Mejillas y pecho grises. Sabanas y estepas arbustivas (Patagones, B. Aires). En disminución III



**NARANJERO** *Thraupis bonariensis*  
17 cm. Arborícola. Llamativa coloración. Capuchón celeste violáceo. Loral y dorso negros. Alas y cola con filetes celestes. Rabadilla y pecho naranja. Ventral amarillo. f: Coloración modesta. Dorsal oliváceo. Ventral ocráceo. Plumajes intermedios. Bosques, sabanas, áreas rurales y poblados IV



**TIJERETA** *Tyrannus savana*  
m: 38 cm. Caza en vuelo. Inconfundible. Cabeza, y larguísima cola (28 cm), negras. Corona oculta amarilla. Dorsal gris. Ventral blanco. f: Cola menor (14 cm). J: Cola normal. Migrador B (en bandadas). Sabanas, bosques, estepas arbustivas y áreas rurales V



**GAUCHO COMÚN** *Agriornis micropterus*  
23 cm. Voz puit... Sin canela. Larga ceja clara. La población austral es Migrador C. Estepas arbustivas, patagónicas y altoandinas IV