

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie | Volumen 7 (1) | 2017/21-43

DATOS DE PESOS DE AVES ARGENTINAS. PARTE 4

Weight of Argentine birds. Part 4

Luis G. Pagano¹ y Sergio A. Salvador²

¹Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata (1900), La Plata, Buenos Aires, Argentina.

²Bv. Sarmiento 698, Villa María (5900), Córdoba, Argentina. mono_salvador@hotmail.com

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

 **Universidad Maimónides**

Resumen. El presente trabajo da cuenta de nuevos pesos de varias aves argentinas. Estos son datos valiosos para estudios ecológicos, y en algunos casos son una importante contribución taxonómica. Los datos de peso fueron obtenidos por los autores. Se brinda la información del peso de 156 especies y subespecies de aves argentinas.

Palabras clave. Aves, Argentina, Peso.

Abstract. The present work informs about weights of several Argentine birds. These are valuable data for ecological studies and in some cases they are an important taxonomic contribution. The weight data were obtained by the authors. Weight information of 156 species and subspecies of birds Argentine is given.

Key words. Birds, Argentina, Weight.

INTRODUCCIÓN

La presente contribución es la continuación de tres publicaciones anteriores: Salvador (1988, 1990) y Salvador y Di Giacomo (2014). Como se recalca en los trabajos anteriores el peso de las aves es un elemento de gran valor para los trabajos de tipo ecológico y con validez en algunos casos como aporte taxonómico.

Se da información inédita de pesos de 156 especies y subespecies de aves argentinas. Los pesos fueron tomados con balanzas Pesolas de 10, 50, 100, 300, 500 y 2500 gr; balanzas electrónicas de laboratorio y balanzas digitales.

Para cada especie o subespecie se da la localidad, fecha de obtención del peso, sexo (cuando pudo ser determinado), y las iniciales de quién tomo el dato (LGP) L. G. Pagano y (SAS) S. A. Salvador.

En el Apéndice 1 se informa sobre cada localidad mencionada en el texto, sus coordenadas geográficas, departamento o partido y provincia a la que corresponde.

Para el ordenamiento sistemático se siguió generalmente a Remsen *et al.* (2015).

RESULTADOS

Familia Tinamidae

Crypturellus tataupa tataupa

Mina Clavero, (Feb.), 1 ♀ 198 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1983b; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Rhynchotus rufescens pallescens

Laprida, (Jun.), 1 ♂ 849 gr y 2 ♀ 872 y 928 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país

(ver Contreras, 1985; Salvador, 1988; Camperi, 1992b; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Nothoprocta cinerascens cinerascens

San Agustín del Valle Fértil, (Set.), 1 ♀ 375 gr (LGP); Rucanelo, (Jul.), 5 ♂ X: 458.6 gr (RA: 433 a 484) y 2 ♀ 512 y 538 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1985; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Nothoprocta pentlandii doeringi

Merlo, (Jun.), 2 ♂ 252 y 286 gr y 1 ♀ 303 gr; Mina Clavero, (Ago.), 2 ♂ 267 y 274 gr y 1 ♀ 318 gr (SAS).

Comentarios. El único dato anterior sobre pesos de esta subespecie endémica de Argentina corresponde a Banks y Bohl (1968).

Nothura darwinii darwinii

Bahía San Blas, (Feb.), 2 ♂ 226 y 239 gr y 1 ej. 233 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Bump y Bump, 1969; Camperi y Darrieu, 2005).

Nothura maculosa annectens

Carhué, (Set.), 1 ej. 300 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Bump y Bump, 1969; Salvador, 1988, 2014; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Nothura maculosa paludivaga

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 268 gr (LGP).

Comentarios. El único dato anterior sobre el peso de esta subespecie en el país corresponde a Di Giacomo (2005).

Nothura maculosa nigroguttata

Valcheta, (Jul.), 1 ♂ 263 gr y 2 ♀ 286 y 308 gr (SAS).

Comentarios. El único dato anterior sobre el peso de esta subespecie endémica de Argentina corresponde a Camperi y Darrieu (2005).

Familia Anatidae

Callonetta leucophrys

Estación Bartolomé Bavio, (Oct.), 1 ♂ 435 gr y 1 ♀ 360 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en el país en el país (ver Contreras, 1986; Salvador, 2014).

Tachyeres patachonicus

Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ♀ pichón 360 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en el país (ver Murphy, 1936; Zapata, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Livezey y Humphrey, 1992; Wilson *et al.*, 2007).

Anas sibilatrix

Meseta La Siberia, (Feb.), 5 ♂ X: 889 ± 116 gr (RA: 720 a 1085), y 1 ♀ 780 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en el país (ver Crawshay, 1907; Weller, 1968; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Christie *et al.*, 2004; Salvador, 2014).

Nomonyx dominicus

Santa Teresita, (Set.), 1 ej. juv. 425 gr (LGP).

Comentarios. El único dato anterior sobre pesos de esta especie en el país corresponde a Weller (1968).

Familia Cracidae

Ortalis canicollis canicollis

Estancia La Marcela, (Set.), 3 ♀ 530, 552 y 570 gr y 1 ej. 678 gr (LGP); Cerro Colorado, (Set.), 1 ♂ 545 gr (SAS).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora,

1933; Contreras, 1986; Caziani y Protomas-tro, 1994; Salvador y Di Giácomo, 2014).

Familia Odontophoridae

Callipepla californica brunnescens

Trelew, (Mar.), 3 ♂ X: 236.3 gr (RA: 214 a 262), y 3 ♀ X: 217 gr (RA: 192 a 237) (SAS).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie introducida en nuestro país (ver Navas, 1971a; Contreras, 1975; Christie *et al.*, 2004).

Familia Podicipedidae

Podiceps gallardoi

Meseta La Siberia, (Mar.), 2 ♂ juv. (no voladores) 193.4 y 215.5 y 3 ♀ juv. (no voladores) 188.1, 188.2 y 195 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en el país (ver Rumboll, 1974; Storer, 1981).

Familia Phoenicopteridae:

Phoenicopterus chilensis

Laguna del Monte, (Abr.), 1 ♀ juv. (no voladora) 1120 gr; Lago Epecuén, (Feb., Mar.), 3 ♂ 1720, 2000 y 2500 gr y 2 ♀ 1800 y 2150 gr; Meseta La Siberia, (Ene., Mar.), 1 ♂ 2435 gr, 1 ♀ 2300 gr y 1 ♀ juv. 1140 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en el país (ver Fiora, 1933; Humphrey *et al.*, 1970; Mascitti en Navas, 1995; Salvador, 2014).

Familia Spheniscidae

Pygoscelis adeliae

Punta Strange, Islas Georgias del Sur, (Dic.), 1 pichón 960 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta especie para Argentina.

Eudyptes chrysocome chrysocome

Costa Bonita, (Nov.), 1 ♀ 1270 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.

Familia Procellariidae*Procellaria aequinoctialis*

Punta Rasa, (Abr.), 1 ej. juv. 1240 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta especie en nuestro país (Linkowski y Rembiszewski, 1978).**Familia Ardeidae***Syrigma sibilatrix sibilatrix*

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 499 gr y 1 ♀ 450 gr (LGP); Fortín el Patria, (Abr.), 1 ♂ 527 gr (SAS).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie para nuestro país (ver Contreras, 1983b; Salvador, 2014).*Egretta thula thula*

Ignacio Correas, (Oct.), 1 ♂ 380 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie para nuestro país (ver Contreras, 1983b; Salvador, 2014).**Familia Threskiornitidae***Theristicus caudatus hyperorius*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ej. 1466 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.**Familia Cathartidae***Cathartes auraruficollis*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 1920 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.*Cathartes burrovianus urubitinga*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 1206 gr (LGP).

Comentarios. El único peso anterior para esta subespecie en el país corresponde a Contreras (1979).*Coragyps atratus foetens*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 2100 gr, 1 ♀ 1900 gr y 1 ej. 2075 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Salvador, 2014).**Familia Accipitridae***Gampsonyx swainsoni swainsoni*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 120 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Contreras, 1986).*Spizaetus ornatusornatus*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 1738 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.*Busarellus nigricollis leucocephalus*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 990 gr y 1 ♀ 1070gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.*Rostrhamus sociabilis sociabilis*

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 398 y 430 gr y 2 ♀ 362 y 480 gr; Estación José Ferrari, (Abr.), 1 ♂ 360 gr; pdo. Magdalena, (May.), 1 ♂ 344 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Salvador, 2014).*Geranoospiza caerulescens flexipes*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 407 gr y 1 ♀ 425 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.*Buteogallus meridionalis*

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 800 y 861 y 1 ♀ 1134 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta especie para Argentina.

Buteogallus urubitinga urubitinga

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 1201 y 1481 gr y 1 ej. juv. 1290 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Contreras, 1983c).

Rupornis magnirostris saturatus

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 360 y 380 gr y 3 ♀ 340, 426 y 452 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contino, 1980; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Rupornis magnirostris pucherani

Pdo. Magdalena, Buenos Aires, (May.), 1 ♂ 378 gr y 1 ♀ 515 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1985; Camperi, 1992b)

Geranoaetus albicaudatus albicaudatus

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 744 gr y 1 ♀ 988 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Contino, 1980; Camperi, 1992a).

Geranoaetus melanoleucus australis

La Plata, (Jun., Jul.), 1 ♀ juv. 2470 gr y 1 ej. juv. 2370 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Humphrey *et al.*, 1970; Christie *et al.*, 2004; Salvador, 2014).

Buteo brachyurus brachyurus

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♀ juv. 505 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de

peso de esta subespecie para Argentina.

Buteo swainsoni

General Villegas, (s/f), 1 ♂ 750 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Salvador, 1988, 2014; Goldstein *et al.*, 1999).

Familia Aramidae

Aramus guarauna guarauna

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 1420 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Salvador, 2014).

Familia Rallidae

Aramides ypecaha

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♀ 640 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).

Aramides cajaneus cajaneus

Punta del Indio, (Jun.), 1 ♂ 480 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Salvador, 2014).

Porzana flaviventer flaviventer

Alto Alegre, (Nov.), 1 ♀ 23.2 gr (SAS).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.

Fulica rufifrons

Arroyo Chubicha Miní, (Oct.), 1 ♂ 735 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Salvador, 2014).

Familia Charadriidae*Pluvialis dominica*

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 106 y 140 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Salvador, 1990, 2014).*Vanellus chilensis lampronotus*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 260 gr y 1 ♀ 220 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Navas y Bó, 1986b; Camperi, 1992a; Salvador, 2014).**Familia Haematopodidae***Haematopus palliatus palliatus*

Costa Bonita, (May.), 1 ♂ juv. 440 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Camperi, 1992a).**Familia Recurvirostridae***Himantopus mexicanus melanurus*

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♀ 180 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Salvador, 2014).**Familia Pluvianellidae***Pluvianellus socialis*

Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ♀ juv. 74 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Humphrey *et al.*, 1970; Jehl, 1975).**Familia Scolopacidae***Tringa flavipes*

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ej. 69 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de

peso de esta especie en nuestro país (Salvador, 2014).

Calidris melanotos

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 70 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras, 1986; Salvador, 1988, 2014).**Familia Thinocoridae***Attagis malouinus*

Río Gallego, (Jul.), 1 ♀ 320 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta especie en nuestro país (Humphrey *et al.*, 1970).**Familia Laridae***Chroicocephalus maculipennis*

Reserva Natural Punta Lara, (Ago.), 1 ♀ 280 gr; Punta Rasa, (Abr.), 1 ej. juv. 310 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Camperi, 1992a; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).*Larus dominicanus dominicanus*

Laguna El Cervecerero, (Dic.), 3 ♀ 810, 900 y 920 gr; Meseta La Siberia, (Ene., Feb.), 1 ♀ juv. 740 gr y 1 ej. 1140 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Jehl, 1974; Contreras, 1975; Devillers, 1977; Linkowski y Rembiszewski, 1978; Camperi, 1992a; Christie *et al.*, 2004; Salvador, 2014).*Sterna hirundinacea*

Costa Bonita, (Jul.), 1 ♀ 170 gr; Caleta Olivia, (Dic.), 1 ♀ (con un huevo desarrollado) 220 gr; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Set.), 1 ♂ juv. 140 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Lisnizer *et al.*, 2014).

Familia Columbidae

Columbina picui picui

Establecimiento La Costa, (Ene., Feb.), 2 ♂ 42 y 45 gr y 3 ej. juv. 40, 47 y 51 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Salvador, 1988, 2014; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; Blendinger, 1999; Christie *et al.*, 2004; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Di Giacomo y Salvador, 2014).

Leptotila verreauxi chalcauchenia

Establecimiento La Costa, (Ene.), 1 ej. 210 gr; Finca Isla de Carrasco, (Jul.), 1 ej. 195 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Fraga, 1983; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Familia Cuculidae

Guira guira

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 103 gr; La Plata, (Set.), 1 ej. 130 gr (LGP); Fortín El Patria, (Abr.), 2♂ 131 y 143 gr y 1 ♀ 161 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Contino, 1980; Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Darrieu *et al.*, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Familia Tytonidae

Tyto alba tuidara

Pdo. Saladillo, Buenos Aires, (Set.), 1 ♀ 370

gr; Estancia La Marcela, (Set.), 1 ej. 463 gr; pdo. Tordillo, (Abr., Ago.), 2 ♀ 400 y 420 gr y 1 ej. 390 gr; pdo. General Alvear, (Ago.), 1 ♂ 280 gr (LGP); Azul, (May.), 1 ♂ 332 gr y 1 ♀ 376 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1975; Salvador, 1988, 2014; Christie *et al.*, 2004).

Familia Strigidae

Megascops choliba wetmorei

Estancia La Marcela, (Jun.), 2 ♂ 140 y 156 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Glaucidium brasilianum brasilianum

Villa Adelia, (Mar.), 1 ♂ 68 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; König y Wink, 1995; Blendinger, 2005; Salvador, 2014).

Athene cunicularia cunicularia

Carhué, (Mar.), 1 ♀ 220 gr; Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 2 ♂ 162.3 y 200 gr; pdo. General Alvear, (Ago.), 1 ♂ 200 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Camperi, 1992a, 1992b; Navas y Bó, 2001; Camperi y Darrieu, 2005; Salvador, 2014).

Pseudoscops clamator midas

San Clemente del Tuyú, (Oct.), 1 ej. 670 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contino, 1980; Salvador, 1988, 2014).

Familia Caprimulgidae*Chordeiles nacunda nacunda*

Añatuya, (Dic.) 1 ♀ 173 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Salvador, 1988, 2014; Di Giacomo, 2005, 2014).*Systemellura longirostris patagonicus*

Frías, (May.), 1 ♂ 59.8 gr; General Acha, (Feb.) 1 ♂ 53 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Camperi, 1992b; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).*Setopagis parvulus parvulus*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 40 gr; dto. Rivadavia, Salta, (Nov.), 1 ♂ 41 gr (LGP); La Merced, (Feb., Abr.) 1 ♂ 31.3 gr y 1 ♀ 30.6 gr; Los Amores, (Dic.), 1 ♂ 37 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Contreras *et al.*, 1994; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).*Hydropsalis torquata furcifera*

Estancia La Marcela, (Ago., Set.), 2 ♀ 56 y 56 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Camperi, 1992b; Navas y Bó, 2001; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).*Antrostomus rufus saltarius*

Forestal Rio Seco, (Nov.), 1 ♀ 87.4 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.**Familia Trochilidae***Heliomaster furcifer*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 5.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre

el peso de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Thalurania furcata baeri

Parque Provincial de la Sierra, (May.), 1 ♂ 5.1 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.*Amazilia chionogaster hypoleucus*

Finca Isla de Carrasco, (Jul.), 1 ej. 6.0 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988; Salvador y Di Giacomo, 2014).*Hylocharis chrysur*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ej. 4.0 gr; Establecimiento La Costa, (Feb.), 1 ej. 4.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).**Familia Trogonidae***Trogon surrucura surrucura*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 65 gr y 1 ♀ 56.3 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Conteras, 1985).**Familia Alcedinidae***Chloroceryle americana mathewsii*

La Plata, (Feb.), 1 ♂ 30 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).

Familia Bucconidae*Nystalus maculatus striatipectus*

Frías, (Mar., Nov.), 1 ♂ 41.6 gr y 1 ♀ 37.8 gr; La Merced, (Abr.), 1 ♂ 39,8 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988, 2014).

Familia Picidae*Picumnus cirratus pilcomayensis*

Estancia La Marcela, (Set.), 3 ♂ 8.0, 8.2 y 8.9 gr y 1 ♀ 6.3 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Contreras, 1983a; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).

Melanerpes candidus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 104.6 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Short, 1970; Contreras, 1983a; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Veniliornis passerinus olivinus

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 31 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Short, 1971; Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005).

Piculus chrysochloros chrysochloros

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 51.4 gr y 1 ♀ 57 gr (LGP).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Short, 1970).

Colaptes melanochloros nigroviridis

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 136.2 gr y 1 ♀ 127.9 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Short, 1972; Camperi y Darrieu, 2005).

Colaptes campestris campestris

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 168 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país (ver Short, 1972; Contreras, 1983a; Salvador, 1988; Camperi, 1992a, 1992b; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Celeus lugubris kerri

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 112.1 gr y 2 ♀ 119 y 121.1 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país (ver Short, 1970, 1971).

Campephilus leucopogon

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 242 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Short, 1970; Contreras, 1983a; Camperi 1992b).

Familia Cariamidae*Cariama cristata*

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♂ 1960 gr y 1 ♀ 2225 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Familia Falconidae*Spizapteryx circumcincta*

Anillaco, (Dic.), 1 ♂ 162 gr (SAS).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Short, 1967; Contreras, 1986; Navas y Bó, 1986; Camperi, 1992a; Salvador, 2014)

Caracara plancus plancus

Estancia La Marcela, (Jun.), 2 ♀ 1270 y 1082 gr; pdo. de Magdalena, (May.) 1 ♀ 1553 gr; Vieytes, (Jun.) 1 ♀ 1593 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Salvador, 2014).

Milvago chimachima chimachima

Estancia La Marcela, (Jun.), 2 ♂ 268 y 297 gr y 1 ♀ 317 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1986; Di Giacomo, 2005).

Falco sparverius cinnamominus

La Plata, (Jun.), 1 ♂ 95 gr; Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 92 gr y 1 ♀ 108 gr; Estación José Ferrari, (Abr.), 1 ♂ 130 gr y 1 ♀ 140 gr; Carhué, (Set.), 1 ♂ 102 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Christie *et al.*, 2004; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Falco femoralis femoralis

Establecimiento La Costa, (Jul.), 1 ♂ 260 gr; Estación Julio Ardití, (May), 1 ♂ 244 gr y 1 ♀ 378 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1975; Salvador, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Falco peregrinus cassini

Cabo Vírgenes, (Abr.), 1 ♀ subadulta 750 gr; La Plata, (Nov.), 1 ♂ 410 gr (LGP). **Comentarios.** Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Humphrey *et al.*, 1970; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Familia Psittacidae*Myiopsitta monachus monachus*

La Plata, (May.), 4 ej. X: 123 gr (RA: 117-127) (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Humphrey y Peterson, 1978; Camperi, 1992b; Aramburú, 1995; Eberhard, 1998).

Enicognathus ferrugineus minor

Cabo Vírgenes, (Abr.), 1 ♂ 155 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Contreras, 1975; Christie *et al.*, 2004).

Cyanoliseus patagonus andinus

Huaco, (Set.), 1 ♂ 267 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie endémica de Argentina.

Thectocercus acuticaudata acuticaudata

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 160.4 y 176.9 gr (LGP); Mina Clavero, (Ago.), 1 ♂ 198 gr y 1 ♀ 177 gr (SAS).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Zapata y Martínez, 1972; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Thamnophilidae*Taraba major major*

Estancia La Marcela, (Jun., Ago., Set.), 8 ♂ X: 50.7 ± 1.81 gr (RA: 47.7a 53.8), y 1 ♀ 47.5 gr (LGP); Villa María, (Nov.), 1 ♀ 52 gr (SAS).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Thamnophilus caerulescens dinellii

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 18.3 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Salvador, 1990, 2014; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Melanopareiidae*Melanopareia maximiliani argentina*

Mina Clavero, (Ago.), 2 ej. 16.9 y 18.2 gr (SAS).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.**Familia Furnaridae***Geositta rufipennis giayi*

Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ♀ 58 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1976; Contreras y Davis, 1980; Navas y Bó, 1987).*Geositta antarctica*

Meseta La Siberia, (Mar.), 1 ♂ 36.5 gr y 1 ♀ 32 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.*Dendrocolaptes platyrostris platyrostris*

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♀ 60 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Darrieu y Camperi, 1990; Di Giacomo, 2005; Cockle y Bodrati, 2009; Capllonch *et al.*, 2015).*Dendrocolaptes picumnus casaresi*

Acambuco, (Jul.), 1 ej. 68 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014).*Xiphocolaptes major major*

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 143 y 150.6 gr y 1 ♀ 148 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1983b; Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2010).*Campylorhamphus trochilirostris hellmayri*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 46.8 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Short, 1971; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).*Lepidocolaptes angustirostris angustirostris*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 27.8 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Di Giacomo 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014).*Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus*

Meseta La Siberia, (Feb.), 1 ej. 31 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Navas, 1971b; Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1990).*Furnarius rufus rufus*

Establecimiento La Costa, (Feb.), 4 ej. X: 60 gr (RA: 57 a 63); La Plata, (May.), 1 ej. 52 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Fraga, 1980; Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1987a; Darrieu y Camperi, 1990; Camperi, 1992b; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).*Furnarius cristatus*

Mina Clavero, (Ago.), 2 ej. 24.8 y 26.2 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Navas y Bó, 1987; Salvador, 1990; Alderete y Capllonch, 2010).

Cinclodes atacamensis schocolatinus

Pampa de Achala, (Dic.), 1 ej. 47.7 gr (SAS).

Comentarios. Solo existe un registro de peso de esta subespecie en nuestro país (Navas y Bó, 1987).

Coryphistera alaudina

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♀ 32.8 y 34.6 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Phacellodomus ruber

Estancia La Marcela, (Sep.), 1 ej. 31.7 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Schoeniophylax phryganophila phryganophila

Estancia La Marcela, (Jun.), 1 ♂ 17 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Familia Tyrannidae

Camptostoma obsoletum obsoletum

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 7.9 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Suiriri suiriri suiriri

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 16.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Darrieu y Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador, 2014).

Serpophaga griseicapilla

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 4.8 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Straneck, 1993; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Salvador, 2014).

Pseudocolopteryx citreola

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ej. 9.0 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato concreto de peso de esta especie para Argentina.

Corythopsis delalandi

Acambuco, (Jul.), 1 ej. 16.2 gr (LGP).

Comentarios. El único dato de peso para esta especie en el país corresponde a Darrieu y Camperi (1987).

Sublegatus modestus breviostris

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ♂ 10.6 y 12 gr (LGP).

Comentarios. Para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Salvador, 1988, 2014; Darrieu y Camperi, 1992; Navas y Bó, 2001; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 8.6 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988, 1990; Darrieu y Camperi, 1992; Camperi, 1992b, Di Giacomo 2005, Alderete y Capllonch 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Tolmomyias sulphurescens griseescens

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 13.4 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Pyrocephalus rubinus rubinus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 13.1 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras y Davies, 1980; Darrieu y Camperi 1992; Navas y Bó, 2001; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador, 2014).

Lessonia oreas

Cortaderas, (Dic.), 1 ♂ 14.1 gr (SAS).

Comentarios. El único dato de peso para esta especie en el país corresponde a Fiora (1934).

Muscisaxicola capistratus

Meseta La Siberia, (Mar.), 1 ♀ 26 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Humphrey *et al.*, 1970; Vuilleumier, 1994).

Xolmis irupero irupero

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 28.5 gr; Payró, (Jun.), 1 ej. 28 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora 1934, Zapata y Martínez 1972, Contreras 1979, Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Pitangus sulphuratus argentinus

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 65.5 gr; La

Plata, (Nov.), 1 ej. juv. 66 gr (LGP); Villa Adelia, (May.), 1 ♂ juv. 69 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora 1934, Contreras 1979, Contreras y Davies 1980, Salvador 1988, Navas y Bó 1990 y 2001, Darrieu y Camperi 1992, Camperi 1992b, Di Giacomo 2005, Montaldo 2005, Alderete y Capllonch 2010).

Empidonomus aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 24.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Darrieu y Camperi, 1992; Navas y Bó, 2001; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador 2014).

Myiarchus tyrannulus tyrannulus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 28.3 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Lanyon, 1978; Contreras, 1979; Darrieu y Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Salvador, 2014).

Familia Tityridae*Pachyramphus polychopterus spixii*

Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 1 ♂ 25.5 gr y 1 ♀ 26.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1991; Alderete y Capllonch, 2010).

Familia Vireonidae*Cyclarhis gujanensis ochrocephala*

Establecimiento La Costa, (Feb.), 1 ej. 32 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre

el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Darrieu y Camperi, 1993).

Vireo olivaceus chivi

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 15 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Salvador, 1988, 2014; Di Giacomo, 2005).

Familia Corvidae

Cyanocorax cyanomelas

Estancia La Marcela, (Jun., Set.), 1 ♀ 190.5 gr y 1 ej. 176 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Cyanocorax chrysops chrysops

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 153.3 gr y 2 ej. 138.1 y 151.8 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Hirundinidae

Progne tapera fusca

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 35.3 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Progne chalybea macrorhamphus

La Plata, (Mar.), 1 ej. juv. 28.5 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.

Hirundo rustica erythrogaster

Pdo. Punta Indio, Buenos Aires, (Feb.), 1 pichón 21.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre

el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Salvador, 2014).

Familia Turdidae

Turdus falcklandii magellanicus

Estancia La Paloma, (Dic.), 1 ♀ 53 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1975; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; Christie *et al.*, 2004; Camperi y Darrieu, 2005; Grigera y Trejo, 2007).

Turdus rufiventris rufiventris

Establecimiento La Costa, (Feb.), 11 ej. X: 78.2 gr (RA: 68-88); Finca Isla de Carrasco, (Jul.), 1 ej. 75 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Salvador, 1988, 1990; Di Giacomo, 2005; Montaldo, 2005; Auer *et al.*, 2007; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Turdus amaurochalinus

Establecimiento La Costa, (Feb.), 3 ej. 63, 63 y 68 gr; Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 56.9 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Salvador, 1988, 2014; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Montaldo, 2005).

Familia Sturnidae

Sturnus vulgaris vulgaris

La Plata, (Set.), 1 ♂ 75.5 gr y 1 ♀ 73.5 gr (LGP).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.

Familia Motacilidae

Anthus lutescens lutescens

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 15.5 gr (LGP).

Comentarios. El único dato de peso para

esta especie en el país corresponde a Salvador (2014).

Familia Thraupidae

Paroaria coronata

Estancia La Marcela, (Ago.), 1 ♂ 32gr; Establecimiento La Costa, (Feb.), 1 ej. 41 gr; Chascomús, (Mar.), 1 ej. juv. 39.5 gr (LGP); Gualeguay, (Feb.), 1 ♂ 36.6 gr (SAS). **Comentarios.** Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país ver (Salvador 1988, 2014; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Paroaria capitata capitata

Estancia La Marcela, (Set.), 4 ej. X: 21.1 gr (RA: 20.3-21.7) (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador, 2014).

Thraupis bonariensis bonariensis

Establecimiento La Costa, (Mar.), 1 ej. juv. 37 gr (LGP).

Comentarios. El único dato de peso para esta subespecie en el país corresponde a Darrieu y Camperi (1994).

Conirostrum speciosum speciosum

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 8.8 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1993).

Phrygilus carbonarius

Fortín El Patria, (Abr.), 2 ♂ 16.2 y 17.8 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988, 1990, 2014; Camperi, 1992a; Blendinger y Ojeda, 2001; Alderete y Capllonch, 2012).

Sicalis auriventris

Meseta La Siberia, (Feb., Mar.), 4 ♂ X: 26.7 gr (RA: 25 a 27.5), y 1 ♀ 26 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Navas, 1964; Navas y Bó, 2000; Alderete y Capllonch, 2012).

Sporophila caerulescens caerulescens

Establecimiento La Costa, (Feb.), 1 ♀ 10.5 gr y 1 ej. juv. 10 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Ortiz y Capllonch, 2007; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Incertae sedis

Saltator coerulescens coerulescens

Estancia La Marcela, (Set.), 3 ♂ 55, 55.4 y 58.3 gr y 1 ej. 56.3 gr (LGP); Frías, (May.), 1 ♀ 61.4 gr y 1 ej. 63 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Salvador, 1990, 2014; Camperi, 1992b; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador y Di Giacomo 2014).

Saltator similis similis

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ej. 39.4 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Darrieu y Camperi, 1996; Alderete y Capllonch, 2012).

Saltator maxillosus

Reserva y Área Experimental Guaraní, (Oct.), 1 ej. juv. 79 gr (A. Bodrati y N. Fariña in litt.).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta especie para Argentina.

Saltator aurantirostris aurantirostris

Los Morteros, (Jun.), 2 ♂ 43.7 y 47.8 gr; Frías, (May.) 2 ♀ 41.2 y 43.9 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Salvador 1988, 2014; Navas y Bó, 1991; Camperi, 1992b; Darrieu y Camperi, 1996; Alderete y Capllonch, 2012).

Familia Emberizidae:*Ammodramus humeralis xanthornus*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 18.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Zonotrichia capensis argentina

Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 1 ♂ 21 gr, 15 ej. X: 23 ± 1.49 gr (RA: 21.5 a 27), 4 ej. subadultos X: 23.2 gr (RA: 22 a 24), y 5 ej. juv. X: 25 ± 1.22 gr (RA: 23 a 26.5) (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Piloni, 2004).

Arremon flavirostris polionotus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 26.9 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Alderete y Capllonch, 2012; Di Giacomo, 2005).

Familia Cardinalidae*Cyanocompsa brissonii argentina*

Los Morteros, (May.), 1 ♂ 25.3 gr; Frías, (Jul.), 2 ♀ 24.5 y 26.8 gr (SAS).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país

(ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1990; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador, 2014).

Familia Parulidae*Setophaga pitiayumi pitiayumi*

Establecimiento La Costa, (Mar.), 2 ej. 7.0 y 8.0 gr y 1 ej. juv. 8.5 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora 1934, Contreras 1979, Camperi 1992a y 1992b, Darrieu y Camperi 1993, Di Giacomo 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Familia Icteridae*Cacicus solitarius*

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 65.3 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Contreras, 1983c; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Cacicus chrysopterus

Estancia La Marcela, (Set.), 2 ej. 26.9 y 41 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Contreras, 1983b; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Icterus pyrrhopterus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 25 gr; Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 3 ej. 24, 33.5 y 36 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta especie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Gnorimopsar chopi chopi

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 94 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre

el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Fraga, 2008; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Agelasticus cyanopus cyanopus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♀ 29.1 gr y 1 ej. 32.6 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Contreras, 1979; y Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Chrysomus ruficapillus ruficapillus

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ♂ 42 gr; La Plata, (May.), 1 ♂ 46 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Agelaioides badius badius

Establecimiento La Costa, (Feb., Mar.), 6 ej. X: 44.7 ± 1.60 gr (RA: 41.5 a 46.5) (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Salvador, 1988; Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014; Salvador 2014).

Molothrus bonariensis bonariensis

Estancia La Marcela, (Set.), 1 ej. 47 gr (LGP).

Comentarios. Para más información sobre el peso de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1934; Contreras, 1975, 1979; Contino, 1980; Fraga, 1985; Mason, 1987; Salvador, 1990, 2014; Mermoz y Rebores, 1994; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darriue, 2005; Salvador y Di Giacomo, 2014).

Familia Fringilidae

Spinus magellanicus tucumana

Balcozna de Afuera, (Jul., Ago.) 2 ♂ 12.8 y 13.3 gr y 2 ♀ 12.1 y 13.9 gr (SAS).

Comentarios. Este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.

AGRADECIMIENTOS

A Alejandro Bodrati y a Néstor Fariña por el dato de peso del Pepitero Picudo.

BIBLIOGRAFÍA

- Alderete, C. y Capllonch, P. 2010. El peso de aves en familias pertenecientes al orden Suboscines en la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 58: 1-5.
- Alderete, C. y Capllonch, P. 2012. Peso de aves de las Familias Emberizidae y Cardinalidae en la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 94: 1-10.
- Aramburú, R.M. 1995. Ciclo anual de muda, peso corporal y gónadas en la Cotorra Común (*Myiopsitta monachus monachus*). *Ornitología Neotropical*, 6: 81-85.
- Auer, S.K., Bassar, R.D., Fontaine, J.J. y Martin, T.E. 2007. Breeding biology of passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. *Condor*, 109: 321-333.
- Banks, R.D. y Bohl, W.H. 1968. Pentland's Tinamou in Argentina (Aves: Tinamidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 81: 485-490.
- Blendinger, P.G. 1999. Facilitation of sap-feeding birds by the Withe-Fronted Woodpecker in the monte desert, Argentina. *Condor*, 101: 402-407.
- Blendinger, P.G. 2005. Abundance and diversity of small-bird assemblages in the Monte desert, Argentina. *Journal of Arid Environments*, 61: 567-587.
- Bump, G. y Bump, J. 1969. A study of the Spotted Tinamous and the Pale Spotted Tinamous of Argentina. *United States Department of the Interior, Special Scientific Report Wildlife*, 120: 1-160.
- Camperi, A.R. 1992a. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Neotrópica*, 38: 127-140.
- Camperi, A.R. 1992b. Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. *Hornero*, 13: 225-229.
- Camperi, A.R. y Darriue, C.A. 2005. Aves del Alto Valle del Río Negro, Argentina. *Revista del*

- Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 7: 51-56.
- Capllonch, P., Alderete, C.A., Aráoz, R., Ceron, G.; Mamani, J.C., Quiroga, O. y Soria, K. 2015. Caracterización y parámetros biométricos de la avifauna en un fragmento de Selva Atlántica en Misiones, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 59: 124-140.
- Caziani, S.M. y Protomastro, J.J. 1994. Diet of the Chaco Chachalaca. *Wilson Bulletin*, 106: 640-648.
- Christie, M.I., Ramilo, E.J. y Bettinelli, M.D. 2004. *Aves del noroeste patagónico*. Editorial L.O.L.A., Buenos Aires.
- Cockle, K. y A. Bodrati. 2009. Nesting of the Planalto Woodcreeper (*Dendrocolaptes platyrostris*). *Wilson Journal of Ornithology*, 121:789-795.
- Contino, F.N. 1980. *Aves del noroeste argentino*. Universidad Nacional de Salta.
- Contreras, J.R. 1975. Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. *Physis*, 88: 97-107.
- Contreras, J.R. 1976. Una nueva subespecie de *Geositta rufipennis* procedente de las cercanías de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina (Aves, Furnariidae). *Physis*, 35: 213-220.
- Contreras, J.R. 1979. Bird weights from northeastern Argentina. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, 99: 21-24.
- Contreras, J.R. 1983a. Notas sobre el peso de aves argentinas. I. *Historia Natural*, 3: 16.
- Contreras, J. R. 1983b. Notas sobre el peso de aves argentinas. II. *Historia Natural*, 3: 39-40.
- Contreras, J.R. 1983c. Notas sobre el peso de aves argentinas. III. *Historia Natural*, 3: 95-96.
- Contreras, J.R. 1985. Notas sobre el peso de aves argentinas. IV. *Historia Natural*, 5: 319-320.
- Contreras, J.R. 1986. Notas sobre el peso de aves argentinas. V. *Historia Natural*, 6: 100.
- Contreras, J.R. y Davies, Y. 1980. Aportes para el conocimiento del peso de las aves argentina. *Revista Asociación Ciencias Naturales del Litoral*, 11: 21-29.
- Contreras, J.R., Krauczuk, E.R., Giraudo, A.R., Johnson, A.E., Garello, A.A. y Davies, Y.D. 1994. Notas sobre aves de la provincia de Misiones, República Argentina. I. *Nótulas Faunísticas*, 53: 1-13.
- Crawshay, R. 1907. *The birds of Tierra del Fuego*. Bernard Quaritch. London.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1990. Estudio de una colección de aves de Corrientes. 1. (Dendrocolaptidae, Furnariidae). *Hornero*, 13: 138-146.
- Darrieu, C.A. y Camperi, R.A. 1992. Estudio de una colección de aves de Corrientes. III. (Tyrannidae). *Hornero*, 13: 219-224.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1993. Estudio sobre la avifauna de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae). *Neotrópica*, 39: 83-92.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1994. Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thaupidae e Icteridae. *Neotrópica*, 40: 49-55.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1996. Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). *Neotrópica*, 42: 69-75.
- Darrieu, C.A., Camperi, A.R. y Montalti, D. 2010. Fluctuación anual de la masa corporal, tamaño de gónadas y muda de *Guirra guirra* (Aves, Cuculiformes: Cuculidae). *Acta Zoológica Lilloana*, 54: 161-165.
- Devillers, P. 1977. Observations at a breeding colony of *Larus (belcheris) atlanticus*. *Le Gerfaut*, 67: 22-43.
- Di Giacomo, A.G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp.: 203-465, en Di Giacomo, A.G. y Krapovickas, S.F. (eds.). *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
- Eberhard, J.R. 1998. Breeding biology of the Monk Parakeet. *Wilson Bulletin*, 110: 463-473.
- Fiora, A. 1933. El peso de las aves. *Hornero*, 5: 174-188.
- Fiora, A. 1934. El peso de las aves. *Hornero*, 5: 353-365.
- Fraga, R.M. 1980. The breeding of the Rufous Hornero (*Furnarius rufus*). *Condor*, 82: 58-68.
- Fraga, R.M. 1983. Conducta vocal y reproductiva de la Yerutí Común (*Leptotilaverreauxi*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. *Hornero*, 12: 89-95.
- Fraga, R.M. 1985. Host-parasite interactions between Chalk-browed Mocking-birds and Shiny Cowbird. *Neotropical Ornithology*, 36: 829-844.
- Fraga, R.M. 2008. Notes of nesting of Chopi Black-birds (*Gnorimopsar chopi*) in Argentina and Paraguay, with data on cooperative breeding and brood parasitism by Screami Cowbirds (*Molothrus rufoaxillaris*). *Ornitología Neotropical*, 19: 299-303.
- Goldstein, M.I., Blom, P.H., Sarasola, J.H. y Lacher, T.E. 1999. Post-migration weight gain of Swainson's Hawks in Argentina. *Wilson Bulletin*, 111: 428-432.

- Grigera, D. y Trejo, A. 2007. Relaciones de tamaño entre depredador y presa en un grupo de Passeriformes Patagónicas. *Ornitología Neotropical*, 18: 535-541.
- Humphrey, P.S. y Peterson, R.T. 1978. Nesting behavior and affinities of Monk Parakeets of southern Buenos Aires province, Argentina. *Wilson Bulletin*, 90: 544-552.
- Humphrey, P.S., Bridge, D., Reynolds, P.W. y Peterson, R.T. 1970. *Birds Isla Grande (Tierra del Fuego)*. University of Kansas, Museum of Natural. Washington. 543 pp.
- Jehl, J.R., Jr. 1974. The distribution and ecology of marine birds over the continental shelf of Argentina in winter. *Transactions of San Diego Society of Natural History*, 17: 217-234.
- Jehl, J.R., Jr. 1975. *Pluvianellus socialis*: biology, ecology, and relationships of an enigmatic Patagonian shorebird. *Transactions of San Diego Society of Natural History*, 18: 29-73.
- Lanyon, W.E. 1978. Revision of the *Myiarchus* Flycatcher of South America. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 161: 429-627.
- Linkowski, T.B. y Rembiszewski, J.M. 1978. Distribution of sea birds of Argentina coast and the feeding habits of the birds fauna in the Drake Passage and Scotia Sea. *Polskie Archiwum Hydrobiologii*, 25: 717-727.
- Lisnizer, N., Cotichelli, L., Yorio, P., Basso, N. y Gatto, A. 2014. Using Morphometry and Molecular Markers for Sexing South American, Cayenne and Royal Terns Breeding in Patagonia, Argentina. *Waterbirds*, 37: 183-190.
- Livezey, B.C. y Humphrey, P.S. 1992. Taxonomy and identification of Steamer-Ducks (Anatidae: *Tachyeres*). *University of Kansas Museum of Natural, Monograph*, 8: 1-125.
- König, C. y Wink, M. 1995. Eine neue unterart des Brasil-spielingskauzes aus zentralargentinien: *Glacidium brasilianum stranecki* n. ssp. *Journal für Ornithologie*, 136: 461-465.
- Mason, P. 1987. Pair formation in Cowbirds: evidence found for Screaming but not Shiny Cowbirds. *Condor*, 89: 349-356.
- Mermoz, M.E. y Reboreda, J.C. 1994. Brood parasitism of the Shiny Cowbird, *Molothrus bonariensis*, on the Brown-and-Yellow Marshbird, *Pseudoleistes virescens*. *Condor*, 96: 716-721.
- Montaldo, N.H. 2005. Aves frugívoras de un relicto de selva subtropical, ribereña en Argentina: manipulación de frutos y destino de las semillas. *Hornero*, 20: 163-172.
- Murphy, R.C. 1936. *Oceanic birds of South America*. American Museum of Natural History. New York. 123 pp.
- Navas, J.R. 1964. Nota sobre la distribución geográfica de *Sicalisauroventris* y *Sicalis u. uropygialis* (Aves, Fringilidae). *Neotrópica*, 10: 36-39.
- Navas, J.R. 1971a. Notas sobre aves del Parque Nacional Nahuel Huapi. *Neotrópica*, 17: 153-156.
- Navas, J.R. 1971b. Estudio sobre la avifauna andinopatagónica. I. Géneros "*Upucerthia*, *Ochetorhynchus* y *Eremobius*" (Furnariidae). *Revista Museo Argentino Ciencias Naturales*, 7: 267-304.
- Navas, J. R. 1995. Aves Ciconiiformes, Threskiornithidae y Phoenicopteridae. En: *Fauna de Agua Dulce de la República Argentina*. Vol. 43, Fasc. 1 C. Conicet. La Plata.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1986a. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihuel Calel, La Pampa, Argentina. *Hornero*, 12: 250-261.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1986b. Revisión de las subespecies argentinas de *Vanellus chilensis* (Aves, Charadriidae). *Neotrópica*, 32: 157-165.
- Navas, J. R. y Bó, N.A. 1987. Notas sobre Furnariidae argentinos. (Aves, Passeriformes). *Revista Museo Argentino Ciencias Naturales*, 14: 55-86.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1990. Apuntes sobre aves de la Meseta de Somuncurá, Provincia de Río Negro. *Neotrópica*, 36: 45-53.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1991. Anotaciones taxonómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves, Passeriformes). *Revista Museo La Plata*, 14: 119-134.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 2000. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Primera parte. (Aves: Phytotomidae, Mimidae, Troglodytidae, Motacillidae, Emberizidae y Fringillidae). *Hornero*, 15: 123-127.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 2001. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de las aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Segunda parte. (Aves: Falconidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, Caprimulgidae, Apodidae, Furnariidae, Rhynocryptidae y Tyrannidae). *Hornero*, 16: 31-37.
- Piloni, G. 2004. Revisión sistemática de las subespecies de *Zonotrichia capensis* (P. I. S. Müller) (Aves: Emberizidae) y su distribución geográfica en la República Argentina. *Physis*, 60: 1-23.

- Remsen, J.V., Jr., Cadena, C.D., Jaramilo, A., Norens, M., Pacheco, J.F., Pérez Emán, J., Robbins, M.B., Stiles, F.G., Stotz, D.F. y Zimmer, K.J. Versión [2015]. A classification of the bird species of South America. <<http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SAC-CBaseline.html>> (27 dic. 2015).
- Rumboll, M.A.E. 1974. Una nueva especie de Macá (Podicipedidae). *Comunicaciones Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 4: 33-35.
- Salvador, S.A. 1988. Datos de peso de aves argentinas. *Hornero*, 13: 78-83.
- Salvador, S.A. 1990. Datos de pesos de aves argentinas. 2. *Hornero*, 13: 169-171.
- Salvador, S.A. 2012. Dieta y reproducción del Halcón Aplomado (*Falco femoralis femoralis*) en Villa María, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (tercera serie)*, 2: 111-118.
- Salvador, S.A. 2014. Peso de las aves del Departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Revista Biológica*, 17: 48-57.
- Salvador, S.A. y Di Giacomo, A.G. 2014. Datos de pesos de aves argentinas. Parte 3. *Historia Natural (Tercera serie)*, 4: 63-88.
- Short, L.L. 1967. Some unusual birds of southern Buenos Aires Province. *Hornero*, 10: 459-460.
- Short, L.L. 1970. Notes on the habits of some Argentine and Peruvian woodpeckers (Aves, Picidae). *American Museum Novitates*, 2413: 1-37.
- Short, L.L. 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. *Revista Museo Argentino Ciencias Naturales*, 9: 283-309.
- Short, L.L. 1972. Systematics and behavior of South American Flickers (Aves, Colaptes). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 149: 1-110.
- Storer, R.W. 1981. The Hooded Grebe on Laguna de los Escarchados: ecology and behavior. *The Living Bird*, 19: 51-67.
- Straneck, R.J. 1993. Aportes para la unificación de *Serpophaga subcristata* y *Serpophaga munda*, y la revalidación de *Serpophaga griseiceps* (Aves: Tyrannidae). *Revista Museo Argentino Ciencias Naturales*, 16: 51-63.
- Vuilleumier, F. 1994. Nesting, behavior, distribution, and speciation of patagonian and andean ground Tyrans (*Myiotheretes*, *Xolmis*, *Neoxolmis*, *Agriornis* and *Muscisaxicola*). *Ornitología Neotropical*, 5: 1-55.
- Weller, M.W. 1968. Notes on some Argentine anatids. *Wilson Bulletin*, 80: 189-212.
- Wilson, R.E., Sonsthagen, S.A., Barger, C.P. y McCracken, K.G. 2007. Asymmetric molt or feather wear in Flying Steamer Ducks (*Tachyeres patagonicus*) from coastal habitats in Argentina. *Ornitología Neotropical*, 18: 293-300.
- Zapata, A.R.P. 1967. Observaciones sobre aves de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz. *Hornero*, 10: 351-378.
- Zapata, A.R.P. y Martínez, H.S. 1972. Algunas aves no citadas y otras poco frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. *Acta Zoológica Lilloana*, 29: 181-199.

Recibido: 12/08/2016 - Aceptado: 03/11/2016 - Publicado: 27/03/2017

APÉNDICE 1. Información sobre las localidades citadas en el texto, ordenadas por orden alfabético. Coordenadas, departamento o partido y provincia.

Acambuco (22° 14' S, 63° 51' O) 20 km al sur, dto. José de San Martín, Salta
 Alto Alegre (32° 20' S, 62° 53' O), dto. Unión, Córdoba
 Anillaco (27° 59' S, 67° 35' O), dto. Tinogasta, Catamarca
 Añatuya (28° 28' S, 62° 50' O), dto. General Taboada, Santiago del Estero
 Arroyo Chubicha Miní (35° 07' S, 57° 41' O), pdo. Magdalena, Buenos Aires
 Azul (36° 47' S, 59° 51' O), pdo. Azul, Buenos Aires
 Bahía San Blas (40° 33' S, 62° 14' O), pdo. Patagones, Buenos Aires
 Balcozna de Afuera (27° 52' S, 65° 44' O), dto. Paclín, Catamarca
 Chascomús (35° 34' S, 58° 00' O), pdo. Chascomús, Buenos Aires
 Carhué (37° 10' S, 62° 45' O), pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires
 Cabo Vírgenes (51° 37' S, 69° 12' O), dto. Güer Aike, Santa Cruz
 Cerro Colorado (30° 05' S, 63° 55' O), dto. Tulumba, Córdoba
 Conhelo (36° 01' S, 64° 36' O), dto. Conhelo, La Pampa
 Cortaderas (27° 33' S, 68° 10' O), dto. Tinogasta, Catamarca
 Costa Bonita (38° 40' S, 58° 38' O), pdo. Lobería, Buenos Aires
 Establecimiento La Costa (35° 10' S, 57° 20' O), pdo. Magdalena; Buenos Aires
 Estación Bartolomé Bavio (35° 04' S, 57° 45' O), pdo. La Plata, Buenos Aires
 Estación José Ferrari (35° 17' S, 57° 51' O), pdo. Magdalena, Buenos Aires
 Estación Julio Ardití (35° 13' S, 57° 65' O), pdo. Magdalena, Buenos Aires
 Estancia la Marcela (26° 17' S, 59° 08' O), dto. Pirané, Formosa
 Estancia La Paloma (47° 07' S, 70° 56' O), dto. Lago Buenos Aires, Santa Cruz
 Finca Isla de Carrasco (23° 00' S, 64° 14' O), dto. José de San Martín, Salta
 Forestal Río Seco (22° 31' S, 64° 00' O), dto. José de San Martín, Salta
 Fortín El Patria (34° 46' S, 65° 31' O), dto. Gobernador Dupuy, San Luis
 Frías (28° 37' S, 65° 07' O), dto. Choya, Santiago del Estero
 General Acha (37° 22' S, 64° 36' O), dto. Utracán, La Pampa
 General Villegas (35° 02' S, 63° 01' O), pdo. General Villegas, Buenos Aires
 Gualaguay (33° 09' S, 59° 20' O), dto. Gualaguay, Entre Ríos
 Huaco (30° 08' S, 68° 30' O), dto. Jáchal, San Juan
 Ignacio Correas (35° 02' S, 57° 49' O), pdo. La Plata, Buenos Aires
 Lago Epecuén (37° 08' S, 62° 51' O), Carhué, pdo. Adolfo Alsina, Buenos Aires
 Meseta La Siberia (49° 01' S, 71° 44' O), dto. Río Chico, Santa Cruz
 Laguna El Cervecero (47° 09' S, 71° 16' O), dto. Lago Buenos Aires, Santa Cruz
 Laguna del Monte (37° 01' S, 62° 25' O), pdo. Guamini, Buenos Aires
 La Merced (28° 09' S, 65° 40' O), dto. Paclín, Catamarca
 La Plata (34° 56' S, 57° 57' O), pdo. La Plata, Buenos Aires
 Laprida (37° 32' S, 60° 49' O), pto. Laprida, Buenos Aires
 Los Amores (28° 06' S, 59° 58' O), dto. Vera, Santa Fe
 Los Morteros (28° 27' S, 65° 11' O), dto. El Alto, Catamarca
 Mina Clavero (31° 43' S, 65° 00' O), dto. San Alberto, Córdoba
 Merlo (32° 20' S, 65° 00' O), dto. Junín, San Luis
 Oliden (35° 10' S, 57° 57' O) a 3 km al SE, pdo. Magdalena, Buenos Aires
 Pampa de Achala (31° 41' S, 64° 52' O), dto. San Alberto, Córdoba
 Parque Provincial de las Sierras (27° 44' S, 55° 33' O), dto. Apóstoles, Misiones
 Payró (35° 15' S, 57° 35' O) 4 km al O, pdo. de Magdalena, Buenos Aires.
 Punta Indio (35° 16' S, 57° 13' O), pdo. Punta del Indio, Buenos Aires
 Punta Rasa (36° 17' S, 56° 46' O), pdo. de la Costa, Buenos Aires
 Reserva Natural Punta Lara (34° 47' S, 58° 30' O), pdo. Ensenada, Buenos Aires
 Reserva y Área Experimental Guaraní (26° 54' S, 54° 13' O), dto. San Pedro, Misiones
 Río Gallegos (51° 38' S, 69° 14' O), dto. Güer Aike, Santa Cruz

Rucanelo (36° 03' S, 64° 49' O), dto. Conhelo, La Pampa
Salto (34° 17' S, 60° 14' O), pdo. Salto, Buenos Aires
San Agustín del Valle Fértil (30° 38' S, 67° 27' O), dto. Valle Fértil, San Juan
San Clemente del Tuyú (36° 21' S, 56° 43' O), pdo. de la Costa, Buenos Aires
Santa Teresita (36° 32' S, 56° 41' O), pdo. General Lavalle, Buenos Aires
Trelew (43° 15' S, 65° 18' O), dto. Rawson, Chubut
Valcheta (40° 42' S, 66° 09' O), dto. Valcheta, Río Negro
Vieytes (35° 15' S, 57° 35' O), 1 km al E, Pdo de Magdalena, Buenos Aires
Villa Adelina (34° 31' S, 58° 32' O), pdo. Vicente López, Buenos Aires
Villa María (32° 24' S, 63° 14' O), dto. General San Martín, Córdoba