

Nótulas FAUNÍSTICAS

Segunda Serie

111

Diciembre 2012

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

PRIMER REGISTRO DE LA CAMINERA GRANDE (*Geositta isabellina*) PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA

Jorge Martín Spinuzza ¹

¹ Padre Santiago Alberione 6815, B° Quintas de la Recta (5147), Córdoba, Argentina.
Correo electrónico: spinuzzaj@avespampa.com.ar

RESUMEN. Se comunica el primer registro documentado con fotografías y descripción del comportamiento de cortejo de la Caminera Grande (*Geositta isabellina*) para la Reserva Provincial Laguna Brava, el cual además constituye la adición de una nueva especie para la provincia de La Rioja.

ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE CREAMY-RUMPED MINER (*Geositta isabellina*) LAGUNA BRAVA RESERVE PROVINCIAL AND LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA. The first photographic record and description of the courtship behavior of the Creamy-rumped Miner (*Geositta isabellina*) to the recently launched Provincial Reserve Laguna Brava is here described. This also constitutes the first record for the species for the province of La Rioja.

INTRODUCCIÓN

La Caminera Grande (*Geositta isabellina*) habita estepas altoandinas del área central de América del Sur en el límite entre la Argentina y Chile (Del Hoyo *et al.*, 2003). La distribución actual no está completamente establecida y difiere según las fuentes consultadas. En Chile se la encuentra desde Atacama hasta el sur de Talca por encima de los 2.000 m s.n.m., señala Vaurie (1980) y hasta la Región del Maule según Del Hoyo *et al.* (2003) y Jaramillo (2005). Vaurie (*op. cit.*) agrega que los diecinueve especímenes procedentes de la Argentina y depositados en la colección del Museum National d'Histoire Naturelle de París (MNHN), sugiere que serían migrantes de Chile y que se reproducirían en la Argentina. Sin embargo, su nido es conocido y descripto para Chile (Narosky *et al.*, 1983).

En nuestro país, es mencionada para las provincias

de Jujuy por Budin (1931) para las Sierras del Zenta, y para Catamarca, es mencionada pero sin fundamentar la información en Koslowsky (1895) y Dabbene (1919). Para las mismas provincias, la destaca Olrog (1979) pero aclara, "sin datos concretos". Vaurie (*op. cit.*) la describe como posible habitante de los Andes en las provincias de Jujuy, hasta el sur de Mendoza, por lo menos hasta los 3.050 m s.n.m.

Es bien conocida para varias localidades de la provincia de Mendoza (Reed, 1916; Dabbene, 1919; Barros, 1930; Pereyra, 1942; Roig, 1965; Navas y Bó, 1987). En esta provincia cuyana, es citada por Olrog (*op. cit.*) para Puente del Inca y Chebez *et al.* (1993) la registran para el paraje Paso Pehuenche en el departamento Malargue, en la frontera con la provincia del Neuquén.

Sin embargo en los listados de los parques nacionales, Chebez *et al.* (1998) no la registran en ningún parque, hasta que el Sr. C. Savigny en Veiga *et al.* (2005),

descubre una bandada en abril de 2002, recorriendo una planicie rocosa a unos 1.200 m s.n.m. dentro del Parque Nacional Laguna Blanca, departamento Zapala, en la provincia del Neuquén. Este hallazgo constituye el lugar de nuestro país de menor altitud y el sitio más austral, en el que la especie ha sido hallada hasta el presente. También en el Parque Nacional Los Cardones, departamentos San Carlos y Chachi en el centro oeste de la provincia de Salta, es citada por Moschione (2009). En adición, ha sido reportada su presencia en los parques provinciales Aconcagua y Laguna del Diamante y en el Monumento Natural Provincial Puente del Inca, todos en la provincia de Mendoza (Chebez, 2009).

En la guía de aves argentinas de Canevari *et al.* (1991) su distribución es extendida desde las provincias de Catamarca hasta Mendoza, pero no se puntualizan registros concretos; De la Peña (1999) no la incluye para Catamarca y La Rioja pero indica que “posiblemente se la halle más al norte de su distribución conocida”. En la reciente guía de Narosky e Yzurieta (2010) la mapean desde el centro de las provincias de San Juan por la cordillera, hasta el centro de la provincia del Neuquén. BirdLife Internacional (2012) da cuenta de su distribución, aún más restringida, desde el norte de Mendoza al norte del Neuquén y coincidiendo con la misma latitud en Chile. En la provincia de San Juan es reportada por Navas y Bó (1987) y con nuevos hallazgos para 1998, cuando se crea la Reserva de Biosfera, Parque Nacional San Guillermo, y sitio AICA SJ02, siendo listada y citada por Haene (2005).

Recientemente el fotógrafo y naturalista, Sr. Norberto Bolzón (*com. pers.*) indica que el día 23 de enero de 2012, en el denominado paraje La Brea, ubicado en el departamento Iglesia, en el extremo norte de la provincia de San Juan, limitante con la provincia de La Rioja, observa una pareja de *Geositta isabellina* en el refugio minero denominado Chumingo Araya, ubicado a más de 4.000 m s.n.m. El Sr. Bolzón pudo constatar que se trataba de una pareja, ya que uno de los ejemplares desplegaba inequívocas actividades de cortejo, erizando notoriamente las plumas de la corona (Foto 1) y a la vez balanceaba la cola en forma horizontal, mientras emitía un sonoro reclamo. Mientras tanto, el otro ejemplar, mantenía una postura pasiva (Foto 2) observando atentamente el despliegue del primero, hasta que se produjeron una sucesión de breves persecuciones, donde el ejemplar de actitud pasiva, rechazaba al cortejante. Dicho comportamiento lo pudo contemplar en dos ocasiones y durante tres días consecutivos, permaneciendo la pareja en el lugar y mostrando un comportamiento extremadamente manso, incluso un ejemplar muy confiado ingresó al refugio.

MATERIALES Y MÉTODOS

El 6 de abril del año 2012 en horas de la mañana, en uno de los habituales viajes realizados con el fin de inventariar aves de la zona, se pudo observar un furnárido perteneciente al género *Geositta* sp. diferente a las

especies que habitualmente se hallan presentes en la zona. Al cotejar las fotos obtenidas y las descripciones apuntadas con bibliografía y consultas a especialistas, se pudo identificar el ejemplar como perteneciente a *Geositta isabellina*.

RESULTADOS

La Reserva Provincial Laguna Brava está ubicada al noroeste de la provincia de La Rioja, en los departamentos Vinchina y General Lamadrid. Posee una extensión de 405.000 hectáreas. Está categorizada como humedal de importancia internacional enmarcada en la convención de sitios Ramsar y además, es un Área Importante para la Conservación de las Aves, AICALR02 (Moschione y Sureda, 2005).

El lugar se enclava en las ecorregiones de los Altos Andes y la Puna (Chebez, 2005), caracterizadas por estepas de altura con matas acojinadas y arbustivas con una serie de lagunas, de las cuales la Laguna Brava, que da nombre a la reserva, es la de mayor extensión. El ejemplar de la Foto 3 fue hallado a pocos kilómetros en el interior del límite este de la Reserva, cerca del camino de ingreso (Ruta Nacional N° 76). Se encontraba alimentándose en un área pedregosa y totalmente desprovista de vegetación. El comportamiento habitual del género es de desplazamientos constantes, efectuando cortas “carritas” en busca de pequeños artrópodos de los cuales se alimenta. El carácter distintivo de esta especie es su mayor tamaño, pico largo levemente curvado; alas largas y puntiagudas con proyección de las primarias largas. Cola de base crema con ancho ápice negro. Dorso acanelado y ventral blancuzco. El alula es oscura y contrasta con el color de las alas, dato diagnóstico que no se aprecia en las fotos (Del Hoyo *et al.*, 2003).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De este modo se confirma la presencia para la provincia de La Rioja de *Geositta isabellina*, ampliando su rango de distribución actual y sirviendo como nexo entre las poblaciones detectadas en las provincias de Salta, con las de San Juan, Mendoza y Neuquén. Queda para el futuro, la confirmación de su presunta presencia para la provincia de Catamarca.

La distribución en nuestro país posee entonces, un rango latitudinal similar a la observada en Chile, aunque con el gradiente altitudinal más bajo conocido para la especie en el norte de la Patagonia. Si bien posee un estatus de conservación calificada como de “Preocupación menor”, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su presencia dentro de una nueva área protegida resulta significativa, otorgando mayor valor al presente hallazgo y confirmando la importancia que poseen las áreas naturales provinciales.



AGRADECIMIENTOS

Al Sr. Jorge O. Veiga por su permanente apoyo y ayuda con el análisis del material fotográfico y al Sr. Norberto Bolzón por el invaluable y desinteresado aporte de comentarios y fotografías que enriquecen el presente manuscrito.

Mapa 1. BirdLife International (2012)
 Especies ficha: *Geositta isabellina*.
 Descargado de <http://www.birdlife.org>
 el 17/09/2012. El área mapeada abarca desde la localidad de Los Andes en Chile (32°49'47"S 70°35'58"W) y Puente del Inca, Mendoza, Argentina (32°49'13"S y 69°55'20"W) por el norte, hasta la Reserva Nacional Ñuble (37°4'42"S 71°19'19"W) en Chile y Las Ovejas, Neuquén, Argentina (37°01'S 70°45'W), por el sur.



Mapa 2. Imagen satelital señalando los límites de la Reserva Provincial Laguna Brava y la zona de observación. Google Earth 2012.



Foto 1. Ejemplar adulto de *Geositta isabellina*, en actitud de cortejo, desplegando, erizadas las plumas de la corona y adoptando postura desafiante, mientras elevaba la cola y enfrentaba a otro ejemplar de la Foto 2 de actitud pasiva. Nótese un rasgo diagnóstico poco destacado pero típico, cual es la mancha amarilla en la base de la mandíbula. Foto: gentileza del Sr. Norberto Bolzón, obtenida el 23 de enero de 2012, en el paraje La Brea, en la Reserva de Biosfera y Parque Nacional San Guillermo, provincia de San Juan.



Foto 2. Ejemplar de *Geositta isabellina* de actitud pasiva, mientras observaba, el cortejante despliegue del individuo que se aprecia en la Foto 1. Foto: gentileza del Sr. Norberto Bolzón, día 23 de enero de 2012.



Foto 3. Ejemplar de Caminera Grande (*Geositta isabellina*). Pueden apreciarse, la inconspicua ceja ocrácea que llega a la nuca, el pico largo y algo curvado, donde apenas se delata el amarillo basal de la mandíbula, la proyección de las primarias y el diseño alar y caudal. Foto: Jorge Martín Spinuzza, el 6 de abril de 2012 en la Reserva Provincial Laguna Brava, provincia de La Rioja.



Foto 4. Mismo ejemplar anterior, aquí se aprecia la corona oscura y el manto uniforme, además se destaca la zona ventral y flancos, blancuzcos, con pecho más cremoso y cobertoras con varias plumas nuevas. Foto: Jorge Martín Spinuzza el 6 de abril de 2012 en la Reserva Provincial Laguna Brava, provincia de La Rioja.



Foto 5. Vista general de la Laguna Brava y el Volcán Pissis (6.882 m s.n.m.). Foto: María Gabriela Arancio, 6 de abril de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

- BARROS, R. 1930.** Sobre algunas aves de la Alta Cordillera de Mendoza. *Revista Chilena de Historia Natural*. 34: 312-320, Chile.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2012.** Especies ficha: *Geositta isabellina*. Descargado de <http://www.birdlife.org> el 17/09/2012.
- BUDIN, E. 1931.** Lista y notas sobre aves del noroeste argentino (Provincia de Jujuy). *Hornero* 4 (4): 401-411.
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G.R. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA y R.J. STRANECK. 1991.** Nueva guía de las aves argentinas. Fundación Acindar. Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO. 1993.** Novedades ornitogeográficas argentinas IV. *Nótulas Faunísticas (primera serie)*, 38. Corrientes.
- CHEBEZ, J.C, N.R. REY, M. BABARSKAS y A.G. DI GIACOMO. 1998.** Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial, Literature of Latin America - L.O.L.A. N° 12, 127 págs., Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C. 1999.** Los que se van. Editorial Albatros. Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C. 2005.** Guía de las reservas naturales de la Argentina. Tomo IV. Noroeste. Editorial Albatros. Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C. 2009.** Otros que se van. Fauna argentina amenazada, 552 págs. Albatros. Buenos Aires.
- DABBENE, R. 1919.** Especies de aves poco comunes o nuevas para la República Argentina. *Physis* IV. 18: 551, Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M.R. 1989.** Guía de Aves Argentinas. Tomo VI - Passeriformes. Literature of Latin America L.O.L.A Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M.R. 1999.** Aves Argentinas, lista y distribución. Monografía. Literature of Latin America L.O.L.A N°18, 244 págs. Buenos Aires.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOTT y D.A. CHRISTIE (EDS). 2003.** Handbook of the Birds of the World, Vol. 8. Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona.
- HAENE, E. 2005.** Reserva de la Biosfera y Parque Nacional San Guillermo. En: A.S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 393-395. *Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- JARAMILLO, A. 2005.** Birds of Chile. Princeton field guides. Princeton y Oxford, 240 págs.
- KOSLOWSKY, J. 1895.** Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, La Rioja. *Revista del Museo la Plata* 6: 277-287. La Plata.
- LUCERO, F. 2011.** Primer registro de la Caminera Patagónica (*Geositta antarctica*) para la provincia de San Juan y nuevos hallazgos para el norte de la provincia Mendoza. *Nótulas Faunísticas (segunda Serie)*, 86. Buenos Aires.
- MOSCHIONE, F. y A.L. SUREDA. 2005.** Reserva Provincial Laguna Brava. En: A.S. Di Giacomo (editor). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 255-257. *Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*. Buenos Aires.
- MOSCHIONE, F.N. 2009.** Diversidad y conservación de la avifauna del Parque Nacional Los Cardones. 11 pp. En: Sistema de Información de Biodiversidad (Administración de Parques Nacionales). www.sib.gov.ar
- NAROSKY, T., R. FRAGA y M. DE LA PEÑA. 1983.** Nidificación de las aves argentinas. Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010.** Guía para la Identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición Total. Vázquez Mazzini Editores, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata - Birdlife Internacional. Buenos Aires. Argentina.
- NAVAS J.R. y N. BÓ. 1987.** Notas sobre Furnariidae argentinos (Aves: Passeriformes). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Zoología*, XIV, 4: 55-86, Buenos Aires.
- OLROG, C.C. 1979.** Nueva lista de la avifauna argentina, *Opera Lilloana*: 27: 1-324.
- OLROG, C.C. y E.A. PESCEITTI. 1991.** Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. 160 págs. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Mendoza (CRICYT). Gobierno de la provincia de Mendoza.
- PEREYRA, J. 1942.** Avifauna Argentina (Contribución a la Ornitología). *Memorias del Jardín Zoológico de la Plata*, X. 104 págs. La Plata.
- PRODIA. 1999.** Eco-regiones de la Argentina. Administración de Parques Nacionales, 43 págs., Buenos Aires.
- REED, C.S. 1916.** Las aves de la provincia de Mendoza (Parte I, Lista Sistemática). *Museo Educativo de Mendoza*, 1: 7-47
- ROIG, V.G. 1965.** Elenco sistemático de los Mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. *Boletín de Estudios geográficos*, 12 (49): 175-222
- VAURIE, C. 1980.** Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (Aves: Passeriformes). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 166.
- VEIGA, J.O., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY. 2005.** Aves de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, Lista Comentada y Distribución. Editora R y C. Buenos Aires. Argentina.