

Nótulas FAUNÍSTICAS

193

Segunda Serie

Mayo 2016

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

 **Universidad Maimónides**

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA EL PARTIDO DE PUÁN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Alejandro Morici

Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Hidalgo 775, 7° piso (C1405BDB). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: plumaspurpuras@yahoo.com.ar

RESUMEN. Se da a conocer el hallazgo de seis especies infrecuentes para el partido de Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF BIRDS FROM PUÁN DISTRICT, BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. In this paper disclosed six infrequent bird species for the Puán District, southwestern of Buenos Aires Province, Argentina.

INTRODUCCIÓN

Como resultado de regulares relevamientos de fauna que se realizan en toda la extensión del territorio del partido de Puán, para un mejor conocimiento de su composición, estatus y estado de conservación, se dan a conocer nuevas especies encontradas durante los mismos.

El partido de Puán tiene una extensión de 6.385 km², ubicado en el sector sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Limita con los partidos de Adolfo Alsina, Saavedra, Tornquist y Villariño. Además de los departamentos de Hucal y Caleu Caleu de la vecina y limítrofe provincia de La Pampa (Brizzola *et al.*, 2009).

El paisaje está dominado por campos dedicados al cultivo intensivo de cereales y cría de ganado. Solamente alterado por las sierras de Puán en el extremo noreste. Estos agroecosistemas están salpicados por una gran cantidad de lagunas que varían su tamaño de acuerdo a las épocas de lluvias. Hacia el sur se hace presente la provincia del Espinal representada por el distrito de Caldén y la Provincia del Monte (Narosky y Di Giacomo, 1993).

RESULTADOS

A continuación se presenta información sobre las especies referidas:

Familia Anatidae

Pato de Collar (*Callonetta leucophrys*)

Navas (1977) lo cita para el partido de General Lavalle, pero sin más datos. Para la cuenca de los ríos Reconquista y Luján, Morici (1992) registra algunas parejas y el primer nido en barrancas para Buenos Aires. Narosky y Di Giacomo (1993) lo mencionan para el norte de la provincia y por entonces, lo consideran "Raro" para Buenos Aires. Darrieu y Camperi (2001) la señalan para el Área 1, que comprende los partidos ubicados en el norte y noreste bonaerense. Narosky y Yzurieta (2010) y De la Peña (2013) lo mapean para el centro norte bonaerense. En la provincia de La Pampa, De la Peña y Tittarelli (2011) mapean la porción noreste.

Se identificó una pareja en un arroyito desbordado cerca de la localidad de Azopardo, partido de Puán, el 28 de octubre de 2014. Coordenadas: 37°42'54.45"S - 62°55'27.26"O.

Además se observaron otros dos ejemplares nadando en la cuneta de la ruta nacional n° 76, frente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la localidad de Bordenave, el 9 de noviembre de 2014. Coordenadas: 37°45'27"S - 63°05'29"O. Ambos registros resultan novedosos para el área.

Familia Strigidae

Alilicucu Común (*Megascops choliba*)

La especie es señalada como nidificante para el partido de Berisso (Klimaitis, 1975) y mencionada para el noreste de Buenos Aires por Narosky y Di Giacomo (1993) y en Narosky e Yzurietta (2010), aunque hay observaciones hasta el partido de Villarino (Rosemary Scoffield, *com. pers.*).

Para el sector este de la provincia de La Pampa, que limita con el partido bonaerense de Puán, está mapeada por De La Peña y Tittarelli (2011). También en el estudio sobre la Categorización de la Fauna Silvestre de Vertebrados de La Pampa, Bruno *et al.* (2012) la señalan como rara para dicha provincia.

Se hallaron dos parejas observadas y fotografiadas dentro de un bosque de caldén (*Prosopis caldenia*) en el paraje "La Colorada Chica, el 15 de marzo de 2013, cuyas coordenadas son 38°17'11"S - 63°21'56"O.



Foto 1. Ejemplar de Alilicucu Común (*Megascops choliba*) en la noche del caldén bonaerense. Foto: Christian Morici.

Familia Picidae

Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*)

En Buenos Aires era citada como de presunta presencia, hipotética (Narosky y Di Giacomo, 1993) para la zona norte y ribereña bonaerense. Darrieu y Camperi (2001) la señalan solo como una especie con escasos



Foto 2. Hembra de Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*). Foto: Alejandro Morici.

registros para el norte de Buenos Aires. En los últimos años fue citada por Lando y Haene (1996) para la localidad de Zárate y Campana. Bodrati (2001) la cita en Baradero y menciona el hallazgo de seis ejemplares en la Reserva Natural Punta Lara, Ensenada. Babarskas *et al.* (2003) para Campana y un grupo de seis ejemplares en Escobar. En talares de Magdalena, Pagano y Mérida (2009) también la mencionan. Fue reportado para el Parque Natural Municipal Ribera Norte (DECB, 2011) en el partido de San Isidro. En el año 2014, Milat (*en prep.*) observa una pareja nidificando en Isla Paulino, Berisso. Finalmente, Celsi *et al.* (2014) señalan la cita más austral, hasta entonces y siguiendo la probable expansión por la costa bonaerense, en el ejido urbano del balneario Marisol, partido de General Dorrego, a solo 17 km de Reta, partido de Tres Arroyos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

El 1 de noviembre de 2014, se observó una hembra solitaria, posada en un ciprés (*Cupressus* sp.) dentro del ejido del poblado de Bordenave, cuyas coordenadas son: 37°48'25"S - 63° 02'37"O. Se la pudo fotografiar y observar por más de 10 minutos hasta que voló hacia el cuadrante sur.

Observación: este es el primer registro de la especie para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, fuera del sector ribereño y de la costa bonaerense (Narosky e Yzurietta, 2010). Aparentemente, *Melanerpes candidus*, estaría expandiendo su área de dispersión, aceptando arboledas exóticas y nativas.

Familia Furnariidae

Pijú Frente Gris (*Synallaxis frontalis*)

Especie con registros bonaerenses solamente para el sector noreste, en áreas ribereñas, además de un registro para la localidad de Salto en Narosky y Di Giacomo (1993). También mencionada por Darrieu y Camperi

(2001) para los partidos del noreste de Buenos Aires.

Una pareja fue observada en las cercanías de Bordenave en un camino rural el 25 de febrero de 2015. Como referencia más cercana, De la Peña y Tittarelli (2011) lo mapean para la provincia de La Pampa como raro visitante estival para el sector noreste.



Foto 3. Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en Bordenave. Foto: Alejandro Morici.

Familia Tyrannidae

Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*)

La especie no está registrada para Buenos Aires en los trabajos de Narosky y Di Giacomo (1993) y Darrieu y Camperi (2001). Tampoco en la completa recopilación bibliográfica y de ejemplares de museo, efectuada por Navas (2002). Pero es citada para el noroeste de la provincia por Roesler (2009) y Spinuzza (2009). Para la misma área bonaerense está mapeada por De la Peña (2013).

Se hallaron dos parejas, observadas y fotografiadas en un pastizal al borde de un bajo en la zona periurbana del poblado de Bordenave, el 5 de febrero de 2015. En la limítrofe provincia de La Pampa, existen datos para el noroeste de la provincia y extremo norte de La Pampa (De la Peña, 2012). Coordenadas: 37°48'26"S - 63°02'13"O.

Benteveo Rayado (*Myiodynastes maculatus*)

Para el noreste de la provincia de Buenos Aires se agrupa la mayoría de los registros según Narosky y Di Giacomo (1993), Darrieu y Camperi (2001) la dan para el área 1 y escasos registros al norte del área 4, que es



Foto 4. Benteveo Rayado (*Myiodynastes maculatus*). Foto: Christian Morici.

donde se incluye en dicho trabajo, la localidad de Bordenave.

Se hallaron tres parejas en un monte de caldén en el paraje "La Colorada Chica", el 15 de marzo de 2013. Cuyas coordenadas son: 38°17'31"S - 63°21'37"O. Resultan los primeros registros para el área y el partido de Púan, ya que la mayoría son de la zona noreste (Narosky e Yzurietta, 2010). Mapeada para la provincia de La Pampa como raro visitante estival (De la Peña y Tittarelli, 2011).

AGRADECIMIENTOS

A Silvina, Christian y Ana por el constante apoyo a mis actividades. A las familias Sbaizero y Gamboa por permitirme recorrer sus campos, compartir recorridas, comidas y anécdotas.

BIBLIOGRAFÍA

BABARSKAS, M., E. HAENE y J. PEREIRA. 2003.

Aves de la Reserva Natural Otamendi. En: HAENE, E. y J. PEREIRA (EDS.). Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación 3. Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

BODRATI, A. 2001. Notas sobre aves infrecuentes o poco conocidas para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 13-17.

- BRUNO, F., P. TALLADE, A.L. CASTRO SELTZER, A.P. ALAMO IRIARTE, J.J. MACEDA, C. POLANCO y C. PASTOR. 2012.** Categorización de la Fauna Silvestre de Vertebrados de la provincia de La Pampa. Informe Interno. Santa Rosa, La Pampa. Argentina.
- BRIZZOLA, E.I., M.C. JACQUEMARD, M.C. LOPEZ-QUINTANA y L.M. OLMOS. 2009.** EL Partido de Puán. Reseña de sus lugares y su gente. 120 de historia. Municipalidad de Puán. Buenos Aires.
- CELSI, C.C., J.A. MILAT y M. KILDEGAARD. 2014.** Hallazgo de un ejemplar de Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*) en libertad, en la costa bonaerense. Historia Natural (Tercera Serie), Volumen 4 (2): 89-94.
- DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (DECB). 2011.** Fauna vertebrada del Parque Natural Municipal Ribera Norte. Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente. Municipalidad de San Isidro.
- DE LA PEÑA, M.R. y R.F. TITTARELLI. 2011.** Guía de las aves de La Pampa. 1° edición, Santa Rosa: Gobierno de La Pampa.
- DE LA PEÑA, M.R. 2012.** Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: informe preliminar. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológicas, 770 págs.
- DE LA PEÑA, M.R. 2013.** Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológicas. Santa Fe.
- DARRIEU, C.A. y A.R. CAMPERI. 2001.** Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. CobioBo N° 3 - Probiota N° 2. Secretaría de Política Ambiental. Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires.
- MORICI, A. 1992.** Observaciones de *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816) (Aves: Anseriformes: Anatidae) en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Boletín Científico Aprona, 22: 14-20.
- NAROSKY, T. y A. DI GIACOMO. 1993.** Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y Estatus. L.O.L.A., Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010.** Aves de Argentina y Uruguay: Guía de Identificación. Edición Total. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.
- NAVAS, J.R. 1977.** Aves. Anseriformes. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Profadu. Volumen 18, Fascículo 2.
- NAVAS, J.R. 2002.** La distribución geográfica de *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. Hornero, 17 (1): 45-48.
- LANDO, R. y E. HAENE. 1996.** Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*) en la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves, 35: 34-35.
- PAGANO, L.G. y E. MÉRIDA. 2009.** Aves del Parque Costero del Sur. En: ATHOR, J. (ED.). Parque Costero del Sur. Naturaleza, Conservación y patrimonio cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- ROESLER, I. 2009.** El Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su historia natural. Cotinga, 31: 1-4.
- SPINUZZA, J.M. 2009.** Presencia del Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nótulas Faunísticas (Segunda Serie), 29: 1-3.

Recibido: 3/3/2015 - Aceptado: 5/7/2015