

## NOTAS SOBRE AVES DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

Oscar Bernardo Quiroga<sup>1,3</sup>, Patricia Capllonch<sup>1,2</sup>, Walter Emanuel Pérez Bogado<sup>1,4</sup>, José Luis Navarro<sup>5</sup>,  
Jorge Emir Llugdar<sup>3,6</sup> y Karina Soria<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina. Correo electrónico: oscarqui595@hotmail.com.

<sup>2</sup>Cátedra de Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina.

<sup>3</sup>Integrante del COA Kakuy, Independencia 1856, (4200) Santiago del Estero, Argentina.

<sup>4</sup>Museo de Ciencias Naturales Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 241, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina.

<sup>5</sup>Aves de Santiago del Estero, La Banda (4300), Santiago del Estero, Argentina.

<sup>6</sup>Observadores de Flora y Fauna de Santiago del Estero, La Banda (4300), Santiago del Estero, Argentina.

**RESUMEN.** La avifauna de la provincia de Santiago del Estero fue presentada en una lista sistemática que comprende 330 especies hasta el año 1991. Distintos autores fueron actualizando este listado, dando a conocer datos sobre la biología de unas 380 especies en esta provincia. En este artículo brindamos datos sobre migración y distribución de diecinueve especies de la avifauna de Santiago del Estero.

**ABSTRACT. NOTES ON BIRDS OF SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA.** The birds of the province of Santiago del Estero was presented in a systematic list comprising 330 species until 1991. Several authors were updating this list, giving information about the biology of about 380 species in this province. In this article we provide data on migration and distribution of nineteen species of birds of Santiago del Estero.

## INTRODUCCIÓN

La avifauna de la provincia de Santiago del Estero fue publicada en una lista sistemática donde se da a conocer la distribución y estatus de residencia o migración de 330 especies (Nores *et al.*, 1991). Trabajos posteriores, incorporaron detalles y especies a la lista original (Salvador y Eroles, 1994; Sferco y Baldo, 1995; Cazziani, 1996; López de Casenave *et al.*, 1998; Torres y Michelutti, 2001; Roesler, 2003; Codesido y Bilenca, 2004; Ferrari *et al.*, 2004; Capllonch *et al.*, 2005; Capllonch y Zelaya, 2006; Ferrari *et al.*, 2006; Michelutti y Torres, 2006; Torres *et al.*, 2006; Capllonch, 2007; Moschio-ne, 2007; Aparicio *et al.*, 2008; Capllonch *et al.*, 2008;

Luna y Manassero, 2008; Seipke y Clark, 2008; Alde-  
rete y Capllonch, 2010; Coria, 2010; Echevarría *et al.*,  
2011; Gómez, 2011; Heredia, 2011; Capllonch, 2012;  
Coria y Heredia, 2012; Soria *et al.*, 2012; De la Peña,  
2013; Areta *et al.*, 2014, Quiroga, 2014; Quiroga, 2016;  
Capllonch *et al.*, 2015; Quiroga *et al.*, 2015; Coria *et al.*, en prensa).

En la presente nota aportamos nuevas localidades, datos de migración de 19 especies, actualizando la distribución de algunas especies en Santiago del Estero y comunicamos resultados del anillamiento realizado por el Centro Nacional de Anillado de Aves en esta provincia.

Los datos fueron obtenidos en distintas campañas de anillado del Centro Nacional de Anillado de Aves (CE-

NAA) y salidas de campo en el período 1988-2016, mediante censos de transectas, capturas con redes de niebla y avistajes. Los sitios de muestreos pertenecen al Chaco Occidental de la provincia Chaqueña (Cabrera, 1976), comprenden zonas chaqueñas semiáridas, chaqueñas serranas, campos agrícolas, ganaderos y zonas urbanas de las siguientes localidades: Bañados de Figueroa (Dpto. Figueroa, 27°04'S 63°36'O), Cuyoj (Dpto. Banda, 27°40'S 64°07'O), Dique Los Quiroga (Dpto. Banda, 27°39'S 64°21'O), El 45 (Dpto. Mitre, 29°48'S 62°97'O), El Zanjón (Dpto. Capital, 27°51'S 64°14'O), Forres (Dpto. Robles, 27°53'S 63°59'O), INTA La María de La Abrita (Dpto. Silípica, 28°01'S 64°19'O), La Banda (Dpto. Banda, 27°42'S 64°15'O), Los Gallegos (Dpto. San Martín, 28°11'S 64°03'O), Parque Aguirre (Dpto. Capital, 27°47'S 64°16'O), Pozo Hondo (Dpto. Jiménez, 27°04'S 64°28'O), Reserva Ecológica Los Corbalanes (Dpto. Banda, 27°31'S 64°25'O), Reserva Isla Tara Inti (Dpto. Río Hondo, 27°30'S 64°52'O) y Santa Ana (Dpto. Quebrachos, 29°22'S, 63°28'O).

## RESULTADOS

**Sirirí Pampa (*Dendrocygna viduata*):** observamos 21 adultos en vuelo en Reserva Isla Tara Inti (RITI) el 10 de agosto de 2013. Cuatro adultos entre totorales (*Typha* sp.) y pirizales (*Cyperus giganteus*) de lagunas de Cuyoj el 3 de noviembre de 2012. Doce volando en la ciudad de La Banda el 6 de febrero de 2015. Dos adultos en Reserva Ecológica Los Corbalanes (RELC)

el 24 de septiembre de 2016. Registrado en Bañados de Figueroa, Bañados del Río Dulce, Icaño, Selva, Lagunas Saladas (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; De la Peña, 2013).

**Sirirí Colorado (*Dendrocygna bicolor*):** es nidificante en Bañados de Figueroa. Cuatro ejemplares, entre ellos una hembra con placa, fueron capturados entre el 3 y 5 de noviembre de 1988 y 114 fueron censados en esa oportunidad (CENAA). Tres individuos observados en dique Los Quiroga el 5 de febrero y 5 de marzo de 2015. Registrado en Bañados de Figueroa, Bañados del Río Dulce, Bañados de Añatuya, Lagunas Saladas (Olrog, 1953; Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011).

**Sirirí Vientre Negro (*Dendrocygna autumnalis*):** observamos dos adultos en una laguna de Cuyoj el 3 de noviembre de 2012. Dos adultos en una represa rural en Parque Nacional Copo el 18 de diciembre de 2015 (P. Cowper Coles, *in litt.* 2017). Registrado en Bañados de Figueroa, Río Utis, Lagunas Saladas (Olrog, 1953; Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001; Michelutti y Torres, 2006; Heredia, 2011).

**Aninga (*Anhinga anhinga*):** observamos dos machos adultos en vuelo sobre el cauce del Río Dulce en RITI el 10 de agosto de 2013. Una hembra y dos machos adultos posados en árboles secos emergentes en Bañados de Figueroa el 16 de julio de 2014 y cuatro individuos el 5 de junio de 2016. Una hembra adulta posada en isleta de dique Los Quiroga el 5 de febrero de 2015 y



**Foto 1.** Aninga (*Anhinga anhinga*) en isleta de dique Los Quiroga (Dpto. Banda) el 9 de enero de 2016. Foto: Oscar Bernardo Quiroga.



dos hembras en vuelo circular y un macho en el mismo sitio el 5 de marzo de 2015 y un individuo el 9 de enero de 2016 (Foto 1). Una pareja de adultos en RELC el 25 de septiembre de 2016. Registrado en Bañados del Río Dulce, Bañados de Figueroa, Río Utis y Paso de la Cina (Nores e Yzurieta, 1981; Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001; Michelutti y Torres, 2006).

**Mirasol Común (*Ixobrychus involucris*):** observamos un adulto oculto entre sunchos (*Baccharis* sp.) en Bañados de Figueroa el 16 de julio de 2014. Dos individuos vocalizando y recorriendo pirizales y totorales de dique Los Quiroga el 5 de marzo de 2015. También observado en Termas de Río Hondo (M. Toledo, *in litt.* 2017). Registrado en Bañados del Río Dulce, Lagunas Saladas (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011).

**Chiflón (*Syrigma sibilatrix*):** observamos dos adultos el 24 de mayo de 2010 y unos 70 individuos formando dos bandadas el 16 de noviembre de 2012, ambos sobre el Río Utis en paraje El 45. Observamos adultos solitarios o en parejas en pastizal y totoral en RITI el 10 de agosto de 2013; en zona ganadera con manejo silvopastoril vecina al predio del INTA La María el 5 de septiembre de 2014; en área abierta de *Scirpus* sp. de RELC el 28 de diciembre de 2014; en pastizal a orillas de Ruta Nacional 9, km 1161 (La Banda) el 21 de

diciembre de 2014 y Ruta Nacional 34, km 728 el 3 de febrero de 2015; y en un pastizal de Forres el 13 de julio de 2011. Registrado para el norte de la provincia por Nores *et al.* (1991), con localidades en Selva, Reserva Natural El Mangrullo, Lagunas Saladas (Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; De la Peña, 2013).

**Garza Azul (*Egretta caerulea*):** un adulto observado a orillas del Río Dulce en la RELC el 15 de julio de 2012. Esta garza es frecuente de observar en Termas de Río Hondo (N. Gómez, *com. pers.* 2013), aparentemente estaría ampliando su distribución en la provincia. Registrada actualmente en Bañados de Figueroa y Termas de Río Hondo (Echevarría *et al.*, 2011; Gómez, 2011).

**Espátula Rosada (*Platalea ajaja*):** observamos grupo de diez individuos en RITI y sus alrededores el 8 de enero de 2011 y ocho adultos el 10 de agosto de 2013; cinco en RELC el 6 de abril de 2012; cinco en paraje El 45 el 24 de mayo de 2014; 41 en el Río Dulce en Los Gallegos el 11 de enero de 2013, y dos en Cuyoj el 17 de enero de 2016 (Foto 2). Adultos solitarios en Bañados de Figueroa y RELC, el 16 de julio y 30 de diciembre de 2014. También observada en Laguna de Los Porongos (L. Bareiro Guiñazú, *in litt.* 2017). Registrada en Bañados de Figueroa, Bañados del Río Dulce, Lagunas Saladas (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011).



**Foto 2.** Espátula Rosada (*Platalea ajaja*) en lagunas de Cuyoj (Dpto. Banda) el 17 de enero de 2016. Foto: Oscar Bernardo Quiroga.

**Jote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*):** observamos un adulto sobrevolando una zona de bosque chaqueño semiárido del INTA La María el 7 de noviembre de 2010. Un adulto sobrevolando un bosque chaqueño serrano en Santa Ana el 29 de abril de 2012. Un adulto en arbustales en Cuyo el 27 de abril de 2016 y otro en Laguna Pampa Mayo el 27 de marzo de 2016. Mencionado para el este de la provincia (Olrog, 1979), con localidades en Bañados de Figueroa, Bañados de Añatuya, Lagunas Saladas, Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; Paulini *et al.*, 2015).

**Gavilán Planeador (*Circus buffoni*):** observamos dos adultos volando y posados en postes de una zona abierta de pastizal en el INTA La María, el 4 de septiembre de 2014. Capllonch lo observó en Figueroa y Pozo Hondo. Registrado en Bañados de Añatuya, Bañados del Río Dulce, Selva, Reserva Natural El Mangrullo y Lagunas Saladas (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Heredia, 2011; De la Peña, 2013).

**Rayador (*Rynchops niger*):** observamos 93 individuos posados en banco de arena y sobrevolando el cauce del Dulce en la RELC el 6 de abril de 2012. Seis adultos en vuelo en dique Los Quiroga el 5 de marzo de 2015. Registrado en Bañados de Figueroa, Villa Ojo de Agua, Río Dulce cerca de Loreto y Laguna de los Porongos (Nores *et al.*, 1991; Torres y Michelutti, 2001; De la Peña, 2013).

**Ñacurutú (*Bubo virginianus*):** encontramos un ejemplar cazado el 24 de junio de 2003 en la Finca El Duende en Pozo Hondo. Observamos un adulto posado en un árbol seco de un área de pastizal (*Cortaderia* sp.) con algarrobos (*P. alba*) aislados en las márgenes del Río Utis en paraje El 45, el 17 de noviembre de 2012, momento en que era atacado por *Tyrannus savana* y *T. melancholicus*. Una pareja adulta fue fotografiada posada en un árbol del circuito de RITI el 21 de junio de 2015 y días posteriores se observó un tercer individuo (F. Véliz, *com. pers.*, 2015). Registrado en Bañados de Figueroa, Monte Quemado, Tulip-Loman, Laguna Mamaita, Laguna La Pomosena, Laguna de Puyana y Lagunas Saladas (Menegaux, 1925; Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011).

**Curutié Colorado (*Certhiaxis cinnamomea*):** observamos adultos solitarios en totorales de RITI, RELC y Cuyo el 6 de febrero de 2011, 6 de abril y 8 de octubre de 2012, respectivamente. Además registramos una pareja en Bañados de Figueroa y RELC, el 16 de julio y 23 de agosto de 2014. Varios individuos solitarios entre sunchales y pirizales de dique Los Quiroga el 5 de febrero y 5 de marzo de 2015. Registrado en Bañados de Figueroa, Bañados de Añatuya (Nores *et al.*, 1991).

**Fiofío Grande (*Elaenia spectabilis*):** capturamos dos ejemplares en parches de bosque chaqueño semiárido de Forres el 28 de enero de 2012 (Foto 3). Observamos



**Foto 3.** Fiofío Grande (*Elaenia spectabilis*) capturado en Forres (Dpto. Robles) el 28 de enero de 2012. Foto: Oscar Bernardo Quiroga.

tres adultos recorriendo algarrobales (*P. alba*) en Los Gallegos el 11 de enero de 2013. Registrada en Bañados de Figueroa, Sierras de Guasayán, Reserva Natural El Mangrullo (Nores e Yzurieta, 1981; Nores *et al.*, 1991; Capllonch *et al.*, 2009; Aparicio *et al.*, 2008; Coria *et al.*, en prensa).

**Tachurí Sietecolores (*Tachuris rubrigastra*):** observamos adultos y juveniles entre sunchales y pirizales de Cuyo el 24 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013. Individuos solitarios o en parejas en totorales de RITI el 8 de enero de 2011, 6 de febrero, 1 de abril y 10 de agosto de 2013, y en totorales del dique Los Quiroga el 5 de febrero y 5 de marzo de 2015. Registrado en Paso de la Cina (Nores *et al.*, 1991).

**Tijerilla (*Xenopsaris albinucha*):** observamos un macho adulto recorriendo sunchales de márgenes del Utis en El 45 el 17 de noviembre de 2012, otro en área periurbana de El Zanjón en noviembre 2013 y una hembra adulta posada en alambrado perimetral en una zona de recreación del Parque Aguirre en la Capital provincial el 15 de febrero de 2015. Machos adultos solitarios en dique Los Quiroga el 21 de noviembre de 2015 y La Bajada el 13 de noviembre de 2016. Registrada a 10 km al oeste de Los Pirpintos, Sierras de Guasayán, Reserva Natural El Mangrullo (Nores *et al.*, 1991; Aparicio *et al.*, 2008; Coria *et al.*, en prensa).

**Golondrina Rabadilla Canela (*Petrochelidon pyrrhonota*):** observamos 12 individuos a orillas del embalse de Termas de Río Hondo cerca de RITI el 8 de enero de 2011. Unos 27 individuos en vuelo y posados en la vegetación palustre emergente del dique Los Quiroga el 5 de marzo de 2015. Especie migrante del hemisferio norte. Registrada en Bañados de Figueroa, Bañados del



Río Dulce, Sierras de Guasayán, Lagunas Saladas, Fernández (Nores *et al.*, 1991; Heredia, 2011; De la Peña, 2013; Coria *et al.*, en prensa).

**Monterita Canela (*Poospiza ornata*):** observamos y capturamos varios individuos (Foto 4) en bosque chaqueño serrano de Santa Ana entre el 1 y 3 de agosto de 2012 donde formaba bandada mixta con *Poospiza torquata*, *P. melanoleuca*, *Lophospingus pusillus*, *Coryphospingus cucullatus* y *Z. capensis*. Sufre presión de caza en la provincia, al igual que otros semilleros del género. Registrada en Sierras de Ambargasta, Sierras de Guasayán (Nores y Yzurieta, 1981; Nores *et al.*, 1991; Coria *et al.*, en prensa).



**Foto 4.** Monterita Canela (*Poospiza ornata*) capturada en Santa Ana (Dpto. Quebracho) entre el 1 y 3 de agosto de 2012. Foto: Oscar Bernardo Quiroga.

**Pecho Colorado (*Sturnella superciliaris*):** observamos machos adultos solitarios en área rural cercana a RITI el 8 de enero de 2011, en sunchales del Utis en El 45 el 17 de noviembre de 2012 y 24 de mayo de 2014. Registramos un grupo de 29 individuos (la mayoría adultos y cinco juveniles) en pastizales con arbustos del INTA La María, en La Abrita, el 3 de septiembre de 2014. Mencionada para el sur y centro de la provincia, común en Bañados del Río Dulce (Nores *et al.*, 1991).

#### AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Norberto Gómez, Facundo Véliz, Patricio Cowper Coles, Martín Toledo, Leandro Bareiro Guiñazú y Oscar Coria por los aportes brindados. A Sebastián Aveldaño, Julio Mamaní, Carlos Alderete, Leandro Macchi, Rocío Sánchez, Eugenia Moyano Wagner y Darío Coria por la colaboración y compañía en los viajes de campo.

#### BIBLIOGRAFÍA

- ALDERETE, C. y P. CAPLLONCH. 2010.** Pesos de aves suboscines de Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 58: 1-5.
- APARICIO, G., J. LIZZI, H. MATURO y L. ANTONIAZZI. 2008.** La Reserva Natural El Mangrullo y su aporte para la conservación del Gran Chaco Americano. Informe Técnico de la Fundación Hábitat y Desarrollo, Santa Fe.
- ARETA, J.I., A. BODRATI, J. KLAVINS, D. ALMIRÓN, H. HULSBERG y G. MANGINI. 2014.** El Aguilucho Jote (*Buteo albonotatus*) en Argentina. *Nuestras Aves*, 59: 3-8.
- CABRERA, A.L. 1976.** Regiones Fitogeográficas Argentinas. *Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería* 2: 1-85.
- CAPLLONCH, P. 2007.** Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: Parte 1. *Acta Zoológica Lilloana*, 51 (2): 151-160.
- CAPLLONCH, P. 2012.** Datos de anillado del Zorzalito boreal (*Catharus ustulatus*) en el noroeste de Argentina. *Nuestras Aves*, 57: 11-13.
- CAPLLONCH, P., C. ALDERETE, R. ARÁOZ, E. BARBOZA, J.C. MAMANÍ, D. ORTIZ, W.E. PÉREZ BOGADO, O.B. QUIROGA y K. SORIA. 2015.** Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. *Nuestras Aves*, 60: 76-82.
- CAPLLONCH, P., D. ORTIZ, C. RUIZ y R. LOBO ALLENDE. 2005.** Nuevos registros y observaciones de aves para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 50: 20-21.
- CAPLLONCH, P., D. ORTIZ y K. SORIA. 2009.** Migraciones de especies de Tyrannidae de la Argentina: Parte 2. *Acta Zoológica Lilloana*, 53: 55-75.
- CAPLLONCH, P., K. SORIA y D. ORTIZ. 2008.** Comportamiento migratorio del Zorzal Plomizo (*Turdus nigriceps nigriceps*) en Argentina. *Ornitología Neotropical*, 19: 161-174.
- CAPLLONCH, P. y P. ZELAYA. 2006.** Sobre la distribución y migración de la Mosqueta Parda (*Lathrotriccus euleri argentinus*) en Sudamérica. *Ornitología Neotropical*, 17: 501-513.
- CAZZIANI, S.M. 1996.** Interacción plantas-aves dispersoras de semillas en un bosque chaqueño semiárido. Ph. D. dissertation. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- CODESIDO, M. y D. BILENCA. 2004.** Variación estacional de un ensamble de aves en un bosque subtropical semiárido del Chaco Argentino. *Biotrópica*, 36 (4): 544-554.
- CORIA, O.R. 2010.** Primer registro documentado del Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en Sierras de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 55: 46-47.
- CORIA, O.R. y J. HEREDIA. 2012.** Notas sobre la

- avifauna de la Sierra de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 57: 47-49.
- CORIA, O.R., J. HEREDIA, R. TORRES, J. LIMA, P. ARAUJO, H. ZERDA, M. PALACIO y E. ROGER.** *En prensa.* Lista de aves de la Sierra de Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie).*
- DE LA PEÑA, M.R.** 2013. Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada. Serie *Naturaleza, Conservación y Sociedad* N° 7, Ediciones Biológica, Santa Fe.
- ECHEVARRÍA, A.L., M.E. FANJUL, C.F. MARANO, M.V. MARTÍNEZ, M. ORCE y M.C. COCIMANO.** 2011. Primer registro de la Garza azul (*Egretta caerulea*) en los Bañados de Figueroa, un AICA de Santiago del Estero, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana*, 55 (2): 278-281.
- FERRARI, C., R. GÜLLER, D. MONTELEONE, P. RODRÍGUEZ ELÍAS y S. VITALE.** 2004. Notas sobre la avifauna en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca, Argentina. *Nuestras Aves*, 48: 14-16.
- FERRARI, C., R. GÜLLER, D. MONTELEONE y B. LÓPEZ-LANÚS.** 2006. Nuevos aportes sobre la avifauna de las Sierras de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 52: 8-10.
- GÓMEZ, N.** 2011. Primer registro de Garza Azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 1 (17): 1-4.
- HEREDIA, J.** 2011. Informe ornitológico sobre las Lagunas Saladas de Santiago del Estero, Argentina. Dirección General de Bosques y Fauna, Santiago del Estero.
- LÓPEZ DE CASENAVE, J., J.P. PELOTTO, S.M. CAZIANI, M. MERMOZ y J. PROTOMASTRO.** 1998. Responses of avian assemblages to a natural edge in Chaco semiarid forest in Argentina. *Auk*, 115: 425-435.
- LUNA, H. y M. MANASSERO.** 2008. Nuevos registros de aves para Santa Fe y Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 53: 12-13.
- MENEGAUX, A.** 1925. Etude d'une Collection d'oiseaux faite par M. Wagner Dans le chaco argentin. *Revue Francaise d'Ornithologie*, 9: 221-238, 279-297, 322-329.
- MICHELUTTI, P. y R. TORRES.** 2006. Nuevos registros y comentarios sobre aves acuáticas escasas o fuera de su rango de distribución conocido en el centro de Argentina. *Nuestras Aves*, 51: 32-34.
- MOSCHIONE, F.** 2007. Sierras de Guayasán. En: DI GIACOMO, A.S., M.V. DE FRANCESCO y E.G. COCONIER (EDS.). Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. *Temas de Naturaleza y Conservación* 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- NORES, M. y D. YZURIETA.** 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural*, 2: 33-42.
- NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR.** 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59: 157-196.
- OLROG, C.C.** 1953. Sobre aves del noroeste argentino. *Hornero*, 10 (1): 84-85.
- OLROG, C.C.** 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Ópera Lilloana*, 27: 324 pp.
- SALVADOR, S.A. y P.G. EROLES.** 1994. Notas sobre aves de Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 30: 24-25.
- QUIROGA, O.B.** 2014. Primeros registros documentados del Sietevestidos serrano (*Poospiza whittii*) en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 4 (9): 29-31.
- QUIROGA, O.B.** 2016. Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) en Ciudad Capital, Santiago del Estero. *Nuestras Aves*, 61: 20.
- QUIROGA, O.B., O.R. CORIA, N. GÓMEZ, G. CHIMINO, F. JORGE, L.M. ROJAS, J.E. LLUGDAR y M. ALCALDE.** 2015. El Gaviotín negro (*Chlidonias niger*) y el Burrito común (*Laterallus melanophaius*) en Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 60: 59-60.
- PAULINI, H., R. TORRES, S. VILLALBA, M. MICHELUTTI y M. LÉPEZ.** 2015. Presencia del Jote Cabeza Amarilla (*Cathartes burrovianus*) en el Chaco Seco argentino. *Notulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 187: 1-5.
- ROESLER, I.** 2003. El Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en la región chaqueña argentina. *Hornero*, 18 (2): 123-126.
- SEIPKE, S.H. y W.S. CLARK.** 2008. Primer registro documentado de Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*) en Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 53: 35.
- SFERCO, G.D. y J.L. BALDO.** 1995. Nuevos registros de aves poco frecuentes para Santiago del Estero. *Hornero*, 14: 78-79.
- SORIA, K., P. ZELAYA, D. ORTIZ y P. CAPLLONCH.** 2012. Breve análisis de la avifauna de Pozo Hondo, Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves*, 57: 3-8.
- TORRES, R. y P. MICHELUTTI.** 2001. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 1: 1-5.
- TORRES, R., P. MICHELUTTI, J. LEÓN, G. BRUNO y W. CEJAS.** 2006. Nuevas citas y comentarios sobre rapaces en la región central de Argentina (provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero). *Nuestras Aves*, 52: 13-16.

Recibida: 19/7/2016 - Aceptada: 20/2/2017