

# Nótulas FAUNÍSTICAS

241

Segunda Serie

Julio 2018

**AZARA**  
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

 **Universidad Maimónides**

## PRESENCIA DEL PIOJITO GARGANTILLA (*Mecocerculus leucophrys*) EN ASTICA, DEPARTAMENTO VALLE FÉRTIL, PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Ricardo d. Calí<sup>1</sup>, Flavio Martínez<sup>1</sup>, Silvio Montani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Biota-Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina, Bosques Telteca 2237, CP 5509, Luján, Mendoza. Correo electrónico: caliricardo@hotmail.com

**RESUMEN.** Damos a conocer una nueva localidad del Piojito Gargantilla (*Mecocerculus leucophrys*) dentro de las ecorregiones del Monte y el Chaco Serrano en la provincia de San Juan.

**ABSTRACT.** NEW RECORD OF WHITE-THROATED TYRANNULET (*Mecocerculus leucophrys*) IN THE PROVINCE OF SAN JUAN, ARGENTINA. We present a new location for White-Throated Tyrannulet (*Mecocerculus leucophrys*) in the ecoregions of Monte and Chaco Serrano in the province of San Juan.

### INTRODUCCIÓN

El Piojito Gargantilla (*Mecocerculus leucophrys*) es un passeriforme de la Familia Tyrannidae. Se distribuye por el oeste de América del Sur por las selvas y bosques desde Venezuela hasta la Argentina (Fitzpatrick, 2004). La distribución en la Argentina comprende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja entre los 1.000 y 2.500 m s.n.m. (Narosky e Yzurieta, 2010; De La Peña, 2011, 2012). Habita las Yungas y en particular el Bosque Montano. Es un migrante altitudinal que realiza desplazamientos hacia zonas chaqueñas y a selvas bajas durante el invierno (Capllonch, 2007).

### Área de estudio

El departamento Valle Fértil se ubica al este de la provincia de San Juan entre los 30° 37' S y 67° 28' O y constituye un escenario natural muy distinto al típico paisaje árido que lo caracteriza debido a que es el único sector de la provincia donde convergen las ecorregiones de Monte de Sierras y Bolsones y Chaco Seco,

incluyendo las subregiones de Chaco Serrano, Chaco Árido y Pastizales de Altura dando lugar a un paisaje único (Cailly Arnulphi y Ariza, 2013). En Valle Fértil se observan dos distritos de la Provincia Biogeográfica Chaqueña: 1) El Distrito Occidental, que presenta una fisonomía de un bosque abierto con *Aspidosperma quebracho-blanco* y especies del género *Prosopis*, no encontrándose ya elementos arbóreos del género *Schinopsis*; 2) el Distrito Serrano, aunque empobrecido en esta área marginal de su dispersión, cuenta con elementos característicos como el horco-quebracho (*Schinopsis haenkeana*) solo presente en las quebradas del sector comprendido entre la quebradas de Astica y Las Tumanas (Haene *et al.*, 1995).

### RESULTADOS

Durante una salida de observación de aves, en la quebrada del río Astica, en el departamento de Valle Fértil, San Juan, el día 18 de julio de 2014 a las 11:37 hs y sobre la margen sur del río en las coordenadas 30°57'24.47"S, 67°19'35.14"O (Foto 1) se observó y



**Foto 1.** Ejemplar de horco-quebracho (*Schinopsis haenkeana*) sobre la margen sur del río Astica, donde se observó a *Mecocerculus leucophrys*, el 18 de julio de 2014. Foto: Ricardo Cali.



**Foto 2.** *Mecocerculus leucophrys* en el río Astica, el 18 de julio de 2014. Foto: Ricardo Cali.



**Foto 3.** *Mecocerculus leucophrys* en el río Astica, el 18 de julio de 2014. Foto: Ricardo Cali.

Cabe destacar que si bien no permanecemos en el sitio de la observación pero sí en la zona aledaña, no volvimos a observar nuevamente esta especie.

Este sería el segundo registro para la especie, ya que Gelain (2013) lo cita en el mismo mes de julio de 2013 para la provincia de San Juan en la localidad Villa del Salvador, departamento Angaco, San Juan, hacia el oeste de nuestra observación.



fotografió un ejemplar de Piojito Gargantilla (*Mecocerculus leucophrys*) (Fotos 2 y 3). El ejemplar se encontraba perchado a media altura en la rama de un horco quebracho (*Schinopsis haenkeana*). La observación duró pocos segundos aunque lo suficiente para poder hacer dos fotos, luego el ave voló y se perdió de la vista de los observadores.

En un primer momento se sospechó que podía tratarse de *Mecocerculus leucophrys* ya que fue detectado por vocalizaciones aparentemente de contacto, pero no fue hasta ver las fotografías que se tuvo la certeza de la especie en cuestión, al ver los rasgos más característicos del ave: notable garganta blanca y abultada, filetes ocráceos en cubiertas y remeras internas, corta ceja blanca, dorsal parda olivácea, pecho ceniciento, resto ventral amarillento (Narosky e Yzurieta, 2010).

#### AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Jorge Veiga y Eduardo Haene por los datos aportados. También a Pablo Vitale, por indicarnos la localidad de Astica como sitio para la observación de aves.

#### BIBLIOGRAFÍA.

- CAILLY ARNULPHI V.B. y M.G. ARIZA. 2013.** Lista de Aves de Valle Fértil, Bird Checklist. SAYDS, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, San Juan.
- CAPLLONCH, P. 2007.** Migraciones de Tyrannidae de la Argentina. Parte 1. Acta Zoológica Lilloana 51 (2): 151-160, Tucumán.
- DE LA PEÑA, M.R. 2011.** Enciclopedia de Aves Argentinas. Universidad Nacional del Litoral. Edición Digital, Esperanza.
- DE LA PEÑA, M.R. 2012.** Citas, observaciones y distribución de aves argentinas. Informe preliminar. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 770 págs.
- DINELLI, L. 1918.** Notas biológicas sobre aves del noroeste de la República Argentina. Hornero, 1: 140- 147.
- FITZPATRICK, J.W. 2004.** "Family Tyrannidae (Tyrant-Flycatchers)". En: DEL HOYO, J., A. ELLIOT y D.A. CHRISTIE (EDS.) 2004. Handbook of the Birds of the World. Volume 9: Cotingas to pipits and wagtails. Linx Ediciones, Barcelona.
- GELAIN M.A. 2013.** Piojito Gargantilla (*Mecocerculus leucophrys*) en San Juan, República Argentina (Aves: TYRANNIDAE) (XOLMIS, Agosto 2013).
- HAENE, E.H., S.F. KRAPOVICKAS y D. GÓMEZ. 1995.** Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. Hornero 14: I y II.
- HAENE, E.H. y A. MONTAÑEZ. 1996.** Notas sobre aves de la Reserva de la Biósfera San Guillermo (Provincia de San Juan, República Argentina). Nuestras Aves 34: 47-48.
- NAROSKY, T. y S. SALVADOR. 1998.** Nidificación de las Aves Argentinas (Tyrannidae), Asociación Ornitológica del Plata, 135 págs.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010.** Aves de Argentina y Uruguay: Guía de Identificación. Edición Total. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.
- OLROG, C.C. y E.A. PESSETTI. 1991.** Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. 160 págs. CRICYT (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas). Gobierno de la provincia de Mendoza.