



 Universidad Maimónides

## NIDIFICACIÓN DEL CARPINTERO DEL CARDÓN (*Melanerpes cactorum*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Nicolás Roberto Chimento<sup>1</sup>, Federico Lisandro Agnolin<sup>2,3</sup>, Rubén Francisco Lucero<sup>4</sup>  
y Rodrigo Obredor<sup>5</sup>

<sup>1</sup>División Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina.  
Correo electrónico: [nicochimento@hotmail.com](mailto:nicochimento@hotmail.com)

<sup>2</sup>Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados. Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".  
Av. Ángel Gallardo, 170 (1405). Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: [fedeagnolin@yahoo.com.ar](mailto:fedeagnolin@yahoo.com.ar)

<sup>3</sup>Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Departamento de Ciencias Naturales y Antropología. CEBBAD - Universidad Maimónides.  
Valentín Virasoro, 732 (C1405BDB). Buenos Aires, Argentina.

<sup>4</sup>Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, FCyF, UNLP, Garibaldi 3400, CC4 Llavallol (1836), Buenos Aires, Argentina.  
Correo electrónico: [ruben\\_f\\_luc@hotmail.com](mailto:ruben_f_luc@hotmail.com)

<sup>5</sup>Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Calles 122 y 60, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina.  
Correo electrónico: [deinomychus@hotmail.com](mailto:deinomychus@hotmail.com)

**RESUMEN:** En la presente nota se confirma la presencia y nidificación del Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este registro constituye el más austral para la especie, y extiende unos 250 kilómetros al sur la geonemia de la misma.

**ABSTRACT:** NIDIFICATION OF WHITE-FRONTED WOODPECKER (*Melanerpes cactorum*) IN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. In the present paper the presence and nidification of the White-fronted Woodpecker (*Melanerpes cactorum*) for the Buenos Aires province, Argentina is confirmed. This record constitutes the southernmost for the species, and extends its geographic distribution 250 kilometers to the South.

### INTRODUCCIÓN

El Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) se distribuye en la Argentina al norte de las provincias de Buenos Aires y Mendoza (Olrog, 1979; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Narosky e Yzurieta, 2003). Usualmente se lo encuentra asociado a bosques y arbustales emplazados en las provincias biogeográficas del Chaco, el Espinal y el Monte (Cabrera y Willink, 1973), asociados a árboles como el tala (*Celtis tala*), el algarrobo

(*Prosopis spp.*) y el quebracho (*Aspidosperma quebracho-blanco*) (Genise et al., 1993).

El *Melanerpes cactorum* se caracteriza por presentar el manto o parte dorsal negro, contrastando las cobertoras, cuando están plegadas, por un notable barrado blanco con fondo negro. La frente es blanca, corona roja y cola barrada, mientras que la hembra se distingue fácilmente del macho por carecer de nuca roja. (Narosky e Yzurieta, 2003).

## RESULTADOS

Entre los meses de noviembre del 2008 y enero del 2009 fue observada una pareja asignable a esta especie en el Parque Saavedra en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta pareja se encontraba nidificando en un hueco localizado en una tipa (*Ti-puana tipu*) a una altura aproximada de cuatro metros sobre el nivel del suelo (Figuras 1 y 2). En este hueco se observaron a ambos sexos cambiar la guardia de incubación para llevar alimentos al nido. Los ejemplares asimismo frecuentaban otras especies arbóreas de la zona como ser el ombú (*Phytolacca dioica*), el nogal (*Juglans* spp.) y el palo borracho rosa (*Ceiba speciosa*). Curiosamente, la época de nidificación para la especie ha sido indicada entre los meses de agosto y diciembre en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (De la Peña, 2006), mientras que el presente registro se remonta al mes de enero.

En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos se lo considera como un residente escaso, contando solo con observaciones dispersas en esta última (De la Peña, 2006). El único registro previo para la provincia de Buenos Aires consiste en una pareja posada sobre un tala (*Celtis tala*), en los alrededores de la ciudad de Ramallo, a orillas del Río Paraná (Maugeri y Montenegro, 2002). Catálogos previos para la provincia lo indican como ausente en la región (Narosky y Di Giacomo, 1993; Darrieu y Camperi, 2001).

Este sería el primer registro de nidificación de *M. cactorum* en la provincia de Buenos Aires, así como también la localidad más austral donde se registra la especie, extendiendo su rango de distribución unos 250 kilómetros hacia el sur.

## AGRADECIMIENTOS


Los autores desean agradecer a sus respectivos amigos y grupos familiares por el ánimo y ayuda en la realización de esta nota.

## BIBLIOGRAFÍA

- CABRERA, A.L. y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Serie Biológica 13: 1-178. OEA.
- DARRIEU, C.A. y A.R. CAMPERI. 2001. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. Probiota 2: 1-56.
- DE LA PEÑA, M.R. 2006. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía 15: 138 pág., Edit. L.O.L.A., Bs. As.
- GENISE, J.F., R.J. STRANECK y P.L. HAZELDINE. 1993. Sapsucking in the white-fronted woodpecker *Melanerpes cactorum*. Ornitología Neotropical 4: 77-82.



Hembra de *Melanerpes cactorum* en su nido.



Macho (abajo) y hembra (arriba) de *Melanerpes cactorum*. Las flechas indican los individuos.

MAUGERI, F.G. y M.J. MONTENEGRO. 2002. Tres nuevas citas de aves para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 21-22, Bs. As.

MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de aves argentinas. 164 pág., Lynx Edic., Barcelona.

NAROSKY, T. y A.G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. 127 pág., AOP, Vázquez Mazzini y L.O.L.A. Eds., Bs. As.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. 346 pág., AOP/Vázquez Mazzini Eds., Bs. As.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324, Tucumán.