



REGISTRO DE CAUQUÉN COLORADO (*Chloephaga rubidiceps*) EN EL ESTUARIO DEL RÍO COYLE, SANTA CRUZ, ARGENTINA

Mauro Ricci¹, Maria Florencia Padron¹ y María Luz Alsina¹

¹Asociación Ambiente Sur, Carlos Gardel 389, (9400) Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.
Correo electrónico: conservacion@ambientesur.org.ar

RESUMEN. En este trabajo se comunica el primer registro documentado de cauquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*) proveniente de observaciones en terreno durante su migración hacia el sur en el estuario del río Coyle (Santa Cruz, Argentina). Este registro pretende contribuir al conocimiento sobre las rutas migratorias y sitios que utiliza la especie.

ABSTRACT. RECORD OF THE RUDDY-HEADED GOOSE (*Chloephaga rubidiceps*) IN THE COYLE RIVER ESTUARY, SANTA CRUZ, ARGENTINA. We communicate the first documented record of the Ruddy-headed Goose (*Chloephaga rubidiceps*) through field observations during its southward migration in the Río Coyle estuary (Santa Cruz, Argentina). This record is intended to contribute to the knowledge of the migratory routes and sites used by the species.

INTRODUCCIÓN

El cauquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*) es una de las 18 especies de aves que actualmente se consideran En Peligro Crítico de extinción en Argentina (MAyDS y Aves Argentinas, 2017), ya que su población disminuyó considerablemente a raíz de la caza indiscriminada luego de su declaración como especie plaga para la agricultura en los años 30 (Rumboll, 1975). Desde entonces, diversos autores han realizado conteos de la especie, tanto en su área de cría en la isla de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) y el sur de Santa Cruz, como en su área de invernada en el sur de Buenos Aires (BirdLife International, 2024). Los conteos directos de individuos de la población “continental-fueguina” históricamente se mantuvieron por debajo de los 1.000 individuos, aunque existe al menos un registro documentado que supera ese umbral: el 18 de junio de 2016

se contabilizaron directamente 1.057 individuos en el partido de San Cayetano, sur de la provincia de Buenos Aires, constituyendo el mayor conteo directo registrado hasta el momento para la especie (Petracci y Carrizo, 2017; Petracci e Ibáñez, 2023).

Sumado a esto, el conocimiento de los sitios de parada y las rutas utilizadas por los cauquenes durante las migraciones se encuentra aún en desarrollo, y actualmente se los agrupa junto a las especies que realizan desplazamientos continentales australes frío-templados (Capllonch, 2018). Más recientemente, un estudio muestra evidencia de que los cauquenes colorados migrarían principalmente por la costa atlántica (Pedrana *et al.*, 2023). Teniendo en cuenta el estado crítico de la especie y el conocimiento actual sobre su migración, es que en este trabajo se publica el primer registro documentado de cauquenes colorados durante su paso migratorio hacia el sur por uno de los tres estuarios de la

provincia de Santa Cruz, con intención de aportar al conocimiento migratorio de la especie y la conservación de los sitios que utiliza.

Área de estudio

El estuario del río Coyle, considerado como Área Importante para la Conservación de las Aves (Di Giacomo *et al.*, 2005), se encuentra ubicado en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz (50°59'14.4"S; 69°15'14.5"O). Cuenta con una extensión aproximada de 20 km de largo desde su desembocadura hacia la costa. Próximo a la desembocadura del río, se encuentra la intersección con la Ruta Nacional N° 3, sitio conocido localmente como *puentes del Coyle*, que se caracteriza por presentar pastizales inundables, donde se observan regularmente cauqueses, principalmente comunes (*C. picta*).

RESULTADOS

El día 11 de agosto de 2025 se realizó un relevamiento de aves en el estuario del río Coyle, donde se registraron pulsos de bandadas de cauqueses volando por la costa en dirección noreste a sudoeste (correspondiente al sentido esperado de la migración primaveral hacia las zonas reproductivas) entrando hacia la desembocadura

del río. En dos de las bandadas se registraron cuatro individuos de *Chloephaga rubidiceps* (2 en cada una) y en ambas situaciones la especie formaba bandadas mixtas con sus congéneres *C. picta* y *C. poliocephala* (Foto 1).

Finalizado el relevamiento, se realizó una búsqueda de los cauqueses colorados avistados en el estuario en los *puentes del Coyle*, sin embargo no se observó ninguno. Si bien el área es extensa y gran parte se encuentra en propiedades privadas, no se descarta la posibilidad de que utilicen el sector como punto de parada ya que presenta hábitat apropiado e históricamente se concentran allí un número importante de cauqueses comunes (Petracci *et al.*, 2014; eBird.org). No obstante, Pedrana *et al.* (2020) postularon la hipótesis de que la migración de primavera es más corta en tiempo y en cantidad de paradas intermedias comparada con la migración otoñal, lo que podría explicar la ausencia de los cauqueses en el momento de la búsqueda. Es por ello que futuros esfuerzos deberían destinarse a relevamientos en el área que complementen la información sobre su uso durante las fechas de migración.

El área de estudio y zonas aledañas cuenta con pocos registros de *Chloephaga rubidiceps* en sus migraciones. Durante la migración de otoño hacia los sitios de invernada, se mencionan dos registros de seis cauqueses colorados en el estuario del río Coyle, dos en mayo de 2004 y cuatro en mayo de 2006 (Imberti *et al.*, 2007). Por el contrario, durante la migración de pri-



Foto 1. Dos cauqueses colorado (izquierda) y dos cauqueses reales (derecha) en el estuario del río Coyle, provincia de Santa Cruz (Argentina), el 11 de agosto de 2025. Autor: Mauro Ricci.

mavera hacia los sitios reproductivos se menciona el paso de cauquenes colorados en las cercanías al área de estudio, con registros que provienen de individuos con rastreadores satelitales (Pedrana *et al.*, 2023). Es por ello que nuestra publicación pretende aportar al conocimiento migratorio del cauquén colorado por la costa atlántica y, en particular, el uso del estuario del río Coyle en ambos sentidos de la migración, pudiendo ser ésta la primera observación en terreno de la especie en el área de estudio durante su migración al sur. Por otro lado, este estuario es el único de la provincia que está alejado de las urbanizaciones, por lo que la protección y conservación de los ambientes poco modificados que lo caracterizan, resultará fundamental para la migración de los cauquenes y otras especies allí registradas. El desarrollo potencial de proyectos de energía eólica en Santa Cruz podrían solaparse parcialmente con las rutas migratorias documentadas mediante telemetría satelital (Pedrana *et al.*, 2023), resultando en una nueva amenaza para el cauquén colorado y otras especies migratorias emblemáticas de Patagonia, como el macá tobiano (*Podiceps gallardoi*) (En Peligro Crítico) y el chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) (Vulnerable), tres aves consideradas como “Monumento Natural Provincial” (Leyes N° 3069, 2582 y 3373, respectivamente) en Santa Cruz y que utilizan el estuario en diferentes momentos de su ciclo de vida.

AGRADECIMIENTOS

Este registro fue posible gracias a los recursos brindados por la Asociación Ambiente Sur.

BIBLIOGRAFÍA

- BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2024.** Ficha de la especie: *Chloephaga rubidiceps*. Descargado de <https://datazone.birdlife.org> el 17/09/2025.
- CAPLLONCH, P. 2018.** Un panorama de las migraciones de aves en Argentina. *El hornero*, 33 (1): 01-18.
- DI GIACOMO, A. S., M. V. DE FRANCESCO y E. G. COCONIER. 2005.** Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. *Temas de Naturaleza y Conservación*, 5: 1-524.
- IMBERTI, S., C. D. AMORÓS y S. A. CADIerno. 2007.** Presencia y nidificación del Cauquén Colorado *Chloephaga rubidiceps* en la provincia de Santa Cruz, Argentina. *El Hornero*, 22 (1): 17-22.
- MAYDS y AA (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE y AVES ARGENTINAS). 2017.** Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires.
- PEDRANA, J., A. GOROSÁBEL, K. PÜTZ y L. BERNAD. 2023.** First assessment on the influence of wind farms and high-voltage networks on ruddy-headed goose *Chloephaga rubidiceps* migration in Patagonia, Argentina. *Polar Biology*, 46 (7): 639-653.
- PEDRANA, J., K. PÜTZ, L. BERNAD, S. MUÑOZ, A. GOROSÁBEL, G. CASTRESANA, A. LEISS y J. P. S. PON. 2020.** Spatial and temporal variation in the migration of Ruddy-headed Goose in southern South America using satellite tagging. *Bird Conservation International*, 30 (4): 634-648.
- PETRACCI, P. F., M. E. BRAVO, C. S. LIZARRALDE, M. L. FLOTRON, L. FASOLA, N. COSSA, C. D. AMORÓS, S. A. CADIerno y M. AMORÓS. 2014.** Situación poblacional de los cauquenes (*Chloephaga picta*, *C. poliocephala* y *C. rubidiceps*) en las áreas reproductivas del extremo sur de la Patagonia Argentina, Temporada 2013-2014. Estrategia Nacional para la Conservación y el Manejo del Cauquén Colorado, Cabeza Gris y Común en Argentina. Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires. 32 págs.
- PETRACCI, P. F. y H. IBÁÑEZ. 2023.** Cauquén colorado. Pp. 154-193. En: DALIA, A. V., V. BAUNI, M. HOMBERG y A. GIACCHINO (EDS.). Dos décadas de trabajo con especies amenazadas de la Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- PETRACCI, P. F. y M. CARRIZO. 2017.** Cauquén Colorado (*Chloephaga rubidiceps*), nuevo hallazgo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)*, 222.
- RUMBOLL, M. A. E. 1975.** El Cauquén de Cabeza Colorada (*Chloephaga rubidiceps*): una nota de alarma. *Hornero*, 11: 315-316.

Recibido: 26/3/2026 - Aceptado: 23/5/2026