

Nótulas FAUNÍSTICAS

406

Segunda Serie

Agosto 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

REGISTRO INÉDITO DE LA GARZA CUCHARONA (*Cochlearius cochlearius*) EN UNA LOCALIDAD PUNEÑA DE JUJUY, ARGENTINA

Julio C. Mamani^{1,2}, Oscar E. Vargas² y Juan Manuel W. Nadalino²

¹Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA). Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, (4000) Tucumán, Argentina. Correo electrónico: julio.c.mamani@outlook.com.ar

²Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Jujuy - CAFAJU. Jujuy, Argentina. República de Siria 147. (4600) San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina.

RESUMEN. Se documenta el primer registro de la garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) para la provincia de Jujuy, Argentina. El hallazgo corresponde a un ejemplar juvenil encontrado el 9 de abril de 2026 en La Intermedia (departamento de Yavi) a 3523 msnm, constituyendo el registro más occidental de la especie en el país y una marcada ampliación de su rango altitudinal. Se analizan las posibles causas de este registro, atribuyéndolo un evento de dispersión errático juvenil y descartando la hipótesis de mascotismo. Finalmente, se destaca el valor científico y conservacionista de los centros de rescate de fauna como fuentes de información sobre registros excepcionales.

ABSTRACT. UNPRECEDENTED RECORD OF THE BOAT-BILLED HERON (*Cochlearius cochlearius*) IN A PUNA LOCALITY OF JUJUY, ARGENTINA. The first record of the Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*) is documented for the province of Jujuy, Argentina. The finding corresponds to a juvenile specimen found on April 9, 2026, in La Intermedia (Yavi department) at 3,523 meters above sea level, constituting the westernmost record of the species in the country and a marked expansion of its altitudinal range. The possible causes of this record are analyzed, attributing it to a juvenile erratic dispersal event and discarding the hypothesis of keeping it as a pet. Finally, the scientific and conservation value of wildlife rescue centers as sources of information on exceptional records is highlighted.

INTRODUCCIÓN

La garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) tiene un pico notorio macizo ancho y alto de color negro opaco con mandíbula amarilla, iris negro, corona negra, frente blanca, abdomen castaño, alas y cola cenicientos. Los juveniles con corona sin frente blanca, cuerpo rufo acanelado con vientre blanco (López Lanús, 2017). Es solitaria o anda en pareja, de hábitos

nocturnos o crepusculares, y habita esteros con densa vegetación, ríos y arroyos arbolados (de La Peña, 2025).

La distribución de la garza cucharona abarca regiones neotropicales de América desde México hasta el nordeste de Argentina hasta los 700 msnm (Bravlsky *et al.*, 2009; López Lanús, 2017). En Bolivia su distribución es en el norte y este del país (Herzog *et al.*, 2016). En Zota (1942) se la cita por primera vez

en Argentina. Residente en el este de Formosa, el este de Chaco y el norte de Misiones (Pearman y Areta, 2020). Además, existe un registro aislado de un ejemplar juvenil en la provincia de Salta en un ambiente de yungas a 1310 msnm (Bravslasky *et al.*, 2009).

La especie está categorizada dentro de la UICN como Vulnerable y en Argentina como Amenazada (MayDS y AA, 2017).

RESULTADOS

El día 9 de abril de 2026 se tomó conocimiento a través de un llamado del Sr. Camilo Subelza, al CAFAJu (Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy) dependiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático (MACC), de la presencia de un ejemplar juvenil de garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en un puesto cercano a la localidad de La Intermedia (Dpto. Yavi, Jujuy, Argentina) (22°24'49.06"S; 65°42'22.27"O, 3532 msnm) (Mapa 1).

Según la comunicación, el ejemplar ingresó al domicilio de un particular perseguido por perros y fue alojado en una habitación aislada. Dentro de esta lo mantuvieron en una caja de la cual salió y se desplazó hasta perchar en una estructura metálica (Foto 1 y 2). De acuerdo a los datos ofrecidos el ejemplar tenía las plumas sin daños y no se trataba de un animal manso.

A partir de toda la información recabada, mediante comunicación telefónica se coordinó para que el ejemplar sea llevado hacia la ciudad de La Quiaca, para luego ser trasladado por personal del MACC al CAFAJu en la localidad de El Carmen. Sin embargo, el día 10 de abril en el domicilio donde estaba a resguardo en la ciudad de La Quiaca el ave fue encontrada sin vida por lo que se conservó el animal congelado (Foto 3 y 4) para luego ser trasladado a la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde se le tomaron medidas biométricas. El ejemplar será enviado para su depósito en la Colección Ornitológica del Instituto de Vertebrados de la Fundación Miguel Lillo de la Provincia de Tucumán.

De acuerdo con los datos relevados, se trata de un único individuo que no presenta signos de habituación al ser humano y corresponde a un ejemplar juvenil; en este sentido, y en concordancia con lo planteado por Braslavsky *et al.*, (2009) para el registro de Salta, su presencia en el área probablemente responda a un desplazamiento errático más que a eventos de mascotismo o a la existencia de poblaciones establecidas de la garza cucharona en la región. Sin embargo, este registro es de suma importancia, ya que constituye el primer reporte de la especie para la provincia de Jujuy (Camperi *et al.*, 2012) y el más occidental para la

Argentina. A esto se le suma que el hallazgo de este ejemplar representa el registro de un ejemplar muy alejado de su rango de distribución natural y de los sitios de observación (Ecoregistros y Ebird, 2026) (Mapa 1). Resulta también un dato curioso al encontrarse en un hábitat marcadamente distinto al cual está asociada (de la Peña, 2025), ya que en la zona donde fue encontrada corresponde a la ecorregión de la Puna, un ambiente frío y árido, con vegetación rala dominada por pastizales duros, arbustos bajos y suelos salinos en sectores (Cabrera, 1971) (Foto 5 y 6). Su presencia a 3532 msnm en un ambiente seco y frío representa una desviación extrema de su nicho ecológico habitual.

Descartamos la hipótesis de mascotismo por el estado de las plumas y el comportamiento del animal. En su lugar es altamente probable que este hallazgo responda a un fenómeno de dispersión errática juvenil. Los individuos jóvenes de la familia Ardeidae suelen realizar movimientos exploratorios tras abandonar el nido. Podría tratarse de un desplazamiento anómalo vinculado a eventos meteorológicos excepcionales que pudieron haber forzado el vuelo del ejemplar depositándolo en la meseta puneña. Ya se observaron en la provincia registros novedosos de especies que se encontraban muy alejadas de su distribución, como la garza encapuchada (*Nyctanassa violacea*) observada el 22 de octubre en la plaza de Tilcara, Jujuy, de la cual se cree está ampliando su distribución (Gorleri, 2019).

Este registro no solo amplió el conocimiento de la capacidad de desplazamiento de la especie, sino que subraya la importancia de la Puna como área receptora de registros accidentales de la avifauna neotropical.

Y es importante resaltar la importancia de los centros de rescate, en este caso CAFAJu. No solo su función en la conservación sino también como receptora de información geográfica, etológica y genética de especies residentes y ocasionales en la provincia, que de otra manera se perderían, también así su tarea educativa y de difusión.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy por la gestión y traslado del ejemplar.

A Patricia Capplonch por divulgar siempre el conocimiento de las aves. A Malvina Quintana, Diego Ortiz, Daniel Maidana, Diego Méndez y María García por sus aportes en el artículo. A Camilo Subelza por dar información de la aparición del ejemplar y comunicarse con el organismo actuante.



Foto 1. Juvenil de garza cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en el domicilio. Se lo observa con buena postura. Foto: Camilo Subelza.



Foto 2. Juvenil posado en estructura metálica, durante este período se comunicaban con el CAFAJu para su traslado. Foto: Camilo Subelza.



A



B

Foto 3. Detalles de las alas de la garza cucharona. A) ala derecha zona ventral, B) ala derecha parte ventral, no se observan desgaste de plumas por cautiverio en jaula o caja. Foto: Julio Mamani.



A



B



C




D

Foto 4. A) Cuerpo del juvenil, B) Pico con detalles negro y mandíbula amarilla, C) Patas amarillas, D) Parte superior del pico cuchara. Foto: Julio Mamani.



Foto 5. A y B. Detalle del ambiente donde se encontró el animal. En La Intermedia Jujuy, Argentina. Foto: Camilo Subelza.



Mapa 1. Se muestra la ubicación de este registro con el rombo ubicado en la provincia de Jujuy. En zona sumamente alejado de su rango de distribución.

BIBLIOGRAFÍA

- BRASLAVSKY, O., G. MULLER, J. C. CHEBEZ y L. E. RODRIGUEZ. 2009.** Hallazgo de la Garza Cucharona (*Cochlearius cochlearius*) en el noroeste argentino. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 33: 1-4.
- CABRERA, A. L. 1971.** Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, XIV (1-2): 1-41.
- CAMPERI, A. R., C. A. DARRIEU, P. G. GRILLI y F. BURGOS. 2012.** Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: Lista de especies (no Passeriformes). Acta Zoológica Lilloana, 56 (1-2): 82-140.
- DE LA PEÑA, M. 2023.** Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), 6: 1-281.
- GORLERI, F. 2019.** La Garza Encapuchada (*Nyctanassa violácea*), una nueva especie para Argentina. El Hornero, 34 (2): 50-52.
- HERZOG, S. K., R. S. TERRIL, A. E. JAHN, J. V. REMSEN, O. MAILARD, V. H. GARCIA-SOLIZ, R. MACLEOD, A. MACCORMICK y J. Q. VIDOZ. 2016.** Birds of Bolivia. Field guide. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- LOPEZ LANUS, B. 2017.** Guía Audiornis de las Aves Argentinas, fotos y sonidos, revisión actualizada: identificación por características contrapuestas y marcas sobre imágenes. Segunda edición ampliada. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 522 pp.
- MAYDS y AA (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y AVES ARGENTINAS). 2017.** Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, Edición electrónica. C.A. Buenos Aires, Argentina. 146 pp.
- PEARMAN, M y J. ARETA. 2020.** Aves de Argentina y el Atlántico Sudoccidental. Guía de campo. 480 pp.
- ZOTTA, A. 1942.** El Pico Cuchara *Cochlearius cochlearius*, nueva especie para la avifauna argentina. Hornero, 7 (2): 177-178.
- EBIRD. 2026.** Registro de observaciones de *Cochlearius cochlearius*. <https://ebird.org/species/bobher1>
- ECOREGISTROS. 2026.** Ficha de *Cochlearius cochlearius*. <https://www.ecoregistros.org/ficha/Cochlearius-cochlearius>
- VERSION: EBD_RELAPR EBIRD BASIC DATASET -2026.** Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Apr. 2026. (Mapa)
- KUSHLAN, J. A. Y J. A. HANCOCK. 2005.** The herons. Oxford University Press, Oxford, U.K. (Mapa)

Recibido: 6/6/2026 - Aceptado: 18/7/2026