

## REGISTROS NOVEDOSOS DE AVES ACUÁTICAS PARA EL NOROESTE Y CENTRO DE LA ARGENTINA

Pablo Cuervo <sup>1</sup>, Cecilia Fantozzi <sup>2</sup> y Lucas Sbriglio <sup>3</sup>

1. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Universidad Juan A. Maza; Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245 (5519), Guaymallén, Mendoza, Argentina. Correo electrónico: pablofcuervo@hotmail.com
2. Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales, Universidad Juan A. Maza; Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245 (5519), Guaymallén, Mendoza, Argentina. Correo electrónico: ceciliafantozzi@gmail.com
3. Departamento de Medicina Veterinaria, Municipalidad de Maipú; Martínez 102 (5515), Maipú, Mendoza, Argentina. Correo electrónico: lucassbriglio@hotmail.com

**RESUMEN:** Se presentan registros novedosos para cuatro especies de aves acuáticas en las regiones Noroeste y Centro de la República Argentina, además de un registro para una quinta especie que podría constituirse en uno de los primeros para las regiones mencionadas. En el caso de la Gallareta Andina (*Fulica ardesiaca*) se trata del primer registro para la provincia de San Juan y límite austral para la especie, mientras la Gallareta Escudete Rojo (*Fulica rufifrons*) es confirmada para el norte de la misma, constituyéndose en el registro más septentrional para dicha provincia. Se confirma también la presencia del Tuyuyú (*Mycteria americana*) y la Gallareta Chica (*Fulica leucoptera*) para el oeste de Salta. Finalmente se da a conocer el primer registro documentado del Chajá (*Chauna torquata*) para la provincia de Catamarca.

**ABSTRACT: NEW RECORDS OF WATERFOWL IN CENTRAL AND NORTHWEST REGIONS OF THE ARGENTINE REPUBLIC** Four new records of waterfowl species have been identified in Central and Northwest regions of the Argentine Republic, besides a record of a fifth species that could constitute one of the first in the mentioned regions. In the case of Andean Coot (*Fulica ardesiaca*) it is the first record made at the province of San Juan and the southernmost limit known for the species, meanwhile Red-fronted Coot (*Fulica rufifrons*) is confirmed in the north of the same province, constituting the provincial northernmost record. The presence of American Wood Stork (*Mycteria americana*) and White-winged Coot (*Fulica leucoptera*) in western Salta is confirmed. Finally, the first documented record for Southern Screamer (*Chauna torquata*) in Catamarca province is presented.

### INTRODUCCIÓN

A lo largo de una travesía por la Ruta Nacional N° 40, desde la ciudad de Mendoza en la provincia homónima hasta La Quiaca, en la provincia de Jujuy, se recopiló una serie de registros novedosos para cinco especies de aves acuáticas en provincias que se ubican en las regiones Centro y Noroeste de la República Argentina. Se presentan las primeras citas con nuevas localidades, y se amplían las distribuciones conocidas.

### RESULTADOS

#### *Mycteria americana* - Tuyuyú

El 29 de marzo de 2010 se observaron 4 ejemplares juveniles de esta especie (Foto 1) en una pequeña laguna en las cercanías de la Estancia El Carmen, ubicada aproximadamente a 1,5 km al este de la localidad de Angastaco, en el departamento San Carlos, en las márgenes del río Calchaquí, a 1.883 m s.n.m., cuyas coordenadas geográficas son: 25°37'54,61" S, 66°10'11,46" O. En el mismo

sitio se observaron ejemplares de Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax*), Garza Blanca (*Ardea alba*), Garcita Blanca (*Egretta thula*), y un ejemplar de Garza Azul (*Egretta caerulea*) (Cuervo y Fantozzi, inf. inéd.).

Se distribuye en ambientes con humedales, en las regiones de la Cuenca del Plata, Chaco y Pampas (Coconier, 2006). En la provincia de Salta, la distribución usualmente abarca el este y el centro de la misma (Olrog y Pescetti, 1991; De La Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003; Ridgely *et al.*, 2003; Rodríguez Mata *et al.* 2006). Ha sido citada en las siguientes áreas protegidas de la provincia: Reserva Provincial de Flora y Fauna de Acambuco, ubicada en el departamento General José de San Martín (Coconier, 2007), Parque Nacional Los Cardones, ubicado en los departamentos de San Carlos y Cachi (Moschione, 2009; Zuretti Calvo, 2009), Parque Nacional Baritú, ubicado en el departamento Santa Victoria (Chebez *et al.*, 1998), y finalmente Reserva Natural General Pizarro (Moschione y González, 2007) y Parque Nacional El Rey (Chebez *et al.*, 1998), ambos ubicados en el departamento Anta.

El registro para el oeste de Salta no es frecuente y la presencia en el área podría responder a un desvío de la ruta migratoria, ya que esta especie suele efectuar migraciones desde el Litoral hacia las provincias de Chaco, Formosa y Salta (Capllonch, 2004). El presente registro podría ser uno de los más occidentales conocidos hasta el presente.

#### ***Chauna torquata* - Chajá**

El 28 de marzo de 2010 se observaron y fotografiaron tres ejemplares de esta especie (Foto 5) a 6 km al sudoeste de la localidad de Hualfín, departamento Belén, en el oeste de la provincia de Catamarca (27°16'15,66" S - 66°52'3,22" O), a 1758 m s.n.m. Los individuos se encontraban, junto a dos Guayatas (*Chloephaga melanoptera*), en una zona de bañados temporales, formados por desbordes del río de Los Nacimientos o Las Cuevas, a la vera de la Ruta Nacional N° 40.

La especie se encuentra presente en los humedales de las regiones pampeana y chaqueña. Narosky e Yzurieta (2003) y Rodríguez Mata *et al.* (2006) no la incluyen para la provincia de Catamarca, mientras que Olrog y Pescetti (1991) extienden la presencia hasta el sur de la provincia de Río Negro y la mapean para el este de Catamarca, al igual que Ridgely *et al.* (2003), aunque sin datos precisos. Camperi & Darrieu (2001) no indican su presencia en la provincia.

Este registro podría constituir la primera evidencia confirmada de la especie para la provincia de Catamarca. Además, se publicó recientemente su hallazgo para el este de las provincias de Mendoza y San Juan (Martínez *et al.*, 2009), conformando junto con el presente reporte los hallazgos que confirmarían la presencia para el oeste del país.

#### ***Fulica leucoptera* - Gallareta Chica**

Se pudo observar un ejemplar (Foto 2) en la misma fe-

cha y lugar donde se constató la presencia de cuatro ejemplares de *Mycteria americana*. El individuo se hallaba en una de las márgenes del cuerpo de agua, acicalándose. La especie se distribuye en gran parte de los humedales del territorio nacional; según lo confirma Coconier (2006), informando su presencia para las regiones Pampeana, de la Cuenca del Plata, Chaco, Patagonia y accidentalmente en las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. De acuerdo a Narosky e Yzurieta (2003), no se encontraría en las ecorregiones de Altos Andes, Puna y Monte de Sierras y Bolsones, con límite occidental, en la provincia de Salta, aproximadamente en el centro de la misma; mientras que para Ridgely *et al.* (2003) el límite occidental de la especie comprendería escasamente el este de las regiones del noroeste argentino y Cuyo. En la provincia de Salta se encontraría en el Parque Provincial Laguna Pintascayo, ubicado en el departamento Orán (Saravia *et al.*, 2008). Además en la Reserva Natural General Pizarro y Parque Nacional El Rey (Pereira y Fracassi, 1999; Moschione y González, 2007) y Parque Nacional Los Cardones (Moschione, 2009).

La cita confirmaría el límite más occidental conocido de su distribución, coincidiendo con lo propuesto por Narosky e Yzurieta (2003).

#### ***Fulica ruffrons* - Gallareta Escudete Rojo**

Se informa de la observación de cinco ejemplares (Foto 3), el 27 de marzo de 2010, en el Embalse Cauquenes, también conocido como Dique de Huaco o Dique de Los Lisos, a 15 kilómetros al noreste de San José de Jachal, ciudad cabecera del departamento homónimo, en el norte de la provincia de San Juan, cuyas coordenadas son: 30°9'11,5" S - 68°37'41,8" O. Los individuos se encontraban alimentándose en aguas poco profundas del embalse. Además se constató la presencia de un ejemplar de *Fulica ardesiaca*. En cuanto a las especies acompañantes se pudieron observar numerosos ejemplares de *Ardea alba*, *Egretta thula* y un ejemplar de Espátula Rosada (*Platalea ajaja*) (Cuervo *et al.*, inf. inéd.).

Se trata de un habitante frecuente en algunos humedales del país, encontrándose en las regiones de la Pampa, Cuencas del Plata, Chaco, Patagonia e Islas Malvinas y archipiélagos del Atlántico Sur (Coconier, 2006). Según Olrog y Pescetti (1991) y Narosky e Yzurieta (2003) la distribución abarcaría las regiones del Espinal, Pampeana, la Estepa Patagónica y el Monte. Sin embargo Ortiz y Murúa (1994) citan la presencia para 4 humedales del centro y sur de la provincia de San Juan, en los valles del Tulum y de Ullum-Zonda.

El registro constituye el primero para el norte de San Juan. Según intuían Ortiz y Murúa (1994), la distribución no estaría restringida al este provincial, sino que, simplemente, los reportes son escasos y no reflejan su verdadera distribución.

#### ***Fulica ardesiaca* - Gallareta Andina**

Se informa del hallazgo de un ejemplar de *Fulica ardesiaca* (Foto 4), junto a cinco ejemplares de *Fulica*

*rufifrons*, en un sector del Embalse Cauquenes. Se trata de una especie presente en los humedales del Altiplano y prepuna (Jaramillo, 2003). Según Narosky e Yzurietta (2003) se distribuye por el centro-oeste de Jujuy, oeste de Salta, centro-oeste de Catamarca y oeste de La Rioja. Sin embargo, según De la Peña (1999) y Navas y Camperi (2006) la especie habitaría sólo en

las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, mientras que para Ridgely *et al.* (2003) se encontraría sólo en el centro de Jujuy y una pequeña franja en el centro-oeste de Salta.

Este sería no sólo el registro más austral de la especie hasta la fecha, sino también la primera cita para la provincia de San Juan.



**Foto 1.** Ejemplares juveniles de *Mycteria americana*, vadeando un ámbito lacustre. Es interesante destacar que los juveniles presentan patas de coloración clara y dedos parduzcos, mientras que en los adultos son amarillentos (Foto: P. Cuervo).



**Foto 2.** Ejemplar de *Fulica leucoptera* hallada en el oeste de Salta (Foto: P. Cuervo).



**Foto 3.** Ejemplar de *Fulica rufifrons* en un ambiente léntico y de escasa profundidad del Embalse Cauquenes, en el norte de la provincia de San Juan (Foto: P. Cuervo).



**Foto 4.** Primer registro de Gallareta Andina (*Fulica ardesiaca*) para la región de Cuyo, detrás de una *Fulica ruffifrons* (Foto: P. Cuervo).



**Foto 5.** Ejemplares de *Chauna torquata* en el departamento de Belén, provincia de Catamarca (Foto: P. Cuervo).

## BIBLIOGRAFÍA

- CAPLLONCH, P.** 2004. Migraciones de Aves en el Litoral argentino. En: Temas de la Biodiversidad del Litoral Fluvial Argentino, F.G. ACEÑOLAZA (Coord.). Instituto Superior de Correlación Geológica (INSUGEO) Miscelánea, 12: 363-368.
- CHEBEZ, J.C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO.** 1998. Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Literature of Latin America (L.O.L.A.). Monografía n° 12, Buenos Aires, Argentina. 127 pp.
- CHEBEZ, J.C.** 2005a. Guía de las Reservas Naturales de la Argentina. Tomo 4: Noroeste. Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina. 256 pp.
- CHEBEZ, J.C.** 2005b. Guía de las Reservas Naturales de la Argentina. Tomo 5: Centro. Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina. 288 pp.
- COCONIER, E.** 2006. Reporte Final Aves Acuáticas en la Argentina. En: La Conservación de las Aves Acuáticas para las Américas (Waterbird Conservation for the Americas), D.E. Blanco (Revisor). *Wetlands International*, Buenos Aires, Argentina. 141 pp.
- COCONIER, E.G.** 2007. Las aves silvestres de Acambuco: relevamientos de un AICA prioritaria de la selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación 6: 1-127. Primera Edición. Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
- DE LA PEÑA, M. R.** 1999. Aves Argentinas, Lista y Distribución. Literature of Latin America (L.O.L.A.). Monografía N° 18, Buenos Aires, Argentina. 244 páginas.
- JARAMILLO, A.** 2003. Birds of Chile. Princeton Field Guides. Princeton. 240 pp.
- MADRID, F.** 1993. Censo Neotropical de Aves Acuáticas. Parque Nacional El Rey. En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad. [www.parquesnacionales.gov.ar](http://www.parquesnacionales.gov.ar)
- MARTÍNEZ, F., F. LUCERO, R. CALÍ, D. VALDÉS, D. FERRER y J.C. CHEBEZ.** 2009. Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. Nótulas Faunísticas – Segunda Serie, 35: 1-9.
- MOSCHIONE, F.N.** 2009. Diversidad y conservación de la avifauna del Parque Nacional Los Cardones. 11 pp. En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad. [www.parquesnacionales.gov.ar](http://www.parquesnacionales.gov.ar)
- MOSCHIONE, F.N. y M.A. GONZÁLEZ.** 2007. Aves de la Reserva Natural General Pizarro. Provincia de Salta. Lista preliminar de la Reserva Natural en formación, actualizada a marzo de 2007. Informe inédito. APN-DRNO. 12 pp. En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad. [www.parquesnacionales.gov.ar](http://www.parquesnacionales.gov.ar)
- MOSCHIONE, F.N., A.L. SUREDA, C. RODRÍGUEZ y A.J. SANDOBAL.** 2010. Lista de Aves de la Laguna de los Pozuelos. Informe N° 57/10. APN-DRNO. 5 pp. En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad. [www.parquesnacionales.gov.ar](http://www.parquesnacionales.gov.ar)

- NAROSKY T. y D. YZURIETA.** 2003. Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, Argentina. 346 pp.
- NAVAS J.R. y A.R. CAMPERI.** 2006. Novedades y comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves del noroeste de la Argentina II. Revista de Museo Argentino de Ciencias Naturales, 8 (1): 105-109.
- OLROG, C.C. y E.A. PES CETTI.** 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT). Mendoza, Argentina. 160 pp.
- ORTIZ, G. y F. MURÚA.** 1994. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de San Juan (Argentina) I. Ciénaga de Zonda, presa embalse Quebrada de Ullum, Arroyo de los Taponés y Arroyo del Agua Negra. Multequina 3: 125-131.
- PEREIRA, J. y N. FRACASSI.** 1999. Registro de observación de especies. Parque Nacional El Rey. 4 pp. En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad. [www.parquesnacionales.gov.ar](http://www.parquesnacionales.gov.ar)
- RIDGELY, R.S., T.F. ALLNUTT, T. BROOKS, D.K. MCNICOL, D.W. MEHLMAN, B.E. YOUNG, y J.R. ZOOK.** 2003. Digital Distribution Maps of the Birds of the Western Hemisphere, versión 1.0. Nature Serve, Arlington, Virginia, United States of America.
- RODRÍGUEZ MATA J., F. ERIZE y M. RUMBOLL.** 2006. - Aves de Sudamérica. Guía de Campo Collins, No Passeriformes: ñandúes a carpinteros. Letemendia Casa Editora, Buenos Aires, Argentina. 383 pp.
- SARAVIA M., S. DE BUSTOS, V. RODRIGUEZ, G. MAIRE, L. FAGES, L. LIZÁRRAGA, S. D' INGINATI y M. JIMENEZ.** 2008. Plan Integral de Manejo y Desarrollo del Parque Provincial Laguna Pintascayo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta – Plan Estratégico de Acción para la Conservación de la Alta Cuenca del Río Bermejo, Comisión Binacional (Argentina y Bolivia) para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río Grande de Tarija (COBINABE). 115 pp.
- ZURETTI CALVO, M.L.** 2009. Registros de nuevas especies de aves en la Seccional El Churcal, Parque Nacional Los Cardones. 3 planillas de avistaje. En: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de la Biodiversidad. [www.parquesnacionales.gov.ar](http://www.parquesnacionales.gov.ar)