

# Nótulas FAUNÍSTICAS

87

Segunda Serie

Marzo 2012

F H N

FUNDACIÓN  
DE HISTORIA NATURAL  
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

## PRIMER REGISTRO DE LA GARZA AZUL (*Egretta caerulea*) PARA LA PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA

Patricio Cowper Coles<sup>1,3</sup>, Natalia Cristina Meyer<sup>1,4</sup>, Oscar Braslavsky<sup>2,5</sup>, Gisela Müller<sup>6</sup>  
y Bárbara Gasparri<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Grupo Rescate Silvestre. Correo electrónico: rescatesilvestre@gmail.com

<sup>2</sup>Fundación Red Yaguareté.

<sup>3</sup>Av. Sarmiento 171 Dpto. C, Resistencia (3500), Chaco, Argentina. Correo electrónico: pcowpercoles@gmail.com

<sup>4</sup>Ayacucho 4940, Barranqueras CP (3503), Chaco, Argentina. Correo electrónico: nataliameyer10@gmail.com

<sup>5</sup>Hipólito Yrigoyen 264 Resistencia (3500), Chaco, Argentina. Correo electrónico: guaycuru65@yahoo.com.ar

<sup>6</sup>Parque Nacional Mburucuyá C.C. 1 (3427) Mburucuyá, Corrientes, Argentina. Correo electrónico: gsl.muller@gmail.com

<sup>7</sup>Área Biodiversidad. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. CEBBAD - Universidad. Maimónides. Hidalgo 775 piso 7 (1405), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Correo electrónico: barbara\_s\_g@yahoo.com.ar

**RESUMEN.** Se registra por primera vez a la Garza Azul (*Egretta caerulea*) para la provincia del Chaco, en base a un avistaje directo de un ejemplar juvenil, acompañado de una fotografía en el Paraje Fortín Arenales. Asimismo, se resalta el valor del hallazgo por su cercanía al futuro Parque Nacional a crearse en la Estancia La Fidelidad.

**ABSTRACT. FIRST RECORD OF THE BLUE HERON (*Egretta caerulea*) IN PROVINCE OF CHACO, ARGENTINA.** A juvenile individual of *Egretta caerulea* was sight and photograph in a small village, Fortin Arenales. This finding is a matter of great relevance due to its proximity to the protected area planed to be created in La Fidelidad.

### INTRODUCCIÓN

La Garza Azul (*Egretta caerulea*) presenta una amplia distribución desde Norteamérica hasta la Argentina (Lozano, 1978). Ha sido citada recientemente para el país según Mazar Barnett y Pearman (2001), por dos registros visuales en 1992 y 1993 efectuadas en la provincia de Formosa por Contreras (1993), a la cual se añaden dos registros en 1994 y 1995 del Sr. F. Moschione para la misma provincia. Posteriormente, en 1998 se observaron tres individuos en el norte de la provincia de Salta por Fraga y Clark (1999) y tres adultos fotografiados en el dique Itiyuro en 1998 por

el Sr. M. Pearman (2001). Existen además menciones para las provincias de Buenos Aires (Diéguez, 1997), Tucumán (Casañas *et al.*, 2002), para el área de Acambuco (Coconier, 2007) y el departamento San Carlos (Cuervo y Fantozzi, 2011) en Salta, para la localidad de Rufino en Santa Fe (Agnolin *et al.*, 2009), para Miramar en Córdoba (Coconier, 2005) y una reciente observación para las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero por Gómez (2011). Además fue fotografiada en la provincia de Corrientes por Carlos Figuerero en 2009. El registro más austral de la especie sería para el nordeste de Chubut y fue realizado por Kirwan (2002).

## RESULTADOS

El presente registro se llevó a cabo el día 10 de septiembre de 2011 a las 14:40 hs en la laguna del Paraje Fortín Arenales, departamento General Güemes, provincia del Chaco, mientras se recorría la zona con la finalidad de realizar un relevamiento de fauna en la Estancia la Fidelidad y sus alrededores (Braslavsky *et al.*, 2011). La observación consistió en un ejemplar juvenil posado sobre un árbol seco, permaneciendo durante más de una hora, lo cual permitió la obtención de fotografías.

El plumaje del ejemplar correspondía a un juvenil: de coloración blanca, con manchas azul claro, el pico algo curvo de color violáceo con la punta más oscura y las patas de tonalidad verdosa (Rodríguez Mata *et al.*, 2006; Sigrist, 2009) tal como puede apreciarse en las imágenes (Fotos 1, 2, 3 y 4). El ejemplar permaneció la mayor parte del tiempo prácticamente inmóvil y en una ocasión se dedicó a acicalar su plumaje y estirar el cuello para luego volver a encogerlo. El individuo permaneció 35 minutos en la percha.

La laguna del Paraje Fortín Arenales se encuentra a menos de 100 metros de la ruta provincial N° 9, que pasa por el Paraje y a menos de 300 metros del río Bermejito, ubicado al límite sur del futuro Parque Nacional La Fidelidad (Mapa 1). De acuerdo a comentarios efectuados por los pobladores locales, la laguna se habría secado solo un año, constituyendo un buen recurso y albergando una rica y estable población de peces.

## DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El hecho de ser un ejemplar juvenil, al igual que la mayor parte de los registros de esta especie en el país, indicaría que la misma se reproduce en el área y que posiblemente se encuentra en expansión poblacional, tal como lo afirma Chebez (2009).

Es importante destacar la proximidad del registro a la Estancia La Fidelidad, que fuera anunciada como futuro Parque Nacional en la Provincia del Chaco, siendo muy probable su presencia dentro de la futura área protegida.

Considerando la extensa superficie de la Estancia La Fidelidad y teniendo en cuenta que se tratarían de registros de zonas periféricas mayormente antropizadas, nos abre la posibilidad de encontrar zonas de nidificación, tanto de esta especie como de otras con similar interés de conservación en el área mencionada.

## AGRADECIMIENTOS

A los pobladores del Paraje Fortín Arenales por los datos aportados sobre la fauna de la zona, especialmente a Don Palma y su hermana por recibirnos tan gentilmente, a Savina Ibañez por su amabilidad, al maestro Daniel Rizo Patral y alumnos de la Escuela EGB N° 798 por recibirnos y escucharnos.



**Foto 1.** La postura delata en detalle los caracteres sobresalientes del plumaje del ejemplar juvenil ya descriptos (10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.



**Foto 2.** La secuencia de perfil destaca el diseño del pico, levemente curvado en el ápice. Luego desde su base hasta algo más de la mitad del tomia es claro para culminar en pardo oscuro (10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.



**Foto 3.** Al acicalarse quedan expuestas algunas plumas del ápice de las primarias alares de llamativos filetes oscuros y debajo del cuello las sobresalientes e incipientes egrettes (10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.




**Foto 4.** Típica postura de reposo de las *Egretta* spp., mientras expone su plumaje al sol (10 de septiembre de 2011). Foto: Patricio Cowper Coles.

#### BIBLIOGRAFÍA

- AGNOLIN, F.L., N.R. CHIMENTO, C. FRANK y R.F. LUCERO. 2009.** Nuevos registros de aves argentinas. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie) 34, Buenos Aires.
- BRASLAVSKY, O.H., G.C. MÜLLER, P. COWPER COLES, N.C. MEYER y N.A. NIGRO. 2011.** Registro de Fauna en la Estancia La Fidelidad y alrededores. Provincias de Chaco y Formosa. Reportes Tigreros. Serie Investigación (4): 1-17. Red Yaguareté, Buenos Aires
- CASAÑAS, H., J.M. KLAVINS y R. CARGNELUTTI. 2002.** La garza azul *Egretta caerulea*, en la provincia de Tucumán, Argentina. *Cotinga* 18: 106-107.
- CHEBEZ, J.C. 2009.** Otros que se van. Fauna argentina amenazada. 552 páginas, Albatros, Buenos Aires.
- COCONIER, E.G. 2005.** Reporte final, aves acuáticas en la Argentina. *Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- COCONIER, E.G. 2007.** Las aves silvestres de Acambuco, provincia de Salta, Argentina. Relevamientos de una AICA prioritaria de la Selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación 6. *Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.





**Mapa 1.** Ubicación del avistaje de *Egretta caerulea*, marcando los parajes más próximos y la superficie del futuro Parque Nacional La Fidelidad (elaboración propia sobre mapa de ETISIG-Chaco).

**CONTRERAS, J.R. 1993.** Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de Formosa. *Nótulas Faunísticas* (primera serie) 47: 1-8.

**CUERVO, P.F. y C. FANTOZZI. 2011.** Garza Azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Salta, Argentina. *Nuestras Aves* 56: 26-27.

**DIÉGUEZ, A.J. 1997.** *Ardea caerulea* Burmeister, 1860 (Aves: Ardeidae) en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. *APRONA* 9: 2-3.

**FRAGA, R.M y R. CLARK. 1999.** Notes on the avifauna of the upper Bermejo river (Argentina and Bolivia) with a new species for Argentina. *Cotinga* 12: 77-78.

**GÓMEZ, N. 2011.** Primer registro de Garza Azul (*Egretta caerulea*) en la provincia de Santiago del

Estero, Argentina. *Ecoregistros Revista* N° 1, art. N° 17.

**KIRWAN, G. 2002.** Nuevos registros de Garza Azul (*Egretta caerulea*) y Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*) en el sur argentino. *Nuestras Aves* 44:11.

**LOZANO, J. 1978.** Guía de aves de América del Sur. Tomo I. Crea Ed., Buenos Aires, 205 págs.

**PEARMAN, M. 2001.** Notes and range extension of some poorly known birds of northern Argentina. *Cotinga* 16: 76-80.

**RODRÍGUEZ MATA J., F. ERIZE y H. RUMBOLL. 2006.** Guía de Campo Collins. Aves de Sudamerica, no passeriformes. Editorial Letemendia.

**SIGRIST, T. 2009.** Guía de Campo Avis Brasilis – Avifauna Brasileira. Ed. Avisbrasilis. Brasil.