

Nótulas FAUNÍSTICAS

97

Segunda Serie

Julio 2012

F H N
FUNDACIÓN
DE HISTORIA NATURAL
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

NUEVOS REGISTROS Y DISTRIBUCIONES DE AVES PARA LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN, MENDOZA Y LA RIOJA. PARTE II

Francisco Lucero

Ruta N° 319 S/N, Cienaguita (5431), provincia de San Juan, Argentina.
Correo electrónico francilucero@hotmail.com

RESUMEN. Se dan a conocer nuevos registros para seis especies de aves para la provincia de San Juan. Estas especies son la Bandurria Boreal (*Theristicus caudatus hyperorius*), el Gaviotín Lagunero (*Sterna trudeaui*), el Anó Grande (*Crotophaga major*), el Picaflor de Barbijo (*Heliomaster furcifer*), un Doradito (*Pseudocolopteryx* sp.) y el Barullero (*Euscarthmus meloryphus*). Asimismo se da conocer por primera vez un registro documentado de *Theristicus caudatus hyperorius* para la provincia de Mendoza y al Anambé Común (*Pachyramphus polychopterus*) para la provincia de La Rioja. Adicionalmente, se comentan nuevas citas en la región cuyana de cinco especies con escasos registros documentados, las cuales son el Chajá (*Chauna torquata*), el Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*), el Chorlito Puneño (*Charadrius alticola*) y el Suirirí Pico Corto (*Sublegatus modestus*). Finalmente se documenta fotográficamente la presencia del Rey del Bosque (*Pheucticus aureoventris*) en la provincia de San Juan.

ABSTRACT. NEW BIRD RECORDS AND DISTRIBUTIONS FOR THE PROVINCES OF SAN JUAN, MENDOZA AND LA RIOJA. PART II. Six new bird records for the province of San Juan are here reported. These records include The Buff-Necked Ibis (*Theristicus hyperorius caudatus*), the Snowy – Crowned Tern (*Sterna trudeaui*), the Greater Ani (*Crotophaga major*), the Blue-Tufted Starthroat (*Heliomaster furcifer*), a Doradito (*Pseudocolopteryx* sp.) and the Tawny-Crowned Pygmy-Tyrant (*Euscarthmus meloryphus*). For the first time, a documented record for *Theristicus caudatus hyperorius* is reported for the first time for the province of Mendoza and the first record of the Common White-Winged Becard (*Pachyramphus polychopterus*) for the province of La Rioja. In addition, new distribution records from the Cuyo region are indicated above. These records include five species, including the Southern Screamer (*Chauna torquata*), the Crowned Eagle (*Harpyhaliaetus coronatus*), the Puna Plover (*Charadrius alticola*) and Southern Scrub-Flycatcher (*Sublegatus modestus*). Finally, the presence of the Black-Backed Grosbeak (*Pheucticus aureoventris*) is documented for the province of San Juan.

INTRODUCCIÓN

Se presentan nuevos registros y distribuciones de doce especies de aves para las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Estos nuevos hallazgos se realizaron en diferentes campañas abarcando la época estival desde noviembre de 2010 a marzo de 2011.

RESULTADOS

Theristicus caudatus hyperorius

El 30 de diciembre de 2010, en campos inundables al sur del departamento Sarmiento, provincia de San Juan, cerca del límite geográfico con la provincia de Mendo-

za se observó un ejemplar de esta especie que se alimentaba en pastizales (32°09'08''S 68° 27' 54'' O, 544 m s.n.m). Dicho espécimen, luego voló para descender a 2 km aproximadamente en la Laguna Seca, departamento Lavalle, provincia de Mendoza (32°09'31''S 68° 26' 59'' O, 542 m s.n.m) (Fotos 1 y 2).

El 27 de marzo de 2011 se observó una bandada de diez ejemplares (Foto3) en el extremo este de la Laguna Seca confirmando el límite entre las dos provincias cuyanas con un número importante de individuos.

El 10 de abril de 2011, en la laguna ya citada, fue observada una bandada de 34 ejemplares descansando a orillas de la laguna.

La especie habita en la Argentina en humedales y bordes de bosques en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe y Entre Ríos (Narosky e Yzurieta, 2010), Catamarca y La Rioja (De La Peña, 2010). Los registros más cercanos a la provincia de San

Juan corresponden al norte de San Luis y Córdoba en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, abarcando los departamentos de Punilla, Santa María y San Alberto y en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala en los departamentos de Calamuchita, San Alberto, San Javier, Cruz del Eje, Punilla y Santa María donde la presencia de la especie se ha enrarecido según señalan Miatello *et al.* (1999).

Es necesario recordar que en la pionera guía de Olrog (1984) se limita a mencionar a *Theristicus caudatus* para la provincia. En el trabajo de Sosa (2005), en su listado provincial, dicho autor menciona a la Bandurria Austral (*Theristicus melanopsis*) como la especie presente para Mendoza.

Chauna torquata

El 26 de diciembre de 2010, en la Laguna del Toro, departamento Sarmiento, provincia de San Juan




Foto 1. Ejemplar observado el 30 de diciembre de 2010, en el departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Típica postura del vuelo ascendente en busca de corrientes más cálidas que permite al ejemplar ganar altura. Foto: Francisco Lucero.




Foto 2. La imagen frontal del ejemplar de *Theristicus caudatus* permite apreciar el área gular dividida, los flancos superiores del pectoral, negros y la carencia de collar grisáceo. Además se aprecia una de las cobijas alares externas, blanca. Elementos que la diferencian de la Bandurria Austral (*Theristicus melanopsis*). Foto: Francisco Lucero.



Foto 3. El hábito de conformar bandada se intensifica al culminar el ciclo reproductivo en *Theristicus caudatus*. Fotografía del 27 de marzo de 2011 en la Laguna Seca, Lavalle, Mendoza. Foto: Francisco Lucero.



Foto 4. Ejemplares de *Chauna torquata* vadeando el bañado y otros compartiendo el vuelo con individuos de Tuyuyú (*Mycteria americana*) el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

(32°05'32''S 68° 20' 08'' O, 540 m s.n.m) se observó una bandada que superaba los treinta a ejemplares, todos ellos reunidos en aguas someras (Foto 4). Dabbene (1910), siguiendo a Fontana (1908), la indica para el este de San Juan. Martínez *et al.* (2009) incluyen otros sitios observados de esta especie para la zona cuyana.

Harpyhaliaetus coronatus

La especie es considerada como “En Peligro” en la Argentina, según López-Lanús *et al.* (2008). El trabajo de Chebez *et al.* (2011) añade la información sobre la

presencia de *Harpyhaliaetus coronatus* para 23 áreas protegidas en el país, 9 de alcance nacional, 11 de carácter provincial y 3 áreas protegidas privadas.

La especie ha sido citada en las provincias de San Juan (De Lucca, 1992), Mendoza (Reed, 1916) y San Luis (Ochoa de Masramón, 1983). Aquí se detallan tres nuevos registros para la región cuyana.

El 1 de mayo de 2009 aperchados en un bosquecillo de chañar (*Geoffroea decorticans*) junto a una pequeña represa en el secano lavallino (32° 26'46''S 67° 24' 58'' O, 494 m s.n.m.) ubicado en el departamento Lavalle, provincia de Mendoza, fueron observados tres ejemplares, dos adultos y un juvenil, probablemente la pareja



Foto 5. El subadulto de la imagen ostenta el notable copete nucal que da fundamento a su nombre vulgar. La cabeza denota tonos ocráceos, algo estriados, pero más claros en las mejillas. Es destacable en el manto superior del ejemplar, la irrupción del nuevo plumaje que contrasta con la notoria erosión de las plumas del resto del manto, remeras y timoneras. La brevedad de la cola insinúa, incipiente reborde terminal claro en el área apical. Fotografiado el 12 de septiembre de 2010 en el puesto El Tamarindo, departamento Sarmiento, San Juan. Foto: Francisco Lucero.

y su descendencia, lo que sugiere la nidificación en las inmediaciones. Este nuevo registro próximo al sistema lacustre de Guanacache, sitio Ramsar y AICA ME05 (Pescetti, 2005), cercano al límite con la provincia de San Luis, nos confirma la existencia en el área de la especie, lugar considerado importante para la conservación (Gil *et al.*, 1995), pero donde no se han obtenido registros recientes (Pereyra Lobos *et al.*, 2010). Además Chebez (2008) confirma la presencia de esta rapaz para los departamentos mendocinos de San Carlos, Lavalle, Santa Rosa, San Rafael, General Alvear, San Martín, La Paz y Tupungato.

El 12 de septiembre de 2009, en un paraje donde se ubica un puesto de cabras denominado El Tamarindo, departamento de Sarmiento, provincia de San Juan (32° 06' 47" S 68° 19' 27" O, 540 m s.n.m.), se ha registrado un ejemplar subadulto que era mantenido en semi-cautiverio (Foto 5). El ejemplar volaba sin ninguna dificultad aparente y luego de un par de semanas remontó vuelo y se alejó del lugar sin volver a observarse. Los primeros registros documentados en este departamento sanjuanino se detallan en Lucero (2009).

El 2 de enero de 2010 en la localidad de Santa Gema, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, (30° 52' 32" S 67° 19' 07" O, 782 m s.n.m.), sobre la serrería a la vera de la ruta provincial N° 510, se escucha el silbo característico de esta rapaz y luego el contacto visual, observándose a un ejemplar juvenil que vocalizaba perchedo en rocas y luego a un adulto que en lento vuelo se acercaba al primero. Para dicha provincia Chebez (2008) la menciona para los departamentos de Valle Fértil, Albardón, Caucete y 25 de Mayo.

Charadrius alticola

El 10 de abril de 2011 en la Laguna Seca, se observaron dos ejemplares de esta especie entremezclados en una bandada del Chorlito de Collar (*Charadrius collaris*). Las dos especies se desplazaban juntas por todo el área perilagunar alimentándose (Foto 6).

Charadrius alticola se cita por primera vez para Mendoza en la Ciénaga del Yalguaráz, en el departamento Las Heras (Bodrati, 2005), luego se la observó en la Laguna Los Horcones, en jurisdicción del Parque Provincial Aconcagua en el departamento Las Heras (Olivera y Lardetti, 2009) y el tercer registro documentado es en la Reserva Provincial Laguna del Diamante, en el departamento San Carlos (Martínez *et al.*, 2009). Estas observaciones fueron registradas a una altitud de 2.200 m s.n.m para la Ciénaga del Yalguaráz, a 3.000 m s.n.m en la laguna Los Horcones y finalmente a 3.250 m s.n.m, en la Laguna del Diamante.

En este nuevo registro que se da a conocer para la provincia de Mendoza sería el primero en observarse a muy baja altitud, en el llano lavallino y en plena ecorregión del Monte a solo 540 m s.n.m, sugiriendo que podría tratarse de un sitio de paso o de invernada en Mendoza.

Sterna trudeaui

El 21 de noviembre de 2010 en la Laguna de Guanacache, departamento Sarmiento (32° 07' 18" S 68° 25' 36" O, 541 m s.n.m.), provincia de San Juan, fueron



Foto 6. Individuo de *Charadrius alticola* (izquierda superior de la imagen) junto a un *Charadrius collaris* (derecha inferior). Se aprecia mayor volumen corporal del *Charadrius alticola*. Un rasgo característico del género es el ojo respecto al tamaño de la cabeza. Si bien ambos son de hábitos gregarios, no suelen formar bandadas numerosas. Fotografiados el 10 de abril de 2010 en la Laguna Seca, Mendoza. Foto: Francisco Lucero.



Foto 7. Individuos de *Sterna trudeaui* sobrevuelan el humedal en busca de peces o invertebrados que suelen capturar zambulléndose, al quedar expuestos en la superficie acuática observados el 21 de noviembre de 2010 en la Laguna de Guanacache, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

observados tres ejemplares desplazándose en vuelo planeado en busca de peces o invertebrados expuestos en la superficie acuática (Foto 7). Dicho sitio integra el sistema de Lagunas de Guanacache, Desaguadero y Del Bebedero, que en su totalidad fue incorporado como Humedal de Importancia Internacional en el listado de sitios RAMSAR y que es compartido por tres provincias (San Juan, Mendoza y San Luis).

La especie *S. trudeaui* se distribuye en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza (Martínez *et al.*, 1985) y ocasionalmente Chubut y Santa Cruz (De la Peña, 1999). La cita más próxima fue para los bañados del Tulumaya, en el departamento Lavalle, provincia de Mendoza (Lucero, 2009), localidad ubicada a unos 25 km hacia el sur de la Laguna de Guanacache, por lo cual se ampliaría su distribución a los humedales del sur de la provincia de San Juan.

Crotophaga major

El 12 de marzo de 2011 en la localidad de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan (32° 04' 22'' S 68° 41' 43'' O, 729 m s.n.m.) se registró un ejemplar juvenil al que se le observó su característica cola larga, violácea con el iris pardo y escaso desarrollo de la protuberancia sobre la maxila que son caracteres distintivos de su etapa de vida, en un frondoso bosque de *Geoffroea decorticans* que permaneció durante tres días en el área (Foto 8). Narosky e Yzurieta (2010) dan su distribución en la Argentina desde el norte hasta las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Corrientes y como probable o accidental en el este de Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires.



Foto 8. Por la coloración del ejemplar de *Crotophaga major*, podría tratarse de un subadulto fotografiado el día 12 de marzo de 2011 en la localidad de Cienaguita, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

En Entre Ríos fueron observados seis ejemplares por Milat *et al.* (1985) y fue citada para el Parque Nacional El Palmar en el departamento Colón por Chebez *et al.* (1998). Además es incluida por Ochoa de Masramón (1971) y Nellar (1993) para la provincia de San Luis y Olrog (1979) la señala como ocasional para La Pampa y noreste de Buenos Aires. Un último registro para el norte de Buenos Aires es detallado por Argerich (2010). Se atribuye este ejemplar a juveniles que avanzan buscando nuevos territorios, ayudados por tormentas y ciclos húmedos, los cuales llegan a zonas que no son habituales de su residencia (Chebez, *com. pers.*).

Heliomaster furcifer

El 8 de marzo de 2011, en la localidad de Usno, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan (30° 32' 52" S 67° 34' 32" O, 954 m s.n.m.), en un bosque relictual con predominancia de Tala (*Celtis* sp.) junto a Algarrobo Blanco (*Prosopis alba*) y *Geoffroea decorticans* fue registrado un ejemplar hembra de dicha especie revoloteando y alimentándose en flores silvestres (Foto 9).

El área atravesaba un ciclo húmedo fuera de lo común, con gran floración de diferentes especies vegetales, en especial de una herbácea exótica como es la Flor de Papel (*Zinnia elegans*).

Heliomaster furcifer se distribuye en una amplia área geográfica que abarca desde el norte de la Argentina hasta las provincias de Córdoba, San Luis y Buenos Aires, por el oeste de dicho país alcanza la provincia de La Rioja y por el este desde Misiones hasta Buenos Aires, además abarca el Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia (Olrog, 1979). El presente registro constituye el primero para la provincia de San Juan.

Sublegatus modestus

El 21 de noviembre de 2010, en Retamito, departamento Sarmiento, provincia de San Juan, (32° 05' 20" S 68° 37' 59" O, 644 m s.n.m.), en un bosque de Algarrobo Dulce (*Prosopis flexuosa*), *Geoffroea decorticans* y Atamisque (*Capparis atamisquea*), se observaron varios ejemplares asignables a esta especie, alimentándose entre la vegetación (Foto 10).

S. modestus se distribuye por el norte del país, a excepción de la provincia de Misiones, hasta alcanzar en

su distribución más austral las provincias del Neuquén (Veiga *et al.*, 2005) y Río Negro (Narosky y Babarskas, 2000).

***Pseudocolopteryx* sp.**

El 26 de diciembre de 2010, en la Laguna del Toro, San Juan (32° 05' 01" S 68° 19' 35" O, 540 m s.n.m.) se detectó vocalizando a un ejemplar de *Pseudocolopteryx* sp.

Al realizar play-back con audio del Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) dos ejemplares inmediatamente respondieron vocalizando y acercándose al lugar desde donde se los llamaba (Fotos 11 y 12).

En otras oportunidades en la época estival del año 2009 se ha experimentado en el área con las vocalizaciones de *Pseudocolopteryx citreola* obteniéndose resultados negativos.

Pseudocolopteryx citreola recientemente tratada en Ábalos y Areta (2009) y en López Lanús *et al.*, (2010) ha sido citada para las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén y Chubut, siendo migratoria en época invernal. El hábitat donde se registró al taxón en la provincia de San Juan incluye orillas inundables de la laguna, cubiertas de manera dispersa por Algarrobo Alpataco (*Prosopis alpataco*), Tamarisco (*Tamarix gallica*), Pájaro Bobo (*Tessaria absinthioides*), mientras que el suelo se encontraba tapizado por Verdolaga (*Portulaca oleracea*) y Pasto Salado (*Distichlis* sp.).

Cabe destacar que por la ausencia de grabaciones sobre las vocalizaciones del taxón hallado para su comparación con las de *Pseudocolopteryx citreola* mediante un espectrograma, se prefirió denominarlo *Pseudocolopteryx* sp. hasta su total esclarecimiento para la provincia de San Juan.



Foto 9. Hembra de *Heliomaster furcifer* observada el 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.



Foto 10. El ejemplar adulto de *Sublegatus modestus* corresponde a una especie asociada al monte arbustivo. Ejemplar observado el 21 de noviembre de 2010 en la localidad de Retamito, Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.



Foto 11. Individuo de *Pseudocolopteryx* sp. detectado el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, posado en arbustos leñosos que proliferan cerca de la orilla en la provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.



Foto 12. Otro individuo de *Pseudocolopteryx* sp. detectado el 26 de diciembre de 2010 en la Laguna del Toro, Sarmiento, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Euscarthmus meloryphus

El 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan, en el mismo sitio del hallazgo de *Helimaster furcifer*, en un bosque relictual de *Celtis* sp., se registró una pareja de esta especie, la cual vocalizaba oculta en denso matorral (Foto 13). *E. meloryphus* se distribuye por una amplia zona de la Argentina, en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca (Nores e Yzurieta, 1981), Santiago del Estero (Nores e Yzurieta, 1982), Formosa,



Foto 13. Ejemplar de *Euscarthmus meloryphus* registrado el 8 de marzo de 2011 en la localidad de Usno, departamento Valle Fértil, provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

Chaco, Misiones (De la Peña, 1999), Santa Fe, Entre Ríos (De la Peña, 1997), el extremo norte de Buenos Aires (Narosky, 1978), y por el oeste hasta San Luis y Córdoba. Esta sería la primera cita conocida para la provincia de San Juan.

Pachyramphus polychopterus

El 7 de marzo de 2011 en El Cantadero, departamento Capital, provincia de La Rioja, (29° 09'54''S 66° 48' 31'' O, 939 m s.n.m.), se observó un ejemplar macho vocalizando (Foto 14).

En la zona existen manchones de bosques con especies correspondientes al espinal chaqueño con elementos de la ecorregión arbustiva del Monte, incluyendo especies tales como la Acacia (*Acacia visco*), el tala (*Celtis tala*), el Coco (*Fagara coco*), la Sombra de Toro (*Jodina rhombifolia*), el Piquillín Negro (*Condalia buxifolia*) y el Algarrobo Blanco (*Prosopis alba*).

Pachyramphus polychopterus se distribuye por todo el norte del país abarcando las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán hasta Santiago del Estero y Catamarca (Nores e Yzurieta, 1982), Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba (De La Peña, 1999).

El área de El Cantadero ha sido documentada en numerosos trabajos por autores previos, quienes registraron una variada avifauna (Nores e Yzurieta, 1981; 1982; 1985; 1986; Nores y Celada, 1990). Este sería el primer registro para la especie en la provincia de La Rioja.



Foto 14. Ejemplar macho adulto de *Pachyramphus polychropterus* hallado el 7 de marzo de 2011 en la localidad de El Cantadero, departamento Capital, provincia de La Rioja. Foto: Francisco Lucero.

Pheucticus aureoventris

P. aureoventris es un emberízido que soporta fuerte presión de caza en todo el rango de su distribución, principalmente en la ecorregión del Chaco serrano, en las provincias de Córdoba, San Juan, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero (Chebez, 2009). En las provincias de San Luis (Nellar, 2007) como Córdoba (Miatello, 2007) es considerado como una especie “Vulnerable”.



Foto 15. Individuo de *Pheucticus aureoventris* fotografiado el 2 de enero de 2011 en la provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

El 2 de enero de 2011, en el Parque Provincial Valle Fértil, en los departamentos de Valle Fértil, Caucete y Jáchal, en la provincia de San Juan, se observaron dos individuos vocalizando en una quebrada húmeda con densa vegetación de tipo Chaco Serrano (Fotos 15 y 16). La especie ha sido citada para la provincia de San Juan previamente por Haene *et al.* (1995).

El *Pheucticus aureoventris* se distribuye desde las provincias de Jujuy hasta el extremo noreste de San Juan, San Luis y Córdoba por ambientes de Chaco serrano y de Yungas, Santiago del Estero, oeste de Formosa y Chaco, noroeste de Santa Fe (Narosky e Yzurieta, 2010) en desplazamientos invernales. Los registros de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa serían atribuibles a escapes de ejemplares en cautiverio (Chebez, 2009).

El registro adquiere significativa importancia ya que el *Pheucticus aureoventris* ha sido escasamente registrado en la región, desde su hallazgo en el año 1995 y es actualmente un habitante restringido a escasas quebradas húmedas en la mencionada área protegida de la provincia de San Juan. De este modo, urge a las autoridades provinciales tomar mayores recaudos de control sobre dicha área.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo revela la importancia de ciertas áreas cuyanas poco estudiadas respecto al cambio en la distribución de varias especies. Tal es el caso de la Laguna del Toro, departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Esto demuestra la importancia de ambientes únicos y en peligro, tales como las Lagunas de Guanacache,



Foto 16. En este segundo individuo de *Pheucticus aureoventris* se trata de un macho aún en proceso de adquirir la característica coloración negra en el plumaje de la cabeza, fotografiado el 2 de enero de 2011 en la provincia de San Juan. Foto: Francisco Lucero.

debido a su carácter relictual. Otra área importante a los efectos de evaluar futuras acciones de conservación es el área limítrofe entre las provincias de San Juan y Mendoza, como ya lo indicaron Lucero (2009), Martínez *et al.*, (2009) y Lucero y Chebez (2011) respectivamente.

En el caso puntual del *Pheucticus aureoventris*, la especie se encuentra en una situación de conservación sumamente difícil y precaria en la provincia de San Juan. Sólo se ha presentado el presente registro fotográfico con el afán de que sea tenido en cuenta por las autoridades responsables de las áreas protegidas de la provincia a fin de resguardar con más énfasis áreas donde pueda sobrevivir la especie.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer al Dr. Manuel Nores por su buena predisposición en compartir datos, anécdotas y bibliografía sobre la localidad de El Cantadero, en la provincia de La Rioja.

A la gran ornitóloga y amiga Patricia Capllonch por sus consejos, vivencias y apoyo.

A los revisores de este manuscrito por sus acertadas correcciones y aportes.

Y en especial a la memoria de mi querido y admirado amigo Juan Carlos Chebez por su amistad, generosidad, consejos y aportes en esta etapa de registros ornitológicos en la que me encuentro abocado, para que nos guíe desde donde esté, que descanse en paz.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁBALOS, R. y J.I., ARETA. 2009.** Historia Natural y vocalizaciones del Doradito Limón (*Pseudocolopteryx* cf. *citrea*) en Argentina. Ornitología Neotropical 20: 215-230.
- ARGERICH, E.C. 2010.** Primer registro del Anó Grande (*Crotophaga major*) en el Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nótulas Faunísticas (segunda serie) 47. Buenos Aires.
- BODRATI, A. 2005.** Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves argentinas. Nuestras Aves 50: 30-33.
- CHEBEZ, J.C. 2008.** Los que se van. Fauna argentina amenazada. Tomo 2: 416 págs., Albatros, Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C. 2009.** Otros que se van. Fauna argentina amenazada. 552 págs., Editorial Albatros, Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C., N.R. REY, M. BABARSKAS y A.G. DI GIACOMO. 1998.** Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial N° 12, Literature of Latin America (L.O.L.A.), 127 págs., Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C., B. GASPARRI, M. HANSEN CIER, N.A. NIGRO y L. RODRÍGUEZ. 2011.** Estado de conservación de los tetrápodos de la Argentina. En: Porini, G. y D. Ramadori (eds.). Manejo de Fauna Silvestre en Argentina. Conservación de especies amenazadas. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara", Buenos Aires.
- DABBENE, R. 1910.** Ornitología argentina. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires. As. Ser. III, Tomo XI: 513 págs., Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M.R. 1997.** Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Literature of Latin America (L.O.L.A). Monografía N° 15, 126 págs. Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M.R. 1999.** Aves Argentinas, Lista y Distribución. Literature of Latin America (L.O.L.A). Monografía especial, N° 18. 244 págs. Buenos Aires.
- DE LA PEÑA, M.R. 2010.** Lista y distribución de las aves argentinas, CD. Universidad Nacional del Litoral.
- DE LUCCA, E.R. 1992.** El Águila Coronada en San Juan. Nuestras Aves 26: 25.
- FONTANA, L.J. 1908.** Aves de la Región Andina (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca). Talletres Penitenciaria Nacional, 16 págs., Buenos Aires.
- FRAGA, R.M. 1997.** "Aves" en J.J. García Fernández (coordinador general). Mamíferos y aves amenazadas de la Argentina. Fundación para la Conservación de las Especies y el Medio Ambiente (FUCEMA), Asociación Ornitológica del Plata y Administración de Parques Nacionales. 221 págs. Buenos Aires.
- GIL, G., E. HAENE y J.C. CHEBEZ. 1995.** Notas sobre la avifauna de Sierra de las Quijadas. Nuestras Aves 31: 26-28.
- HAENE, E., S. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE y D. GÓMEZ. 1995.** Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. El Hornero 14 (1 y 2): 48-52.
- LÓPEZ-LANÚS, B., P. GRILLI, E. COCONIER, A. DI GIACOMO y R. BANCHS. 2008.** Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación. Informe de Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Buenos Aires, Argentina.
- LOPEZ-LANÚS, B., L.D. UNTERKOFER, U. ORNSTEIN, R. GÜLLER, R. LEJARRAGA, C. DOINY CABRE, R.L. SCOFFIELD y C. KOPUCHIAN. 2010.** La presencia de *Pseudocolopteryx citrea* en el este de Argentina y comparación de su voz con la de otros doraditos. Boletín Chileno de Ornitología 16 (1): 51-58 págs. Unión de Ornitólogos de Chile.
- LUCERO, F. 2009.** Aves nuevas, raras o con pocos registros para las provincias de Mendoza y San Juan. Nuestras Aves 54: 57-62.

- LUCERO, F. y J.C. CHEBEZ. 2011.** Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 71. Buenos Aires.
- MARTÍNEZ, M.M., C.A. DARRIEU y G.E. SOAVE. 1985.** Estudio de la Avifauna de la Reserva Provincial Llanquanelo, Mendoza. *Larus pipixcan, Larus serranus, Sterna trudeuai y Chlidonias niger surinamensis*. (Aves: LARIDAE). *Historia Natural*. 5 (3): 25 – 28, Corrientes.
- MARTÍNEZ, F., F. LUCERO, R. CALÍ, D. VALDÉZ, D. FERRER y J.C. CHEBEZ. 2009.** Registros novedosos de aves para las provincias de Mendoza y San Juan. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 35. Buenos Aires.
- MIATELLO, R., J. BALDO, M. ORDANO, C. ROSACHER y L. BIANCUCCI. 1999.** Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, Córdoba, Argentina. Una lista comentada, 193 págs., Editorial Eudecor y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Córdoba.
- MIATELLO, R.A. 2007.** Vertebrados en extinción de la provincia de Córdoba. *Biológica* (2): 16-22. Santa Fe.
- MILAT, J., F. MOSCHIONE y J. KLIMAITIS. 1985.** Azor Variado, Tachurí Coludo y Anó Grande en Entre Ríos. *Nuestras Aves* (6): 6-7.
- NAROSKY, T. 1978.** Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asociación Ornitológica del Plata. 127 págs. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y M. BABARSKAS. 2000.** Aves de la Patagonia, guía para su reconocimiento. Vázquez Mazzini Editores. 128 págs., Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003.** Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2010.** Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Edición total. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.
- NELLAR, M.M. 1993.** Aves de la provincia de San Luis, lista y distribución. Museo Privado de Ciencias Naturales e Investigaciones Ornitológicas “Guillermo E. Hudson”, San Luis, 98 págs.
- NELLAR, M.M. 2007.** Vertebrados amenazados de la provincia de San Luis. Edición del Autor. 250 páginas. San Luis.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1981.** Nuevas localidades para aves argentinas I. *Historia Natural*, 2 (5): 33-42, Corrientes.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1982.** Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural*, 2 (13): 101-104, Corrientes.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1985.** Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural*, 5 (7): 55-56, Corrientes.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1986.** Nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural*, 6 (6): 49-52, Corrientes.
- NORES, M. y M.M. CELADA. 1990.** Biogeography of forest relics in the mountains of northwestern Argentina. *Revista Chilena de Historia Natural*. 63: 37-46.
- OLIVERA, R., U. LARDELLI y F. BRUNO. 2009.** Aves del Parque Provincial Aconcagua y Monumento Natural Puente del Inca, lista comentada, Publicaciones especiales El Arunco N° 2. Editorial De la Travesía. Provincia de Mendoza, Argentina.
- OLROG, C.C. 1979.** Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana XXVII*, 324 págs., Fundación Miguel Lillo, Tucumán.
- OLROG, C.C. 1984.** Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Editorial Incafo 352 págs., Madrid.
- OCHOA DE MASRAMÓN, D. 1971.** Contribución al estudio de las aves de San Luis. *El Hornero* 11: 113-123.
- OCHOA DE MASRAMÓN, D. 1983.** Lista de Aves del Nordeste de San Luis. *El Hornero* N° Extraordinario: 77-87.
- PEREYRA LOBOS, R., H. LOPEZ y E. NATALE. 2010.** Nuevos registros de Águila Coronada (*Harpyphaliaetus coronatus*) en el Parque Nacional y Reserva Provincial Sierra de las Quijadas, San Luis, Argentina. *Nuestras Aves*. 55: 28-29.
- PESCETTI, E. 2005.** Lagunas de Guanacache. Págs.: 268-269 en: Di Giacomo, A.S. (ed) Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. *Temas de Naturaleza y Conservación* 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- REED, C.S. 1916.** Las aves de la provincia de Mendoza. Museo Educación de Mendoza, 47 págs., Mendoza.
- SOSA, H.J. 1995.** Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llanquanelo, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, preferencia de hábitat y nidificación. *Revista Multequina* 4: 65-75, Mendoza.
- SOSA, H.J. 2005.** Aves no passeriformes. Llanquanelo y zonas de influencia. Manual del observador. 141págs., Editorial Aguirre, Mendoza.
- VEIGA, J.O., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY. 2005.** Aves de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina, Lista Comentada y Distribución. Editora R y C, 186 págs. Buenos Aires.