

# HISTORIA NATURAL

Tercera Serie | Volumen 1 | 2011

## NUEVOS REGISTROS DEL CARPINTERO DEL CARDÓN (*Melanerpes cactorum*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

*New records of the White-Fronted Woodpecker (Melanerpes cactorum)  
in Buenos Aires Province, Argentinian.*

Nicolás R. Chimento<sup>1</sup>, Jorge La Grotteria<sup>2</sup>, Federico L. Agnolin<sup>3,4</sup>  
y Rubén F. Lucero<sup>5</sup>

<sup>1</sup>División Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, La Plata (B1900FWA),  
Buenos Aires, Argentina. nicochimento@hotmail.com

<sup>2</sup>Martín H. Falco 328, Localidad de Garín (B1619ALF), Partido de Escobar, Buenos Aires, Argentina.

<sup>3</sup>Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados. Museo Argentino de Ciencias  
Naturales "Bernardino Rivadavia". Av. Ángel Gallardo 470 (C1405BDB), Buenos Aires, Argentina.

<sup>4</sup>Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Departamento de Ciencias Naturales y Antropología.  
CEBBAD - Universidad Maimónides. Valentín Virasoro 732 (C1405BDB), Buenos Aires, Argentina.

<sup>5</sup>Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, FCAYF, UNLP, Ruta 4 km. 2, Llavallol (C.P: 1836),  
Buenos Aires, Argentina.



## INTRODUCCIÓN

El Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) se distribuye a lo largo del norte de Argentina, habitando las provincias Biogeográficas del Chaco, Monte y Espinal (Cabrera y Willink, 1973). La distribución asignada para esta especie abarca las provincias del norte argentino, con excepción de Misiones, principalmente la zona Chaqueña hasta La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos (Olrog, 1963; 1979). Es común observarlo sobre Cardones (*Trichocereus* spp.) del monte precordillerano. Se lo ha observado en el Parque Provincial "Bajo de Veliz", San Luis; en la Reserva Provincial "Telteca", Mendoza; en el Parque Nacional "Los Cardones", Salta (Chebez, 2006a); en la Cuesta de Miranda, La Rioja (*obs. pers.*), entre otras localidades. En las provincias de Entre Ríos y Santa Fe es considerada como una especie escasa, con algunos registros dispersos sobre las selvas en galería de la cuenca Parano-platense (De la Peña, 2006). Sin embargo, recientes relevamientos en la región sugieren que se trataría de una especie sub-observada en el sur de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (S. Alemán *com. pers.*).

El Carpintero del Cardón posee una distribución geográfica muy semejante a la de su congénere el Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*) (Olrog, 1979). No obstante, esta última especie se ha establecido exitosamente en la provincia de Buenos Aires, contando con varios registros en el norte de la misma (Narosky y Di Giacomo, 1993). En contraposición, los registros del Carpintero del Cardón para esta provincia son extremadamente escasos (Maugeri y Montenegro, 2002), contándose un único registro de nidificación en la ciudad de La Plata (Chimento *et al.*, 2009).

El Carpintero del Cardón (*Melanerpes cac-*

*torum*) presenta un conjunto de características que lo diferencian claramente de otras especies de carpinteros, como ser una amplia frente y nuca blancas, rojo en la corona, un dorso negro bisectado por una línea blanca que comienza en la nuca y alcanza la base de la rabadilla barrada, como también lo son la cola, flancos y alas, un vientre gris ocráceo y una garganta notablemente amarilla (Narosky e Yzurieta, 2006). Estas características son bien conspicuas en los machos, diferenciándose de las hembras porque éstas no presentan la nuca blanca ni el rojo en la corona (Narosky e Yzurieta, 2006). Generalmente se los observa en parejas o en pequeños grupos, y en ocasiones se los ha observado asociados a otras especies de aves durante la alimentación (Genise *et al.*, 1993).

A pesar de su nombre, el Carpintero del Cardón suele observarse posado en varias especies arbóreas, no sólo en los Cardones (*Trichocereus* spp.), sino también en Algarrobo (*Prosopis* spp.), Tala (*Celtis tala*), Quebracho (*Aspidosperma quebracho-blanco*), Tipa (*Tipuana tipu*), Ombú (*Phytolacca dioica*), entre otras (Genise *et al.*, 1993; Chimento *et al.*, 2009).

En la presente contribución se agregan tres nuevos registros para esta especie en la provincia de Buenos Aires.

## RESULTADOS

**Reserva Natural y Estricta, Silvestre y Educativa "Rómulo Otamendi"** (S 34°09', O 58°57'). El 24 de diciembre de 2009, en la Reserva Natural y Estricta, Silvestre y Educativa "Rómulo Otamendi" uno de los autores (J.L.G.) observó y fotografió un ejemplar hembra de Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) posado en lo alto de un árbol donde permaneció solo unos ins-

tantes, mientras vocalizaba en alerta a causa de la aproximación del observador (dato que puede ser prueba de que no se trataba de un ejemplar que anteriormente haya estado en cautiverio). El día de la observación presentaba un cielo totalmente cubierto por la nubosidad. A pesar de esto, se podía distinguir claramente que se trataba de *Melanerpes cactorum*, ya que presentaba la barba amarilla, la frente y la nuca blancas y la línea blanca dorsal característica. Vale la pena remarcar que la especie no ha sido citada con anterioridad para la presente área protegida (Babarskas *et al.*, 2003).

**Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** El 14 de marzo de 2009, fue observado un ejemplar macho de Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) por el señor Eduardo Na-

dal. Este ejemplar se encontraba recorriendo los sectores más altos de varios árboles implantados en el Parque “Nicolás Avellaneda”, emplazado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Figura 1). En adición, en el año 2008, varios ejemplares de esta especie fueron observados en el mismo parque (E. Nadal com. pers.), lo cual sugiere su establecimiento definitivo en esta localidad.

**Ciudad de La Plata.** El día 17 de marzo de 2010, fue observado un ejemplar de Carpintero del Cardón en el Paseo del Bosque, ciudad de La Plata. Este ejemplar fue observado transitando los árboles que bordean la laguna central de este paseo. En primera instancia el ejemplar estaba posado sobre un Ceibo (*Erithrina crista-galli*), donde se encontraba alimentándose de pequeños invertebrados. Luego se dirigió hacia un Sauce Llorón (*Salix babylonica*), y posteriormente a un Braquiquito (*Brachychiton populneum*) y a un Tala (*Celtis tala*), donde se lo observó interactuando con un Zorzal Colorado (*Turdus rufiventris*) y un Celestino (*Thraupis sayaca*). Posteriormente, los días



**Figura 1** - Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) sobre un árbol implantado de Parque Nicolás Avellaneda. Fotografía: Eduardo Nadal.



**Figura 2** - Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) realizando un hueco en un Tala (*Celtis tala*) en el Paseo del Bosque, ciudad de La Plata.

21 y 28 de abril de 2010, se observaron un ejemplar hembra y también un ejemplar macho. La hembra se encontraba posada sobre un Tala (*Celtis tala*), donde emitía vocalizaciones y producía cortos vuelos hacia otros árboles, como algunos Eucaliptos (*Eucalyptus* sp.) y Robles (*Quercus robur*). El macho fue observado posado sobre un Tala (*Celtis tala*), donde se encontraba realizando un hueco (Figura 2), posiblemente para extraer alimento, un comportamiento típico de esta especie (Genise *et al.*, 1993).

## CONCLUSIONES

El hallazgo de estos ejemplares se suma a los registros previos en la provincia de Buenos Aires, realizados en la localidad de Ramallo y La Plata (Maugeri y Montenegro, 2002; Chimento *et al.*, 2009).

Cabe destacar que en algunos casos podría tratarse de ejemplares liberados del cautiverio. No obstante, la presencia de nidos de esta especie (Chimento *et al.*, 2009) indicaría la aceptación de las condiciones del entorno para su reproducción, y en consecuencia su establecimiento permanente en la zona. Sin embargo, la Reserva Natural y Estricta, Silvestre y Educativa "Rómulo Otamendi" constituye un ambiente natural muy importante del norte de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran diferentes fisonomías, como montes de tala, bosques de especies exóticas, pajonales, cardales, pastizales, etc (Chebez, 2006b). Estas fisonomías presentan las especies arbóreas que forman el hábitat del Carpintero del Cardón en otras provincias, por lo cual no sería extraño encontrarlo entre la avifauna silvestre de la reserva.

Los nuevos hallazgos en la ciudad de La Plata, junto a los registros previos (Maugeri y Montenegro, 2002; Chimento *et al.*, 2009)

suman un total de cuatro avistamientos en esta localidad, en los últimos dos años, en los cuales se han observado varios ejemplares en asociación y con comportamientos reproductivos (Chimento *et al.*, 2009). Estos datos, además de las nuevas localidades registradas para esta especie, corroboran su establecimiento definitivo en el norte de la provincia, lo que podría estar vinculado a los cambios ambientales que se han sucedido en los últimos años.

## AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento a Eduardo Nadal y Santiago Alemán por la información proporcionada acerca de los avistamientos efectuados en el Parque "Nicolás Avellaneda" y sur de la Mesopotamia, respectivamente. A Carolina Frank por su ayuda durante el trabajo de campo. Asimismo, agradecemos a J.C. Chebez la ayuda brindada durante la confección del manuscrito.

## BIBLIOGRAFÍA

- Babarskas, M., Haene, E. y Pereira, J. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En: Haene, E. y Pereira, J. (Eds.), *Temas de Naturaleza y Conservación*, 3: 47-113.
- Cabrera, A.L. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. *Serie Biológica*, 13: 1-178.
- Chebez, J. C. 2006a. *Guía de las Reservas Naturales de la Argentina*. Tomo 4: Noroeste. Editorial Albatros, 256 pp.
- Chebez, J. C. 2006b. *Guía de las Reservas Naturales de la Argentina*. Tomo 5: Centro. Editorial Albatros, 288 pp.
- Chimento, N. R., Agnolin, F. L., Lucero, F. R. y Obredor, R. 2009. Nidificación del Carpintero del Cardón (*Melanerpes cactorum*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 37: 1-3.

- De la Peña, M.R. 2006. *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Monografía 15. Editorial L.O.L.A. Buenos Aires, 138 pp.
- Genise, J.F., Straneck, R.J. y Hazeldine, P.L. 1993. Sapsucking in the white-fronted woodpecker *Melanerpes cactorum*. *Ornitología Neotropical*, 4: 77-82.
- Maugeri, F.G. y Montenegro, M.J. 2002. Tres nuevas citas de aves para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 43: 21-22.
- Narosky, T. y Di Giacomo, A.G. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. AOP, Vázquez Mazzini y L.O.L.A. Eds., Buenos Aires, 127 pp.
- Narosky, T. e Yzurieta, D. 2006. *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. AOP y Vázquez Mazzini Eds., Buenos Aires, 346 pp.
- Olrog, C.C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana*, 9: 1-377.
- Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

Recibido: 26/03/2010 - Aceptado: 02/07/2010