

HISTORIA NATURAL

Tercera Serie | Volumen 4 (2) | 2014/63-88

DATOS DE PESOS DE AVES ARGENTINAS. PARTE 3

Weight of Argentine birds. Part 3

Sergio A. Salvador¹ y Alejandro G. Di Giacomo²

¹Bv. Sarmiento 698 (5900) Villa María, Córdoba, Argentina. mono_salvador@hotmail.com

²Departamento de Conservación, Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata,
Matheu 1246 (C1249AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.



Resumen. En el presente trabajo se informa sobre el peso de aves argentinas. Esta información constituye una herramienta importante para estudios ecológicos y en algunos casos reviste de importancia taxonómica. Se presenta información inédita del peso de 213 especies y subespecies de aves argentinas

Palabras clave. Peso, Aves, Argentina.

Abstract. The present work informs about weights of Argentine birds. These are valuable data for ecological studies and in some cases they are an important taxonomic contribution. Weight data of 213 species and subspecies of Argentine birds are here described.

Key words. Weight, Birds, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La presente contribución es la continuación de dos publicaciones anteriores (Salvador, 1988; 1990), y como se recalca en los trabajos anteriores el peso de las aves es un elemento de gran valor para los trabajos de tipo ecológico y con validez en algunos casos como aporte taxonómico. Se da información inédita de pesos de 213 especies y subespecies de aves argentinas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los pesos fueron tomados con Pesolas de 10, 50, 100, 300 y 500 gr; balanzas electrónicas de laboratorio y balanzas digitales.

Para cada especie o subespecie se da la localidad, fecha de obtención del peso, sexo (cuando pudo ser determinado), y las iniciales de quién tomo el dato: (ADG) A. G. Di Giacomo y (SAS) S. A. Salvador. En el Apéndice 1 se informa sobre cada localidad mencionada en el texto, sus coordenadas geográficas, departamento o partido y provincia a la que corresponde.

Para el ordenamiento sistemático se siguió a Remsen *et al.* (2014).

RESULTADOS

Familia Tinamidae

Crypturellus tataupa tataupa. Los Morteros, (Ago.), 1 ♂ 198 gr y 1 ♀ 212 gr; Frías, (Jun.), 1 ♀ 231 (SAS).

Comentarios: de esta especie existían datos de pesos de Jujuy y Chaco (Fiora, 1933; Contreras, 1983b).

Rhynchotus rufescens pallescens. La Carlota, (Jul., Ago.), 1 ♂ 802 gr y 1 ♀ 912 gr; Jovita,

(Set.), 1 ♀ 898 gr; Buena Esperanza, (Jun.), 1 ♂ 814 gr; Conhelo, (Dic.), 1 ♂ 843 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Set.), 1 ej. 1180 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1985; Salvador, 1988; Camperi, 1992b).

Rhynchotus maculicollis. Balcozna de Afuera, (Jun., Jul., Ago.), 2 ♂ 894 y 913 gr, 3 ♀ X: 923.3 gr (RA: 876 a 962) (SAS).

Comentarios: solo existía información de pesos de diez individuos, sin datos de sexo, de Jujuy (Fiora, 1933).

Nothoprocta ornata rostrata. Tafí del Valle, (Mar.), 1 ♂ 622 gr (SAS).

Comentarios: solo existía información de pesos de esta subespecie de Jujuy (Fiora, 1933).

Nothoprocta cinerascens cinerascens. Los Morteros, (Ago.), 3 ♂ X: 472 gr (RA: 463 a 482), 4 ♀ X: 494 gr (RA: 467 a 521) (SAS).

Comentarios: solo existía información de peso de un macho de Chaco (Contreras, 1985).

Nothoprocta pentlandii pentlandii. Los Morteros, (Jun., Ago.), 6 ♂ X: 277.7 gr (RA: 262 a 296), 8 ♀ X: 296.3 gr (RA: 273 a 312) (SAS).

Comentarios: otra información sobre pesos puede consultarse en (Fiora, 1933; Banks y Bohl, 1968; Contreras, 1985).

Nothura darwinii salvadorii. Frías, (Jun.), 1 ♂ 213 gr, 2 ♀ 218 y 226 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie ver (Bump y Bump, 1969).

Nothura maculosa annectens. Salto, (Ene., Dic.), 2 ♂ 275 y 285 gr; General Alvear, (Nov.), 1 ej. 300 gr; Roque Pérez, 2 ej. 245 y 275 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie ver (Bump y Bump, 1969).

Nothura maculosa pallida. Frías, (Jun., Jul.), 2 ♂ 239 y 256 gr, 2 ♀ 269 y 277 gr (SAS).

Comentarios: solo existía información de pesos de doce individuos, sin datos de sexo, de Jujuy (Fiora, 1933).

Eudromia elegans magnistriata. Frías, (May.), 2 ♀ 683 y 712 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de esta subespecie para Argentina.

Eudromia formosa formosa. Sachayoj, (Abr.), 1 ♂ 617 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.

Familia Anatidae

Dendrocygna viduata. Cintra, (Mar.), 2 ♀ 669 y 683 gr; La Carlota (Nov.), 1 ♂ 698 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Weller, 1968 y Contreras, 1985).

Amazonetta brasiliensis. Roque Sáenz Peña, (Jul.), 2 ♂ 565 y 623 gr (SAS).

Comentarios: más datos de pesos en nuestro país (ver Weller, 1968 y Contreras, 1979).

Anas bahamensis rubrirostris. Las Varillas, (May.), 2 ♂ 676 y 693 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Weller, 1968).

Anas versicolor versicolor. Viamonte (Jul.), 1 ♂ 409 gr; La Carlota, (Ago.), 1 ♀ 376 gr; Las Varillas, (Set.), 1 ♂ 466 gr; Pozo del Molle, (May.), 1 ♂ 422 gr y 1 ♀ 384 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Weller, 1968 y Humphrey *et al.*, 1970).

Anas cyanoptera cyanoptera. La Carlota, (Ago.), 1 ♂ 437 gr y 1 ♀ 417 gr; Pozo del Molle, (May.), 1 ♂ 488 gr y 1 ♀ 429 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Weller, 1968; Contreras, 1975; Wilson *et al.*, 2010).

Anas platalea. Viamonte, (Jul.), 1 ♂ 588 gr y 2 ♀ 467 y 488 gr; Pozo del Molle, (May.), 1 ♂ 526 gr y 1 ♀ 433 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Weller, 1968 y Humphrey *et al.*, 1970).

Familia Cracidae

Ortalis canicollis canicollis. Frías, (May.), 1 ♂ 547 gr y 1 ♀ 533 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Jul.), 1, 530 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1033; Contreras, 1986; Caziani y Protomastro, 1994).

Familia Podicipedidae

Rollandia rolland chilensis. La Carlota, (Set.), 1 ♀ 212 gr, (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Storer, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras 1985; Navas, 1993).

Podilymbus podiceps antarcticus. La Carlota, (Jun.), 1 ♂ 463 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Contreras, 1986).

Podiceps major major. Pedro Funes, (Ago.), 1 ♂ 1131 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1985; Navas, 1993).

Familia Ardeidae

Butorides striatus striatus. Viamonte, (Set.), 1 ♀ 162 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contino, 1980; Contreras, 1983b).

Bubulcus ibis ibis. Salto, (Abr., Jun.), 4 ♂ X: 336.2 gr (RA: 315 a 350), 2 ♀ 360 y 370 gr, 3 ♀ jov. X: 351.7 gr (RA: 290 a 380) (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Rodríguez Matta, 1973; Orgeira, 1995).

Familia Threskiornitidae

Plegadis chihi. Las Varillas, (May.), 1 ♂ 613 gr y 1 ♀ 462 gr (SAS); Salto, (Feb.), 1 ♂ 615 gr, 2 ♀ 470 y 476 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contino, 1980; Salvador, 1988).

Phimosus infuscatus infuscatus. Dalmasio Vélez Sarsfield, (Feb.), 1 ♂ 492 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Familia Accipitridae

Elanus leucurus leucurus. Río Cuarto, (Jul.), 1 ♂ 241 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Contino, 1980; Contreras, 1986; Camperi, 1992a).

Circus cinereus. Mina Clavero, (May.), 1 ♀ 407 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Camperi, 1992a).

Accipiter striatus erythronemius. Quimilí, (Feb.), 1 ♀ 112 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Contino, 1980).

Buteo magnirostris saturatus. San Francisco, (Dic.), 1 ♀ 408 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933 y Contino, 1980).

Familia Rallidae

Porzana albicollis albicollis. Pichanal, (Feb.), 1 ej. 121 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Ago.), 1 ej. 92 gr (ADG).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.

Pardirallus maculatus maculatus. Reserva El Bagual, (Nov.), 1 ej. 135 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Contreras, 1986 y Di Giacomo, 2005).

Familia Thinocoridae

Thinocorus rumicivorus rumicivorus. Azul, (Jun.), 1 ♂ 53.3 gr; Bahía Camarones, (Nov.), 1 ♂ 57 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Navas y Bó, 1990; Christie *et al.*, 2004).

Familia Jacanidae

Jacana jacana jacana. Reserva El Bagual, (May., Set.), 2 ej. 81 y 98 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Contreras, 1979).

Familia Laridae

Chroicocephalus maculipennis. Salto, (Jun.), 1 ♂ 315 gr, 2 ♀ 362 y 380 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos de esta especie en nuestro país (ver Zapata, 1967; Humphrey *et al.*, 1970; Camperi, 1992a).

Leucophaeus pipixcan. Miramar, (Oct.), 1 ej. 233 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Familia Columbidae

Patagioenas picazuro picazuro. Los Morteros, (Ago.), 1 ♂ 426 gr y 1 ♀ 413 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Carman, 1973 y Salvador, 1988).

Patagioenas maculosa maculosa. Los Morteros, (Ago.), 2 ej. 289 y 392 gr; Chamental, (Jun.), 2 ej. 289 y 408 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Navas y Bó, 1986 y Camperi, 1992a).

Patagioenas fasciata albilinea. Balcozna de Afuera, (Ago.), 1 ♂ 332 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933 y Salvador, 1988).

Zenaida auriculata chrysauchenia. Salto, (Jun., Ago., Set., Nov., Dic.), 12 ej. X: 130 gr (RA: 102 a 144) (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1975, Bucher *et al.*, 1977; Salvador, 1988; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y Bó, 1992; Christie *et al.*, 2004; Camperi y Darrieu, 2004).

Leptotila verreauxi chalcauchenia. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 291 gr; Reserva El Bagual, (Ago.), 4 ej. X: 191 gr (RA: 172 a 214) (ADG); Frías, (May.), 1 ♂ 193 gr y 1 ♀ 188 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Fraga, 1983; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005).

Leptotila megalura saturata. La Merced, (May.), 2 ej. 138 y 161 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.



Figura 1 - *Leptotila megalura saturata*, La Merced, Catamarca.

Columbina talpacoti talpacoti. Sachayoj, (Abr.), 1 ♂ 51.5 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Contreras, 1979 y Darrieu, 1994).

Columbina picui picui. Salto, (Ene., Set., Oct., Dic.), 8 ♂ X: 50 gr (RA: 45.2 a 56), 9 ♀ X: 46,2 (RA: 44.7 a 47.5), 3 ej. X: 48.3 gr (RA: 45 a 54.5); Reserva El Bagual, (Ene.), 4 ♀ X: 39.3 gr (RA: 37.7 a 41) (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos de esta subespecie en nuestro país (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; Blendinger, 1999; Christie *et al.*, 2004; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005).

Familia Cuculidae

Coccyzus melacoryphus. Salto, (Abr.), 1 ej. 61 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Di Giacomo, 2005 y Blendinger, 2005).

Crotophaga ani. Santa Sylvina, (Mar.), 2 ej. 97 y 109 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Feb., Mar.), 13 ej. X: 78.5 gr (RA: 66 a 104) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Contino, 1980; Di Giacomo, 2005).

Guira guira. Salto, (Set.), 1 ej. 150 gr; Reserva El Bagual, (Mar.), 1 ej. 120 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1979; Contino, 1980; Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Darrieu *et al.*, 2010).

Familia Strigidae

Megascops choliba wetmorei. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 111.4 gr (RA: 108 a 116) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005).

Familia Caprimulgidae

Systellura longirostris patagonicus. Salto, (Abr.), 1 ♂ 59 gr (ADG).

Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Camperi, 1992b).

Familia Trochilidae

Phaetornis eurynome. Dos Hermanas, (Jun.), 2 ej. 5.0 y 5.6 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.



Figura 2 - *Phaetornis eurynome*, Dos Hermanas, Misiones.

Phaetornis petrei. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 14 ej. X: 5.1 gr (RA: 4.5 a 5.8) (ADG).

Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Salvador, 1988).

Adelomyia melanogenys inornata. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 3.5 gr (ADG).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.

Eriocnemis glaucopoides. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ♀ 4.5 gr, 1 ej. 4.0 gr (ADG).
Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Sappho sparganura sappho. Chamental, (Jun.), 6 ♂ X: 5.1 gr (RA: 4.3 a 5.4) y 5 ♀ X: 4.8 gr (RA: 4.4 a 5.0) (SAS).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y Salvador, 1988).

Helimaster furcifer. Reserva El Bagual, (Feb.), 1 ♀ 5.5 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1933 y Di Giacomo, 2005).

Chlorostilbon lucidus igneus. Reserva El Bagual, (Feb., Dic.), 2 ♀ 3.3 y 3.5 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005).

Leucochloris albicollis. Sachayoj, (Abr.), 1 ej. 6.1 gr (SAS).
Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Amazilia chionogaster hypoleucus. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 5.3 gr (RA: 4.9 a 5.8) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988).

Hylocharis chrysura. Reserva El Bagual, (Feb., Dic.), 3 ej. X: 4.1 gr (RA: 3.6 a 4.5) (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1979; Camperi 1992b; Di Giacomo, 2005).

Familia Trogonidae

Trogon rufus chrysochlorus. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ♂ 61 gr (SAS).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras *et al.*, 1994).



Figura 3. *Trogon rufus chrysochlorus*, Dos Hermanas, Misiones.

Familia Alcedinidae

Chloroceryle americana mathewsi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 2 ♂ 33 y 37.5 gr y 1 ♀ 38.3 gr (ADG).
Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y Contreras, 1979).

Familia Momotidae

Momotus momota pilcomayensis. Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej. 106 gr (ADG); Lib. General San Martín, (Oct.), 1 ej. 105 gr (SAS).
Comentarios: solo existe un registro de peso en nuestro país (Salvador, 1988).



Figura 4 - *Momotus momota pilcomayensis*, Lib. General San Martín, Jujuy.

Familia Picidae

Picumnus dorbignyanus. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 2 ♂ 9.8 y 11 gr (ADG).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Picumnus temminckii. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ♂ 10.8 gr y 1 ♀ 11.1 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Melanerpes candidus. Sachayoj, (Dic.), 2 ej. 111 y 123 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Short, 1970; Contreras, 1983a).

Colaptes melanochloros leucofrenatus. Salto, (Ene.), 1 ♂ 138 gr y 1 ♀ 126 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Short,

1972; Navas y Bó, 1990; Camperi, 1992a; Camperi y Darrieu, 2005).

Colaptes campestris campestris. Salto, (Oct., Nov.), 1 ♂ 191 gr y 2 ♀ 160 y 192 gr; Reserva El Bagual, (Set.), 1 ♂ 185 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Short, 1972; Contreras, 1983a; Salvador, 1988; Camperi, 1992a; 1992b; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005).

Familia Falconidae

Falco sparverius cinnamominus. Las Varillas, (Feb.), 1 ♂ 109 gr; Oliva, (Mar.), 1 ♂ 111 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Christie *et al.*, 2004).

Falco femoralis femoralis. Sachayoj, (Abr.), 1 ♂ 293 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1975; Salvador, 2012).

Falco peregrinus cassini. Trelew (Set.), 1 ♂ 853 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos en nuestro país (Humphrey *et al.*, 1970).

Familia Psittacidae

Psilopsiagon aymara. Valle Hermoso, (Abr.), 2 ej. 34.5 y 37 gr (SAS).

Comentarios: para esta especie solo había datos de pesos solo para San Juan (Navas y Bó, 2001).

Psilopsiagon aurifrons margaritae. Aparzo, (Feb.), 1 ej. 39 gr (SAS).

Comentarios: para esta especie solo había datos de pesos solo para San Juan (Navas y Bó, 2001).

Myiopsitta monachus cotorra. Reserva El Bagual, (Oct.), 1 ej. 110 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Contreras, 1979).

Myiopsitta monachus catita. Chamental, (Jun.), 4 ♂ X: 85.2 gr (RA: 79.5 a 92) y 9 ♀ X: 82.8 gr (RA: 78 a 86.6) (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Humphrey y Peterson, 1978; Navas y Bó, 1986; Blendinger, 1999).

Pionus maximiliani lacerus. Dique de Sumampa, (Abr.), 2 ej. 253 y 276 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro para este subespecie de pesos en nuestro país (Contreras, 1983a).

Amazona aestiva xanthopteryx. Dique de Sumampa, (Mar.), 1 ♂ 478 gr; Hito Uno, (Jul.), 1 ej. 439 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1933; Contreras, 1983a, Berkunsky *et al.*, 2009).

Cyanoliseus patagonus conlara. Dique Paso de las Carretas, (Nov.), 1 ♂ 287 gr y 8 ♀ X: 273 gr (RA: 243 a 301) (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.

Thectocercus acuticaudata acuticaudata. Frías, (May.), 2 ♀ 174 y 182 gr; Eduardo Castex, (Jun.), 3 ♂ X: 187 gr (176 a 203) (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Zapata y Martínez, 1972).

Psittacara mitrata mitrata. La Merced, (Jul.), 1 ♂ 261 gr (SAS).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988).

Familia Thamnophilidae

Taraba major major. Reserva El Bagual, (Oct.), 1 ♂ 48 gr y 1 ♀ 49 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Thamnophilus caerulescens dinellii. Reserva El Bagual, (Oct.), 1 ♂ 20 gr y 1 ♀ 19 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Salvador, 1990; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Familia Conopophagidae

Conopophaga lineata vulgaris. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 21 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Darrieu, 1986; Alderete y Capllonch, 2010).

Familia Rhinocryptidae

Rhinocrypta lanceolata lanceolata. Mina Clavero, (Ago.), 1 ♀ 56.8 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Zapata y Martínez, 1972; Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1986; Camperi, 1992a; Blendinger, 1999; Mezquida, 2001; Alderete y Capllonch, 2010).

Familia Furnariidae

Sittasomus griseicapillus griseicapillus. Lib. General San Martín, (Oct.), 5 ej. X: 12.6 gr (11.1 a 14.2) (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Dendrocolaptes picumnus casaresi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 74 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988 y Alderete y Capllonch, 2010).

Xiphocolaptes albicollis albicollis. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 119 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.



Figura 5 - *Xiphocolaptes albicollis albicollis*, Dos Hermanas, Misiones.

Campylorhamphus trochilirostris hellmayri. Reserva El Bagual, (Jul., Nov.), 2 ej. 43.5 y 44 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Short, 1971; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Campylorhamphus falcularius. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 41 gr (SAS).

Comentarios: para esta especie solo había datos de peso de un individuo de Misiones (Contreras *et al.*, 1994).

Lepidocolaptes angustirostris angustirostris. Reserva El Bagual, (Ene., May., Jul., Nov.), 4 ej. X: 29.2 gr (RA: 28.2 a 30.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005 y Alderete y Capllonch, 2010).

Furnarius rufus rufus. Salto, (Ene., Abr., May., Set., Oct., Nov., Dic.), 28 ej. X: 56.5 gr (RA: 51 a 66) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Fraga, 1980; Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1987a; Darrieu y Camperi, 1990; Camperi, 1992b; Alderete y Capllonch, 2010).

Furnarius rufus paraguayae. Reserva El Bagual, (Ene., Jul., Ago., Set., Oct.), 9 ej. X: 45.1 gr (RA: 42.5 a 48) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1987a; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Lochmias nematura obscurata. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 6 ej. X: 28.9 gr (RA: 27 a 31.5) (ADG).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.

Cinclodes albiventris albiventris. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 12 ej. X: 26.3 gr (RA: 25 a 29) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y Salvador, 1990).

Cinclodes atacamensis atacamensis. Tafí del Valle, (Mar.), 1 ej. 48.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó, 1987a y Salvador, 1990).

Syndactyla rufosuperciliata oleaginea. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 8 ej. X: 26.3 gr (RA: 24.6 a 28); Parque Nacional Calilegua, (Oct.), 1 ej. 26,2 gr (ADG); Lib. General San Martín, (Nov.), 2 ej. 26.8 y 27.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933; Salvador, 1988; 1990; Alderete y Capllonch, 2010).

Automolus leucophthalmus sulphurascens. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 33.5 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la subespecie para Argentina.



Figura 6 - *Automolus leucophthalmus sulphurascens*, Dos Hermanas, Misiones.

Leptasthenura aegithaloides berlepschi. Azul Pampa, (Feb.), 2 ej. 9.0 y 10 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre

el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó, 1987a; Camperi y Darrieu, 2004; Alderete y Capllonch, 2010).

Phacellodomus striaticeps striaticeps. Coraya, (Feb.), 1 ej. 32 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1933 y Alderete y Capllonch, 2010).

Phacellodomus ruber. Reserva El Bagual, (Ene., Set., Nov.), 5 ej. X: 31.3 gr (RA: 28 a 36) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Anumbius annumbi annumbi. Salto, (Dic.), 1 ej. 34 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992a; Alderete y Capllonch, 2010).

Coryphistera alaudina. Reserva El Bagual, (Feb., Oct., Nov.), 5 ej. X: 30.9 gr (RA: 27 a 32.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Asthenes dorbignyi dorbignyi. Tres Cruces, (Feb.), 1 ej. 17.9 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó, 1987a y Alderete y Capllonch, 2010).

Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca. Salto, (Dic.), 1 ej. 14 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1975; Salvador, 1988; 1990, Camperi, 1992a;

Navas y Bó, 2001; Christie *et al.*, 2004; Alderete y Capllonch, 2010).

Pseudasthenes steinbachi. Aguas Blancas, (Nov.), 1 ej. 19 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Navas y Bó, 1987a; Salvador, 1990; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Schoeniophylax phryganophila phryganophila. Salto, (Ene.), 1 ej. 15 gr; Reserva El Bagual, (Feb., Jun., Set.), 4 ej. X: 17.8 gr (RA: 14.5 a 20.2) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Certhiaxis cinnamomeus russeolus. Reserva El Bagual, (Ene.), 1 ej. 11 gr; Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ej. 15.5 gr (ADG).

Comentarios: para más datos de pesos en nuestro país de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Alderete y Capllonch, 2010).

Synallaxis cinerascens. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 13.5 gr (SAS).

Comentarios: para esta especie solo había datos de pesos solo de Corrientes (Contreras, 1980).

Synallaxis azarae superciliosa. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 3 ej. X: 11.8 gr (RA: 11.5 a 12.3) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2010).

Synallaxis albescens australis. Reserva El Bagual, (Jun., Ago.), 2 ej. 11 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005;

Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Synallaxis scutata whiti. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 13.5 gr (RA: 11.7 a 14.9) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; 1990; Alderete y Capllonch, 2010).

Familia Tyrannidae

Elaenia spectabilis. Sachayoj, (Abr.), 1 ej. 28 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Set.), 1 ej. 20 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Elaenia obscura obscura. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 2 ej. 23 y 25,1 gr (ADG).

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro país (Alderete y Capllonch, 2010).

Polystictus pectoralis pectoralis. Reserva El Bagual, (Feb., Nov.), 1 ♀ 6.5 gr y 1 ♀ ej. 6,8 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005).

Pseudocolopteryx sclateri. Reserva El Bagual, (Ene., Nov., Dic.), 1 ♂ 6.5 gr, 1 ♀ 6.0 gr y 5 ej. X: 7.1 gr (RA: 6.5 a 7.4) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras y Contreras, 1978; Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005).

Phylloscartes ventralis tucumanus. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 12 ej. X: 6.8 gr

(RA: 6.0 a 7.6); Parque Nacional Calilegua, (Oct.), 1 ej. 7.4 gr (ADG).

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro país (Alderete y Capllonch, 2010).

Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus. Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej. 11.5 gr (ADG); Lib. General San Martín, (Oct.), 2 ej. 11.8 y 12.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; 1990; Darrieu y Camperi, 1992; Alderete y Capllonch, 2010).



Figura 7 - *Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus*, Lib. General San Martín, Jujuy.

Culicivora caudacuta. Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Nov., Dic.), 31 ej. X: 6.5 gr (RA: 5.8 a 7.2) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Di Giacomo, 2005).

Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer. Reserva El Bagual, (Mar.), 1 ej. 7.2 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; 1990; Darrieu y Camperi, 1992; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Sayornis nigricans latirostris. Parque Nacio-

nal Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 21.6 gr (RA: 20 a 23.2) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2010).

Knipolegus striaticeps. Sachayoj, (Abr.), 2 ♂ 10.9 y 11.3 gr y 1 ♀ 10.8 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1980; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Knipolegus signatus cabanisi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 8 ♀ X: 17.9 gr (RA: 16.1 a 19.5) (AGD); Lib. General San Martín, (Oct.), 1 ♀ 19.2 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; 1990; Alderete y Capllonch, 2010).

Hymenops perspicillatus perspicillatus. Reserva El Bagual, (Jun., Set.), 1 ♂ 21.2 gr y 3 ♀ X: 19.9 gr (RA: 19 a 20.7); Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ♀ 21 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1990; Camperi, 1992a; Navas y Bó, 2001; Di Giacomo, 2005).

Satrapa icterophrys. Reserva El Bagual, (Feb.), 1 ej. 20 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Camperi, 1992b; Alderete y Capllonch, 2010).

Muscisaxicola rufivertex achalensis. Pampa de Achala, (Ene.), 1 ej. 19.5 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro país (Navas y Bó, 1994).

Agriornis montanus fumosus. Pampa de

Achala, (Ene.), 2 ej. 51 y 56 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro país (Salvador, 1988).

Agriornis murinus. Mina Clavero, (May.), 1 ej. 27.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1994; Blendinger, 1999; Alderete y Capllonch, 2010).

Xolmis irupero irupero. Reserva El Bagual, (Set.), 3 ej. 27.5 gr (RA: 26 a 28.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Zapata y Martínez, 1972; Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Alectrurus risora. Reserva El Bagual, (Ene., Jun., Ago., Nov. Dic.), 8 ♂ X: 23.2 gr (RA: 21 a 25) y 54 ♀ X: 20.3 gr (RA: 17.7 a 22.5); Rincón del Socorro, (Nov., Dic.), 1 ♂ jov. 22.5 gr y 5 ♀ X: 21.9 gr (RA: 21 a 23.7) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi, 1992; Di Giacomo, 2005).

Machetornis rixosus rixosus. Salto, (Mar.), 1 ej. 29 gr; Reserva El Bagual, (Feb.), 30.8 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005).

Pitangus sulphuratus argentinus. Salto, (Ene.), 3 ej. X: 62.3 gr (RA: 60 a 65); Reserva El Bagual, (Ene., Ago., Set., Oct.), 9 ej. X: 53.8 gr (RA: 42.5 a 60); Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ej. 63 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934;

Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1990; 2001; Darrieu y Camperi, 1992; Camperi, 1992b; Di Giacomo, 2005; Montaldo, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Myiodynastes maculatus solitarius. Reserva El Bagual, (Ene.), 2 ej. 46 y 47 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979 y Alderete y Capllonch, 2010).

Tyrannus melancholicus melancholicus. Salto, (Ene., Dic.), 4 ej. X: 45.5 gr (RA: 44 a 47); Reserva El Bagual, (Nov.), 1 ej. 45 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Di Giacomo, 2005; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010).

Tyrannus savana savana. Salto, (Ene.), 3 ♂ X: 32.1gr (30.7 a 33) y 4 ♀ X: 32.5 gr (RA: 32 a 33); Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ♂ 29 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Navas y Bó, 2001; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2010; Jahn y Tuero, 2013; Salvador, 2013a).

Familia Cotingidae

Phytotoma rutila rutila. Salto, (May., Jun.), 2 ♀ 34.5 y 40 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Zapata y Martínez, 1972; Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Contreras, 1983a; 1983b; Camperi, 1992a; 1992b; Navas y Bó, 2000; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Salvador, 2013b).

Familia Corvidae

Cyanocorax cyanomelas. Reserva El Bagual, (Ago.), 2 ej. X: 185 y 204 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).

Cyanocorax chrysops chrysops. Reserva El Bagual, (Abr., Jul., Ago., Set.), 14 ej. X: 150.6 gr (RA: 141 a 158) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).

Cyanocorax chrysops tucumana. Balcozna de Afuera, (Jun.), 1 ♀ 147 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988).

Familia Hirundinidae

Stelgidopteryx ruficollis ruficollis. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 20.2 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1983; Darrieu y Camperi, 1993).

Progne tapera fusca. Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ej. 34 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Progne elegans. Capilla del Monte, (Nov.), 1 ♂ 46 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Blendinger, 2005; Camperi y Darrieu, 2004).

Tachycineta meyeri. Salinas Grandes, (Jun.), 2 ej. 17 y 18 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Christie *et al.*, 2004; Liljesthröm *et al.*, 2009).

Familia Troglodytidae

Troglodytes aedon rex. Reserva El Bagual, (Jul., Set., Nov.), 3 ej. X: 10.9 gr (RA: 10 a 11.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó, 1986; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Troglodytes aedon bonaire. Salto, (Ene., Abr., Jun.), 8 ej. X: 12 gr (RA: 11.1 a 13.8) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y Camperi, 1993).

Troglodytes solstitialis auricularis. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 4 ej. X: 9.4 gr (RA: 9.0 a 10.3) (ADG).

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro (Salvador, 1988).

Familia Cinclidae

Cinclus schulzi. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ♂ 34.9 gr y 3 ej. X: 35 gr (RA: 33 a 38.8) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Salvador, 1990; Tyler y Tyler, 1996).

Familia Turdidae

Catharus dryas blakei. Parque Nacional Bari-

tú, (Ago.), 8 ej. X: 30.1 gr (RA: 26.5 a 33.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Auer *et al.*, 2007).

Catharus ustulatus swainsoni. Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 3 ej. X: 28.7 gr (RA: 27.5 a 31) (ADG); Cerro Colorado, (Mar.), 1 ej. 30.8 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de pesos de la subespecie para Argentina.

Turdus rufiventris rufiventris. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 13 ej. X: 73.2 gr (RA: 65 a 85); Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej. 71 gr; Reserva El Bagual, (Ene., Jul., Ago., Nov., Dic.), 7 ej. X: 67.2 gr (RA: 63.7 a 75) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Salvador, 1988; 1990; Di Giacomo, 2005; Montaldo, 2005; Auer *et al.*, 2007).

Turdus nigriceps nigriceps. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 67.5 gr (ADG); Valle Hermoso, (Dic.), 1 ♂ 53 gr y 1 ♀ 51.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; 1990; Auer *et al.*, 2007).

Turdus chiguanco anthracinus. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ♀ 83 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988).

Familia Mimidae

Mimus saturninus modulator. Salto, (May., Dic.), 2 ej. 74 y 75 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre

el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Fraga, 1985; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).

Mimus triurus. Reserva El Bagual, (Set.), 1 ej. 46 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1975; Camperi, 1992b; Blendinger, 2005).

Mimus dorsalis. Azul Pampa, (Mar.), 1 ej. 47.5 gr (SAS).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Familia Motacilidae

Anthus furcatus furcatus. Salto, (Ago.), 1 ej. 19 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Camperi, 1992a).

Familia Thraupidae

Paroaria coronata. Reserva El Bagual, (Feb., Ago., Oct., Nov.), 15 ej. X: 38.3 gr (RA: 34.5 a 42.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Thlypopsis sordida sordida. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 3 ej. 13.7 gr (RA: 13 a 14) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Salvador, 1990).

Pyrrhocomma ruficeps. Dos Hermanas, (Jun.), 2 ♂ 13.5 y 15 gr y 1 ♀ 14 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1994).

Trichothraupis melanops. Dos Hermanas, (Jun.), 3 ♂ X: 22.2 gr (RA: 21.5 a 23) (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Short, 1971; Contreras, 1983c; Darrieu y Camperi, 1994).

Tachyphonus rufus. Reserva El Bagual, (Jul., Ago.), 13 ♂ 36.9 gr (RA: 33 a 40) y 10 ♀ 35.7 gr (RA: 28 a 42) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1983c; Di Giacomo, 2005).

Thraupis sayaca obscura. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 4 ej. X: 33.4 gr (RA: 31.6 a 36); Reserva El Bagual, (Feb., Ago., Oct., Nov.), 11 ej. 32.2 gr (RA: 29.7 a 37.7) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Phrygilus atriceps. Humahuaca, (Mar.), 1 ♂ 26.2 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2012).

Diuca diuca minor. Chemical, (Jun., Set.), 12 ej. X: 25.9 gr (RA: 21 a 29.5) (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras y Davies, 1980; Navas y Bó, 1986a; 1987b; Salvador, 1990; Camperi, 1992a; Blendinger, 1999).

Lophospingus pusillus. Chemical, (Set.), 2 ♂ 12.5 y 13.5 gr y 5 ♀ X: 14.1 gr (RA: 13.5 a 14.5) (SAS).

Comentarios: para más información sobre

el peso de esta especie (ver Contreras y Davies, 1980; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Donacospiza albifrons. Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Ago., Set., Nov., Dic.), 15 ej. X: 16.1 gr (RA: 14.3 a 19); Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ej. 16.5 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Di Giacomo, 2005).

Poospiza nigrorufa. Otamendi, (Nov.), 1 ♀ 19 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1979; Alderete y Capllonch, 2012).

Poospiza melanoleuca. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 5 ej. X: 11.3 gr (RA: 10.6 a 12.2) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Camperi, 1992b; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Poospiza torquata pectoralis. Chemical, (Set.), 3 ej. X: 9.6 gr (RA: 9.5 a 9.7) (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Navas y Bó, 1991; Blendinger, 1999; Mezquida y Marone, 2003; Alderete y Capllonch, 2012).

Sicalis lutea. Aparzo, (Feb.), 1 ♂ 23.7 gr (SAS).

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta especie en nuestro país (Alderete y Capllonch, 2012).

Sicalis olivascens. Tafí del Valle, (Mar.), 1 ♂ 23.5 gr y 2 ♀ 22 y 22.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Sal-

vador, 1990; Alderete y Capllonch, 2012; Areta *et al.*, 2012).

Sicalis flaveola pelzelni. Chamental, (Jun.), 1 ♂ 15.7 gr y 7 ♀ X: 16.4 gr (RA: 14.5 a 17.6) (SAS); Salto, (Ene., May., Abr., Jun., Dic.), 22 ♂ X: 16.6 gr (RA: 15.8 a 18) y 16 ♀ X: 17.3 gr (RA: 14.7 a 20.5); Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Jun., Ago.), 8 ♂ X: 14.9 gr (RA: 13.6 a 16), 3 ♀ X: 14.8 gr (RA: 13.9 a 15.5) y 4 juv. X: 13.8 gr (RA: 12.5 a 14.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Sicalis luteola luteiventris. Salto, (Ene., Mar., Abr., Set., Oct., Dic.), 9 ♂ X: 15.2 gr (RA: 14 a 16.2); 25 ♀ X: 15.2 (RA: 13.5 a 17); Reserva El Bagual, (Mar.), 1 ♀ 13.6 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Humphrey *et al.*, 1970; Contreras, 1975; Salvador y Salvador, 1986; Camperi 1992a; Christie *et al.*, 2004; Blendinger, 2005; Camperi y Darrieu, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Emberizoides herbicola herbicola. Reserva El Bagual, (Feb., Mar., Jun., Ago., Nov.), 24 ej. X: 29.4 gr (RA: 25 a 33.8) y 4 ej. juv. 27.8 gr (RA: 25.5 a 32.2) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005).

Emberizoides ypiranganus. Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Ago., Set., Nov., Dic.), 23 ej. X: 20.9 gr (RA: 19 a 24.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Di Giacomo, 2005).

Embernagra platensis platensis. Rincón del Socorro, (Nov.), 2 ej. 42 y 44 gr; Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Set., Nov., Dic.), 20 ej. X: 42.7 gr (RA: 36 a 47) y 2 ej. juv. 38 y 51 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1980; Camperi, 1992b; Camperi y Darrieu, 2005; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Volatinia jacarina jacarina. Reserva El Bagual, (Ene., Ago., Nov., Dic.), 14 ♂ X: 9.8 gr (RA: 8.2 a 11), 7 ♀ X: 10.3 gr (RA: 9.5 a 11) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Sporophila collaris melanocephala. Villa Ángela, (Mar.), 2 ♂ 14.1 y 14.4 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Nov., Dic.), 17 ♂ X: 12.5 gr (RA: 11.2 a 14.5), 7 ♀ X: 11.7 gr (RA: 9.8 a 12.4) y 2 juv. 12 y 14 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras y Roig, 1977; Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Sporophila caerulescens caerulescens. Salto, (Ene., Mar., Abr., Dic.), 12 ♂ X: 10.9 gr (RA: 10 a 12.2) y 12 ♀ X: 11.4 gr (RA: 8.9 a 14.2); Reserva El Bagual, (Feb., Nov.), 1 ♂ 10.5 gr, 1 ♀ 10 gr y 1 juv. 12.2 gr; Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ♂ 11 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005; Ortiz y Capllonch, 2007; Alderete y Capllonch, 2012).

Sporophila hypoxantha. Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Set., Nov.,

Dic.), 66 ♂ X: 8.6 gr (RA: 7.2 a 9.8) y 58 ♀ X: 8.4 gr (RA: 7.2 a 10.7) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1979 y Di Giacomo, 2005).

Sporophila ruficollis. Reserva El Bagual, (Nov.), 1 ♂ jov. 11 gr (ADG); Cintra, (Dic.), 2 ♂ 8.3 y 9.1 gr y 1 ♀ 8.4 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Short, 1971; Contreras y Contreras, 1978).

Sporophila palustris. Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ♂ 9.0 gr (ADG).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Sporophila cinnamomea. Colón, (Ene.), 2 ♂ 9.2 y 9.8 gr (SAS); Rincón del Socorro, (Dic.), 1 ♂ 8.9 gr y 1 ♀ 9.0 gr (ADG).

Comentarios: este es el primer dato de peso de la especie para Argentina.

Catamenia analis analis. Pampa de Achala, (Ene.), 1 ♂ 11.8 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contino, 1980; Salvador, 1990; Blendinger, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Gubernatrix cristata. Rucanelo, (May.), 1 ♂ 44 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras y Davies, 1980; Camperi, 1992a; Darrieu y Camperi, 1996; Domínguez *et al.*, 2014).

Tiaris obscurus obscurus. Lib. General San Martín, (Oct.), 1 ej. 9.7 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988 y Alderete y Capllonch, 2012).



Figura 8. *Tiaris obscurus obscurus*, Lib. General San Martín, Jujuy.

Incertae Sedis

Saltator coerulescens coerulescens. Reserva El Bagual, (Ene., Ago.), 3 ej. X: 53.2 gr (RA: 50 a 57.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Salvador, 1990; Camperi, 1992b; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Familia Emberizidae

Ammodramus humeralis xanthornus. Salto, (Ene.), 2 ej. 17 y 18 gr; Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Jun., Mar., Ago., Set., Nov., Dic.), 65 ej. X: 16.5 gr (RA: 14.6 a 21) y 12 ej. Jov. X: 15.2 gr (RA: 13.9 a 16.5); Rincón del Socorro, (Nov.), 1 ej. 18 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1988; Darrieu y Camperi, 1996; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Rhynchospiza strigiceps strigiceps. Los Morteros, (Abr.), 1 ej. 19.5 gr; Frías, (May.), 1 ej. 21 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Navas, 1965; Camperi, 1992b; Alderete y Capllonch, 2012).

Rhynchospiza strigiceps dabbenei. Tafí del Valle, (Mar.), 1 ej. 33.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Alderete y Capllonch, 2012).

Arremon flavirostris dorbignii. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ej. 24.5 gr; Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 1 ej. 27.4 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Auer *et al.*, 2007; Alderete y Capllonch, 2012).

Arremon torquatus borellii. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 8 ej. X: 32.5 gr (RA: 30 a 36.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988; Auer *et al.*, 2007; Alderete y Capllonch, 2012).

Chlorospingus flavopectus argentinus. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 6 ej. X: 14.5 gr (RA: 12.8 a 17) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1983^a; Salvador, 1988).

Familia Cardinalidae

Pheucticus aureoventris aureoventris. Santa Rosa de Calamuchita, (Ene.), 2 ej. 51 y 54.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; Alderete y Capllonch, 2012).

Cyanocompsa brissonii argentina. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 1 ♀ 23 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre

el peso de esta subespecie (ver Contreras y Davies, 1980; Salvador, 1990; Di Giacomo, 2005; Alderete y Capllonch, 2012).

Familia Parulidae

Setophaga pitiayumi pitiayumi. Reserva El Bagual, (Abr.), 1 ej. 7.2 gr (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Camperi, 1992a; 1992b; Darrieu y Camperi, 1993; Di Giacomo, 2005).

Myiothlypis leucoblephara leucoblephara. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 14.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Darrieu y Camperi, 1993 y Chatellenaz, 2008).

Myiothlypis signata favovirens. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 4 ej. X: 10.8 gr (RA: 10.4 a 11.3) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Salvador, 1988 y Auer *et al.*, 2007).

Myiothlypis bivittata argentinae. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 21 ej. X: 13.1 gr (RA: 11 a 16); Parque Nacional Calilegua, (Nov.), 4 ej. X: 14 gr (RA: 13.5 a 14.6) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1983b; Salvador, 1988; 1990; Auer *et al.*, 2007).

Basileuterus culicivorus azarae. Dos Hermanas, (Jun.), 1 ej. 9.3 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Darrieu y Camperi, 1993; Chatellenaz, 2008).

Myioborus brunniceps brunniceps. Parque Nacional Baritú, (Ago.), 8 ej. X: 8.2 gr (RA:

7.6 a 9.7) (ADG); Valle Hermoso, (Dic.), 1 ej. 8.5 gr (SAS).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Salvador, 1988; 1990; Auer *et al.*, 2007).



Figura 9. *Myioborus bruniceps bruniceps*, Valle Hermoso, Córdoba.

Familia Icteridae

Cacicus solitarius. Reserva El Bagual, (Ago.), 4 ej. X: 85.1 gr (RA: 82.5 a 90.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Contreras, 1983c; Di Giacomo, 2005).

Cacicus chrysopterus. Sachayoj, (Abr.), 1 ♂ 37.5 gr (SAS); Reserva El Bagual, (Ago.), 17 ej. X: 37.2 gr (RA: 29 a 43.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1983b; Di Giacomo, 2005).

Icterus pyrrhopterus. Reserva El Bagual, (Feb., Ago., Dic.), 7 ej. X: 29.4 gr (RA: 27.5 a 32.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979; Camperi, 1992b).

Gnorimopsar chopi chopi. Reserva El Bagual,

(Feb., Jun., Dic.), 7 ej. X: 66.9 gr (RA: 62 a 75) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005; Fraga, 2008).

Agelasticus cyanopus cyanopus. Reserva El Bagual, (Ene., Feb., Mar., Jun., Ago., Set., Nov., Dic.), 30 ♂ X: 34.5 gr (RA: 31 a 38.3) y 30 ♀ X: 29.3 gr (RA: 25.5 a 33.8) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Contreras, 1979; Di Giacomo, 2005).

Chrysomus ruficapillus ruficapillus. Reserva El Bagual, (Ene., Jun., Set.), 3 ♂ X: 40.5 gr (RA: 38 a 45), 1 ♂ jov. 28 gr y 11 ♀ X: 29.3 gr (RA: 25.5 a 32.8) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Di Giacomo, 2005).

Agelaioides badius badius. Salto, (Ene.), 3 ej. X: 40.2 gr (RA: 32.3 a 46); Reserva El Bagual, (Feb., Ago.), 6 ej. X: 36.3 gr (RA: 33.5 a 39.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1979a; Salvador, 1988; Camperi, 1992a; Di Giacomo, 2005).

Molothrus rufoaxillaris. Salto, (Ene.), 2 ej. 56.5 y 65 gr; Reserva El Bagual, (Ago., Set.), 8 ♂ X: 50.7 gr (RA: 47 a 54.5) y 9 ♀ X: 39.4 gr (RA: 36 a 42.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Mason, 1987; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Molothrus bonariensis bonariensis. Salto, (Ene., Dic.), 5 ♂ X: 53.8 gr (RA: 50 a 59) y 3 ♀ X: 50.6 gr (RA: 48.5 a 52.5); Reserva El Bagual, (Ago., Set.), 18 ♂ X: 50.9 gr (RA: 44 a

57) y 22 ♀ X: 39.2 gr (RA: 34.5 a 43) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1975; 1979; Contino, 1980; Fraga, 1985; Mason, 1987; Salvador, 1990; Mermoz y Reboreda, 1994; Di Giacomo, 2005; Camperi y Darrieu, 2005).

Sturnella superciliares. Salto, (Ene., Oct., Dic.), 1 ♂ 50 gr y 14 ej. X: 43.6 gr (RA: 36.5 a 50) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta especie (ver Fiora, 1934; Contreras, 1983c; Salvador, 1988; Di Giacomo, 2005).

Familia Fringilidae

Sporagra magellanica alleni. Reserva El Baqual, (Jun., Ago.), 3 ej. X: 10.3 gr (RA: 10 a 10.5) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Navas y Bó, 2000; Di Giacomo, 2005).

Euphonia chlorotica serrirostris. Frías, (Jun., Ago.), 1 ♂ 12.7 gr y 1 ♀ 11.9 gr.

Comentarios: solo existe un registro de pesos para esta subespecie en nuestro país (Darrieu y Camperi, 1994).

Familia Passeridae

Passer domesticus domesticus. Salto, (Ene., May., Jun., Set., Dic.), 32 ♂ X: 29.3 gr (RA: 22 a 34.5) y 20 ♀ X: 29.7 gr (RA: 21.2 a 36) (ADG).

Comentarios: para más información sobre el peso de esta subespecie (ver Humphrey *et al.*, 1970; Salvador, 1990; Camperi, 1992a; Christie *et al.*, 2004; Camperi y Darrieu, 2005).

BIBLIOGRAFÍA

- Alderete, C. y Capllonch, P. 2010. El peso de aves en familias pertenecientes al orden Suboscines en la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 58: 1-5.
- Alderete, C. y Capllonch, P. 2012. Peso de aves de las Familias Emberizidae y Cardinalidae en la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda Serie)*, 94: 1-10.
- Areta, J.L., Pearman, M. y Ábalos, R. 2012. Taxonomy and biogeography of the Monte Yellow-Finch (*Sicalis mendozae*): understanding the endemic avifauna of Argentina's Monte Desert. *Condor*, 114: 654-671.
- Auer, S.K., Bassar, R.D., Fontaine, J.J. y Martin, T.E. 2007. Breeding biology of passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. *Condor*, 109: 321-333.
- Banks, R.D. y Bohl, W.H. 1968. Pentland's Tinamou in Argentina (Aves: Tinamidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 81: 485-490.
- Berkunsky, L., Mahler, B. y Reboreda, J.C. 2009. Sexual dimorphism and determination of sex by morphometrics in Blue-fronted Amazonas (*Amazona aestiva*). *Emu*, 109: 192-197.
- Blendinger, P.G. 1999. Facilitation of sap-feeding birds by the Withe-fronted Woodpecker in the monte desert, Argentina. *Condor*, 101: 402-407.
- Blendinger, P.G. 2005. Abundance and diversity of small-bird assemblages in the Monte desert, Argentina. *Journal of Arid Environments*, 61: 567-587.
- Bucher, E.H., Gomez, E., Di Tada, I.E. y Reati, G.J. 1977. Ecología de la reproducción de la paloma *Zenaida auriculata*. I. Variación estacionales en peso corporal, gónadas, reserva de lípidos y muda. *Ecosur*, 4: 47-67.
- Bump, G. y Bump, J. 1969. A study of the Spotted Tinamous and the Pale Spotted Tinamous of Argentina. *Special Science Reports on Wildlife*, 120: 1-160.
- Camperi, A.R. 1992a. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Neotrópica*, 38: 127-140.
- Camperi, A.R. 1992b. Estudio de una colección de aves de la provincia de Entre Ríos. *Hornero*, 13: 225-229.
- Camperi, A.R. y Darrieu, C.A. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan: lista comentada de especies. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6: 147-164.
- Camperi, A.R. y Darrieu, C.A. 2005. Aves del Alto Valle del Río Negro, Argentina. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 7: 51-56.

- Carman, R.L. 1973. *De la fauna bonaerense*. Talleres Gráficos Didot, Buenos Aires.
- Caziani, S.M. y Protomastro, J.J. 1994. Diet of the Chaco Chachalaca. *Wilson Bulletin*, 106: 640-648.
- Chatellenaz, M.L. 2008. Ecología alimentaria de dos especies simpátricas del género *Basileuterus* en el noreste de Argentina. *Hornero*, 23: 87-93.
- Christie, M. I., Ramilo, E.J. y Bettinelli, M.D. 2004. *Aves del noroeste patagónico*. Editorial L.O.L.A.
- Contino, F.N. 1980. *Aves del noroeste argentino*. Universidad Nacional de Salta, 254 pp.
- Contreras, J.R. 1975. Características ponderales de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. *Physis*, 88: 97-107.
- Contreras, J.R. 1979. Bird weights from northeastern Argentina. *Bulletin of the British Ornithological Club*, 99: 21-24.
- Contreras, J.R. 1980a. Dos nuevas localidades para aves argentinas. *Historia Natural*, 1: 84.
- Contreras, J.R. 1980b. Avifauna Mendocina. II. Revalidación de *Embernagra platensis gossei* Chubb, 1918, y nuevos datos sobre las subespecies de *Embernagra platensis* (Passeriformes: Emberizidae). *Boletín del Museo de Ciencias Naturales "J. C. Moyano"*, 1: 23-34.
- Contreras, J.R. 1983a. Notas sobre el peso de aves argentinas. I. *Historia Natural*, 3: 16.
- Contreras, J.R. 1983b. Notas sobre el peso de aves argentinas. II. *Historia Natural*, 3: 39-40.
- Contreras, J.R. 1983c. Notas sobre el peso de aves argentinas. III. *Historia Natural*, 3: 95-96.
- Contreras, J.R. 1985. Notas sobre el peso de aves argentinas. IV. *Historia Natural*, 5: 319-320.
- Contreras, J.R. 1986. Notas sobre el peso de aves argentinas. V. *Historia Natural*, 6: 100.
- Contreras, J.R. y Contreras, A.O. 1978. Notas acerca de la avifauna de la provincia de Corrientes, Argentina. *Neotrópica*, 24: 151-153.
- Contreras, J.R. y Roig, V.G. 1977. Biota Centro-Andina. VI. Tres especies de aves nuevas para la provincia de Mendoza. *Neotrópica*, 23: 31-32.
- Contreras, J.R., Krauczuk, E.R., Giraudo, A.R., Johnson, A.E., Garello, A.A. y Davies, Y.E. 1994. Notas sobre aves de la provincia de Misiones, República Argentina. I. *Nótulas Faunísticas*, 53: 1-13.
- Darrieu, C.A. 1994. Dos nuevos registros para la avifauna pampeana: *Tersina viridis viridis* (Emberizidae) y *Columbina talpacoti talpacoti* (Columbidae). *Neotrópica*, 40: 56.
- Darrieu, C.A. y Bó, N.A. 1992. Nuevos aportes a la distribución de las razas de *Zenaida auriculata* en la República Argentina (Aves, Columbidae). *Revista del Museo de La Plata*, 14: 137-146.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1993. Estudio sobre la avifauna de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae). *Neotrópica*, 39: 83-92.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1994. Estudio de una colección de aves de Corrientes: Thaupidae e Icteridae. *Neotrópica*, 40: 49-55.
- Darrieu, C.A. y Camperi, A.R. 1996. Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). *Neotrópica*, 42: 69-75.
- Darrieu, C.A., Camperi, A.R. y Montalti, D. 2010. Fluctuación anual de la masa corporal, tamaño de gónadas y muda de *Guira guira* (Aves, Cuculiformes: Cuculidae). *Acta Zoologica Lilloana*, 54: 161-165.
- Di Giacomo, A.G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp.: 203-465, en Di Giacomo, A.G. y Krapovickas, S.F. (eds.). *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
- Domínguez, M., Reboreda, J.C. y Mahler, B. 2014. Impact of Shiny Cowbird and botfly parasitism on the reproductive success of the globally endangered Yellow Cardinal *Gubernatrix cristata*. *Bird Conservation International*, 24 (en prensa)
- Fiora, A. 1933. El peso de las aves. *Hornero*, 5: 174-188.
- Fiora, A. 1934. El peso de las aves. *Hornero*, 5: 353-365.
- Fraga, R.M. 1980. The breeding of the Rufous Hornero (*Furnarius rufus*). *Condor*, 82: 58-68.
- Fraga, R.M. 1983. Conducta vocal y reproductiva de la Yerutí Común (*Leptotila verreauxi*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. *Hornero*, 12: 89-95.
- Fraga, R.M. 1985. Host-parasite interactions between Chalk-browed Mocking-birds and Shiny Cowbird. *Neotropical Ornithology*, 36: 829-844.
- Fraga, R.M. 2008. Notes of nesting of Chopi Blackbirds (*Gnorimopsar chopi*) in Argentina and Paraguay, with data on cooperative breeding and brood parasitism by Screami Cowbirds (*Molothrus rufoaxillaris*). *Ornitología Neotropical*, 19: 299-303.
- Humphrey, P.S. y Peterson, R.T. 1978. Nesting behavior and affinities of Monk Parakeets of southern Buenos Aires province, Argentina. *Wilson Bulletin*, 90: 544-552.
- Humphrey, P.S., Bridge, D., Reynolds, P.W. y Peterson, R.T. 1970. *Birds Isla Grande (Tierra del Fuego)*. University of Kansas Museum of Natural History, Washington.
- Jahn, A.E. y Tuero, D.T. 2013. Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*), Neotropical Birds Online (T.S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Or-

- nithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=482636
- Liljeström, M., Schiavini, A. y Reboreda, J.C. 2009. Chilean Swallows (*Tachycineta meyeri*) adjust the number of feathers added to the nest with time of breeding. *Wilson Bulletin*, 121: 783-788.
- Mason, P. 1987. Pair formation in Cowbirds: evidence found for Screaming but not Shiny Cowbirds. *Condor*, 89: 349-356.
- Mezquida, E.T. y Marone, L. 2003. Comparison of the reproductive biology of two *Poospiza* Warbling-finches of Argentina in wet and dry years. *Ardea*, 91: 251-262.
- Montaldo, N.H. 2005. Aves frugívoras de un relicto de selva subtropical, ribereña en Argentina: manipulación de frutos y destino de las semillas. *Hornero*, 20: 163-172.
- Navas, J.R. 1965. Notas sobre *Aimophila strigiceps* y su distribución geográfica. *Hornero*, 10: 215-224.
- Navas, J.R. 1993. Aves Podicipediformes y Pelecaniformes. En Fauna de Agua Dulce de la República Argentina. Vol. 43, Fasc. 1A. Conicet. La Plata.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1986. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihuel Calef, La Pampa, Argentina. *Hornero*, 12: 250-261.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1987a. Notas sobre Furnariidae argentinos. (Aves, Passeriformes). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 14: 55-86.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1987b. Nuevos aportes a la distribución geográfica de *Diuca diuca* (Aves, Emberizidae) en la Argentina. *Neotrópica*, 33: 97-104.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1990. Apuntes sobre aves de la Meseta de Somuncurá, Provincia de Río Negro. *Neotrópica*, 36: 45-53.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1991. Anotaciones taxionómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves, Passeriformes). *Revista del Museo de La Plata*, 14: 119-134.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 1994. Apuntes sobre distribución y cría de algunas especies de los géneros *Agrionis*, *Xolmis*, *Neoxolmis* y *Muscisaxicola* (Aves, Tyrannidae). *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 16: 81-96.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 2000. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Primera parte. (Aves: Phytotomidae, Mimidae, Troglodytidae, Motacillidae, Emberizidae y Fringillidae). *Hornero*, 15: 123-127.
- Navas, J.R. y Bó, N.A. 2001. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de las aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Segunda parte. (Aves: Falconidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, Caprimulgidae, Apodidae, Furnariidae, Rhynocryptidae y Tyrannidae). *Hornero*, 16: 31-37.
- Orgeira, J.L. 1995. Presencia de Garcita Bueyera *Bubulcus ibis* en el océano Atlántico Sur, otoño 1993. *Hornero*, 14: 53-54.
- Ortiz, D. y Capllonch, P. 2007. Distribución y migración de *Sporophila c. caerulescens* en Sudamérica. *Revista Brasileira de Ornitología*, 15: 377-385.
- Piloni, G. 2004. Revisión sistemática de las subespecies de *Zonotrichia capensis* (P. I. S. Müller) (Aves: Emberizidae) y su distribución geográfica en la República Argentina. *Physis*, 60: 1-23.
- Remsen, J.V., Jr., Cadena, C.D., Jaramilo, A., Nores, M., Pacheco, J.F., Pérez Emán, J., Robbins, M.B., Stiles, F.G., Stotz, D.F. y Zimmer, K.J. 2014. A classification of the bird species of South America. <<http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>> (7 nov. 2014).
- Rodríguez Mata, J. 1973. Presencia de *Bubulcus ibis* en la Argentina (Aves, Ardeidae). *Neotrópica*, 19: 55-56.
- Salvador, S.A. 1988. Datos de peso de aves argentinas. *Hornero*, 13: 78-83.
- Salvador, S.A. 1990. Datos de pesos de aves argentinas. 2. *Hornero*, 13: 169-171.
- Salvador, S.A. 2012. Dieta y reproducción del Halcón Aplomado (*Falco femoralis femoralis*) en Villa María, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera Serie)*, 2: 111-118.
- Salvador S.A. 2013a. Biología de la Tijereta (*Tyrannus s. savana*) en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera Serie)*, 3: 29-41.
- Salvador, S.A. 2013b. Biología del Cortarramas (*Phytotoma rutila rutila*) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 58: 30-32.
- Salvador, S.A. y Salvador, L.A. 1986. Nota sobre la reproducción del Misto (*Sicalis luteola*) en Córdoba, Argentina. *Hornero*, 12: 274-280.
- Short, L.L. 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 9: 283-309.
- Tyler, S.J. y Tyler, L. 1996. The Rufous-throated Dipper *Cinclus schulzi* on rivers in north-west Argentina and southern Bolivia. *Bird Conservation International*, 6: 103-116.
- Wilson, R.E., Valqui, T.H. y McCracken, K.G. 2010. Ecogeographic variation in Cinnamon Teal (*Anas cyanoptera*) along elevational and latitudinal gradients. *Ornithological Monographs*, 67: 141-161.

Recibido: 12/11/2014 - Aceptado: 3/02/2015

APÉNDICE 1. Localidades

Información sobre las localidades citadas en el texto, ordenadas por orden alfabético. Coordenadas, departamento o partido y provincia.

Aguas Blancas (28° 58' S, 66° 59' O), dto. Castro Barros, La Rioja
 Aparzo (23° 03' S, 65° 12' O), dto. Humahuaca, Jujuy
 Azul (36° 47' S, 59° 51' O), pdo. Azul, Buenos Aires
 Azul Pampa (22° 57' S, 65° 26' O), dto. Humahuaca, Jujuy
 Bahía Camarones (44° 48' S, 65° 42' O), dto. Florentino Ameghino, Chubut
 Balcozna de Afuera (27° 52' S, 65° 44' O), dto. Paclín, Catamarca
 Buena Esperanza (34° 45' S, 65° 15' O), dto. Gobernador Dupuy, San Luis
 Chamental (30° 21' S, 66° 18' O), dto. Chamental, La Rioja
 Capilla del Monte (30° 51' S, 64° 31' O), dto. Punilla, Córdoba
 Cerro Colorado (30° 05' S, 63° 55' O), dto. Tulumba, Córdoba
 Cintra (32° 18' S, 62° 39' O), dto. Unión, Córdoba
 Conhelo (36° 01' S, 64° 36' O), dto. Conhelo, La Pampa
 Dalmasio Vélez Sarsfield (32° 36' S, 63° 34' O), dto. Tercero Arriba, Córdoba
 Dique de Sumampa (28° 04' S, 65° 34' O), dto. Paclín, Catamarca
 Dique Paso de las Carretas (33° 17' S, 65° 52' O), dto. Pringles, San Luis
 Dos Hermanas (26° 17' S, 53° 45' O), dto. General Manuel Belgrano, Misiones
 Frías (28° 37' S, 65° 07' O), dto. Choya, Santiago del Estero
 Hito Uno (22° 00' S, 62° 43' O), dto. Rivadavia, Salta
 Humahuaca (23° 12' S, 65° 21' O), dto. Humahuaca, Jujuy
 Jovita (34° 30' S, 63° 56' O), dto. General Roca, Córdoba
 La Carlota (33° 26' S, 63° 18' O), dto. Juárez Celman, Córdoba
 La Merced (28° 09' S, 65° 40' O), dto. Paclín, Catamarca
 Las Varillas (31° 52' S, 62° 43' O), dto. San Justo, Córdoba
 Lib. General San Martín (23° 48' S, 64° 47' O), dto. Ledesma, Jujuy
 Los Morteros (28° 27' S, 65° 11' O), dto. El Alto, Catamarca
 Mina Clavero (31° 43' S, 65° 00' O), dto. San Alberto, Córdoba
 Miramar (30° 54' S, 62° 40' O), dto. San Justo, Córdoba
 Otamendi (34° 13' S, 58° 53' O), pdo. Campana, Buenos Aires
 Pampa de Achala (31° 41' S, 64° 52' O), dto. San Alberto, Córdoba
 Parque Nacional Baritú (22° 34' S, 64° 48' O), dto. Santa Victoria, Salta
 Parque Nacional Calilegua (23° 55' S, 64° 50' O), dto. Ledesma, Jujuy
 Pedro Funes (33° 15' S, 63° 17' O), dto. Juárez Celman, Córdoba
 Pichanal (23° 19' S, 64° 13' O), dto. Orán, Salta
 Pozo del Molle (32° 02' S, 62° 55' O), dto. Río Segundo, Córdoba
 Quimilí (27° 38' S, 62° 25' O), dto. Moreno, Santiago del Estero
 Reserva El Bagual (26° 10' S, 58° 56' O), dto. Laishi, Formosa
 Rincón del Socorro (Lat: -28.28413, Lon: -57.19155), dto. Concepción, Corrientes
 Río Cuarto (33° 08' S, 64° 21' O), dto. Río Cuarto, Córdoba
 Roque Sáenz Peña (26° 47' S, 60° 27' O), dto. Comandante Fernández, Chaco
 Rucanelo (36° 03' S, 64° 49' O), dto. Conhelo, La Pampa
 Sachayoj (26° 41' S, 61° 50' O), dto. Alberdi, Santiago del Estero
 Salinas Grandes (29° 54' S, 64° 38' O), dto. Tulumba, Córdoba
 Salto (34° 17' S, 60° 14' O), pdo. Salto, Buenos Aires
 San Francisco (31° 26' S, 62° 04' O), dto. San Justo, Córdoba
 Santa Rosa de Calamuchita (32° 04' S, 64° 32' O), dto. Calamuchita, Córdoba
 Santa Sylvina (27° 47' S, 61° 09' O), dto. Fray Santa María de Oro, Chaco
 Tafí del Valle (26° 52' S, 65° 41' O), dto. Tafí del Valle, Tucumán
 Trelew (43° 15' S, 65° 18' O), dto. Rawson, Chubut
 Valle Hermoso (31° 05' S, 64° 30' O), dto. Punilla, Córdoba
 Villa Ángela (27° 35' S, 60° 43' O), dto. Mayor Luis Jorge Fontana, Chaco
 Viamonte (33° 44' S, 63° 05' O), dto. Unión, Córdoba